


विषादीको समुचित प्रयोजन, भण्डारण र विसर्जन



विषादीको सम्पर्कमा रहदा लगाउने
सुरक्षित प्रदर्शन

मानव स्वास्थ्यमा विषादी वाट हुने असरहरू



विषादीको समुह र प्रयोग गर्ने म्याद अनुसार मिलाएर राख्ने

Bio-pesticides



Red spider mite, the brinjal fruit and
shoot borer and the bean pod borer.

Beauveria bassiana

Trichoderma viride



Metarhizium anisopliae

Reduction in tomato leaf miner, *Tuta absoluta*

numbers and overwintering pupae dwelling in soil

सुरक्षित र प्रभावकारी केहि जैविक विषादीहरू



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
प्लान्ट क्यारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर

२०७८

विषादीको समुचित प्रयोग, भण्डारण र विसर्जन



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
प्लान्ट कवारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर

२०७८

दुई शब्द

स्वच्छ र पौष्टिक खानेकुरा, आवास, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन् । जीवन स्वस्थ रहन खानेकुरा स्वस्थकर हुन आवश्यक छ । खानेकुरा कुनै कारणले अस्वस्थकर हुन गएमा त्यसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ र कठिपय अवस्थामा ज्यानै जान सक्छ । खानेकुरा अस्वस्थ हुनुमा प्रयोग गरिएका विषादीको अवशेष पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । विषादीले जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा सम्पूर्ण वातावरणमा असर पार्न गर्दछ । कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एंव प्रतिष्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी उन्नत प्रविधिको माध्यमबाट आम जनताको जीवनस्तरमा मापन योग्य सुधार ल्याई गरिबी न्यूनिकरण गर्ने कृषि क्षेत्रको ध्येय रहेको परिप्रेक्षमा विषादीसँग सम्बन्धित कारोबारलाई नियमन गर्दै विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूलाई वातावरण संग सामञ्जस्यता ल्याई दिगो विकास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । बाली कटानी अघि र पछि समेत गरेर बाली शत्रुहरूका कारण नेपालमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म क्षती भइरहेको अनुमान छ । जसले गर्दा एकातिर आधुनिक कृषिमा विषादीको प्रयोग अपरिहार्य बन्दै गएका छ, भने अर्कातिर जनस्वास्थ्य एंव वातावरणीय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी गुणस्तरीय तथा सुरक्षित खाद्यवस्तु मागको परिपूर्ति गर्नु परेको छ । तसर्थ, रासायनिक विषादीबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावहरूप्रति सजगता अपनाई गुणस्तरीय बाली उत्पादन र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न अपरिहार्य रहेको छ ।



नेपाल सरकारबाट विषादी नियमनका कार्यहरूको अतिरिक्त सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकारको हालको संरचना अनुसार यस केन्द्रले सो कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । बालीशत्रुहरूबाट हुने नोक्सानीबाट जोगाउन प्रयोग गरिने विषादीको दुरुपयोगबाट उत्पन्न हुन सम्झे दुस्प्रभावहरू बारे विषादी उत्पादक, आयतकर्ता, खुद्रा बिक्रेता, कृषक समुदाय, उपभोक्ताहरू एंव यससँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध सबैलाई जानकारी प्राप्तहोस् भन्ने अभिप्रायले 'विषादीको समुचित प्रयोग, भण्डारण र विसर्जन' नामक यो प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन गरिएको हो । यसले विषादीसँग सम्बन्धित सबैलाई सु-सुचित गराउन सहयोग गर्ने छ, भन्ने मैले आशा लिएको छु ।

अन्त्यमा, यो सूचनामूलक प्रकाशन तयार पार्नमा अथक परिश्रम गर्नु हुने बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतद्वय डा. फणीन्द्रराज देवकोटा, मनोज पोखेल र बाली संरक्षण अधिकृत सुति आचार्य, लगायत केन्द्रका सबै कर्मचारीहरूका साथै आवश्यक विवरणहरू उपलब्ध गराइ सहयोग गर्नुहुने व्यक्ति, संस्था तथा कार्यालयहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस पुस्तिकालाई अझै परिस्कृत र गुणस्तरिय बनाउन यहाँहरूको सुझावहरूको अपेक्षा गर्दछु ।


सहदेव प्रसाद हुमागाई
प्रमुख

विषय सूची

खण्ड क	
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६	१
जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० (पहिलो संशोधन २०६४ सहित)	१३
विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजतपत्र, सुरक्षित बिक्री वितरण, भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्यविधि, २०७१	१६
खण्ड ख	
विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका	२२
१. जीवनाशक विषदीको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन	२२
२. विषदी पञ्जीकरण (दर्ता) व्यवस्था र कार्यविधि	२४
३. विषादी खुद्रा विक्रेता, व्यावसायिक प्रयोगकर्ता संश्लेषणकर्तालाई इजाजतपत्र दिने कार्यविधि	२५
४. विषदीको सुरक्षित भण्डारण	२७
५. विषादी व्यवस्थापन प्रणाली	२७
६. विषादी छर्कने व्यवसायी इजाजतपत्र	२८
७. विषादी संश्लेषण इजाजत पत्र	२८
८. विषदी पञ्जीकरण व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि	२९
खण्ड ग	
विषादीका विविध पक्षहरू	४०
बिरुवामा रोग कीराहरूका कारणल हुने नोक्सानी	४०
१. विषादी	४१
२. विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापन र उद्देश्य	४२
३. नेपालमा विषादी प्रयोगको वर्तमान स्थिति	४३
४. अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति	४४
५. नेपालको प्रतिबद्धता	४५
६. आ.व. २०७७/२०७८ मा नेपालमा विषादी आयातको वितरण	४९
७. नेपालमा प्रतिबन्धित विषादीहरूको सूची (List of Banned Pesticides in Nepal)	४९
८. विषादीका वर्गीकरण	५०
९. विषादीको सबिन्यास वा रूप (Formulation)	५४
१०. जीवनाशक विषादीको सूचक पत्र (Label)	५६
११. विषादी कसरी मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ,	५७

१२. विषालुपना	५८
१३. विष लागेका लक्षणहरू र प्राथमिक उपचार	६०
१४. बाली विरुवामा जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोग	६५
१५. पर्खने समय अवधि र विषको अवशेष	६९
१६. मित्रजीव र विषादी	७२
१७. विषादी दुरुपयोगका कारणहरू र न्यूनिकरणका उपायहरू	७२
१८. एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आइ.पि.एम)	७४
१९. जैविक विषादी	७६
२०. आचार संहिताको कानुनी अवस्था र मान्यता	७८
२१. बाली उपचार शिविर	८१
२२. बाली उपचार शिविर (Plant Clinic) सम्बन्धी कार्यविधि	८२
२३. नेपालमा पञ्जीकृत विषादीहरूको सूची	८२
२४. विषादी पसलमा भ्रमण गरी प्रयोगात्मक अभ्यास निरीक्षण र छलफलमा ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू	८५
२५. बालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरू	८६
२६. बालीमा लाग्ने मुख्य हानिकारक कीराहरू र तिनको व्यवस्थापन	९३
२७. विषादी प्रयोगपछि र स्याद नाघेका विषादीको व्यस्थापन	९४
२८. तरकारी र फलफूलमा रासायनिक विषादीको अवशेष कम गर्ने उपायहरू	९५
२९. जीवनाशक विषादीको प्रयोगविधि	९९
३०. केही आर्थिक महत्वका कीरा तथा रोग पहिचान र व्यवस्थापन	१५२
- धानको खेरो फडुके कीरा व्यवस्थापन	१५६
- गोलभेडाको फलको गबारो व्यवस्थापन	१५७
- फर्सी समूहको तरकारीमा लाग्ने शिते दुसी रोग व्यवस्थापन	१५८
- गोलभेडाको पात खन्ने कीरा (<i>Tuta absoluta</i>)	१५९
- आलुको पुतली (<i>Phthorimaea operculella</i>)	१६०
- जरामा गाठा बनाउने रोग (<i>Root Knot Nematode - Meloidogyne spp.</i>)	१६०
- काँका फर्सीको सिते दुसी रोग (<i>Downy Mildew of cucurbits-Pseudoperonospora cubensis</i>)	१६१
- काँका फर्सीको खराने रोग (<i>Powdery mildew of cucurbits -Erysiphe cichoracearum</i>)	१६१
- जीवनाशक विषादीको सुरक्षित परिवहन, भण्डार र यसका मापदण्ड	१६२

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६

प्रमाणीकरण मिति
२०७६।०५।१३

संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ७

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री, वितरण, ओसारपसार, प्रयोग, विसर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वस्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्गीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

- १ संक्षित नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जीवनाशक विषादी व्यवस्थापना ऐन, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, -
 - क) “केन्द्र” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
 - ख) “घरेलु विषादी” भन्नाले कृषक स्तरमा घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनको लागि वनस्पतिजन्य र गहुँत, दूध लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट तयार गरिएको विषादी सम्झनु पर्छ ।
 - ग) “जीवनाशक विषादी” भन्नाले बोट बीरुवा, कृषिजन्य पदार्थ र वन तथा वन पैदावार जीव, पशुपन्थी, मानव स्वास्थ्य, भण्डारण, प्याकेजिङ र निर्माण कार्यमा हानी पुऱ्याउने रोग, कीरा, सुलसुले, निमाटोड, भारपात, मुसा लगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्रडगारिक, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका वस्तुलाई समेत जनाउँछ :-
 - १) हानिकारक जीवहरूको शिकार गरेर, परभक्षी बनेर, रोग लगाएर सोको वृद्धि कम गराउने तथा त्यस्ता जीवहरूलाई आकर्षण वा विकर्षण गर्ने वस्तु (फेरोमोन्स, एट्रयाक्टयान्ट, रिपेलेन्ट, डिरेन्ट),
 - २) हानिकारक जीवहरूको नियमित वृद्धि र प्रजनन् कार्यमा असर पर्ने वस्तु (इन्सेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, इन्हिवीटर),
 - ३) हानिकारक जीवहरूको नियमित वृद्धि नियन्त्रण गर्ने वस्तु (प्लान्ट ग्रोथ इन्हिवीटर),
 - ४) पात पतिडगर भर्ने वस्तु (डिफोलियन्ट),
 - ५) ओसिलोपन कम गर्ने तथा सुकाउने वस्तु (डेसिकेन्ट),
 - ६) फलफूल संख्या पतल्याउने वस्तु (थिनिड एजेन्ट),
 - ७) समय नपर्दै फलफूल भर्ने लगायतका समस्याको नियन्त्रण गर्ने वस्तु,
 - ८) कृषि बाली तथा कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालामा निसङ्कमण गर्न प्रयोग गरिने वस्तु (डिसइन्फेक्टेण्ट)
 - ९) “तोकियको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
 - १०) “निरीक्षक” भन्नाले दफा २४ बमोजिम नियुक्त जीवनाशक विषादी निरीक्षक सम्झनु पर्छ ।
 - ११) “प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादी” भन्नाले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, पञ्जीकरण, बिक्री, वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको विषादी सम्झनु पर्छ ।

- छ) “प्रमुख” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको केन्द्र प्रमुख सम्फतु पर्छ ।
- ज) “बोट विरुवा” भन्नाले जीवित वा वंश प्रसारणमा प्रयोग हुने वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोका, जरा, पात, फल, फूल, बीउ र जर्मप्लाज्म लगायत सम्फतु पर्छ ।
- ञ) “मिसावट गरिएको विषादी” भन्नाले विषादीमा हुनु पर्ने कुनै सक्रिय तत्व घटी वा वढी भएको, विषादीको प्रभावकारिता घटाउन थपिएको वस्तु वा विषादीको सूचकपत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिमको गुण, मात्रा वा विशेषता नभएको विषादी सम्फतु पर्छ ।
- ट) “बिरुवाजन्य पदार्थ” भन्नाले वनवस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोका, जरा, पात, फल, फूल, बीउबाट बनेको पदार्थ सम्फतु पर्छ र सो शब्दले मृत वनस्पति वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ ।
- ठ) “सक्रिय तत्व” भन्नाले विषादी संश्लेषण र उत्पादन गर्दा त्यसमा जैविक वा रासायनिक रूपमा सक्रिय रहेको तत्व (विषांश) सम्फतु पर्छ ।
- ड) “समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति सम्फतु पर्छ ।
- ढ) “सूचीकृत विषादी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले पञ्जीकरण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको विषादी सम्फतु पर्छ ।

परिच्छेद - २

जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण

३. जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गराउनु पर्ने :

- (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्व समेतको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ ।
- (२) उपदाफा (१) बमोजिम पञ्जीकरण गराउन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिए बमोजिमको विवरण र ढाँचामा प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत् वा सिद्धै केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदन तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरी तोकिएका शर्त पूरा भएको पाइएमा त्यस्तो जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गरी सोको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
- (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ ।
- (५) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
- (६) उपदफा (३) बमोजिम पञ्जीकरण गरिएका विषदीको नाम मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

४. पञ्जीकरण नगरिएका जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्न नहुने:

- (१) कसैले पनि दफा ३ बमोजिम पञ्जीकरण गरिएका बाहेका जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ लगायतका कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन ।
- (२) उपदाफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि केन्द्रको पूर्वस्वीकृति लिई जीवनाशक विषादी पैठारी गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५. पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्ने :

- (१) केन्द्रले देहायका अवस्थामा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्नेछ :
- क) पञ्जीकरण गरिएको जीवनाशक विषादीले मानिस, जीवजन्तु वा विरुवाको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको कारणले पञ्जीकरण कायम राख्न उचित नदेखिएमा,

- ख) जुन प्रयोजनको लागि विषादी पैठारी तथा संश्लेषण गरिएको हो सोको प्रयोग प्रभावकारी नभएमा,
- ग) जुन प्रयोजनको लागि विषादी पैठारी तथा संश्लेषण गरिएको हो, सोको गलत प्रयोग गरेमा,
- घ) पञ्जीकरण पश्चात राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै नकारात्मक असर पार्ने तथ्य फेला परेको वा परिस्थितिमा आएको कुनै परिवर्तनले गर्दा पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा,
- ङ) पञ्जीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा,
- च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका तथा मापदण्ड विपरीतको काम गरेको पाइएमा ।
- (२) पञ्जीकरण गरिएको विषादी खारेज वा निलम्बन गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६. जीवनाशक विषादीको पुनः पञ्जीकरण :
- (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (ड) र (च) का अवस्थामा बाहेक पञ्जीकरण प्रमाणपत्रको मान्यता समाप्त भएपछि पनि त्यस्ता जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा दफा ३ बमोजिम पञ्जीकरण गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पुनः पञ्जीकरणको लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
- (२) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन भएका जीवनाशक विषादीको हकमा त्यस्तो अवस्था विधमान नभएको आधारमा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई लागेमा पुनः पञ्जीकरणको लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
- (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम केन्द्र समक्ष पेश हुन आएको निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्दा तोकिए बमोजिमका आधारमा पुनः पञ्जीकरण गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा केन्द्रले त्यस्तो जीवनाशक विषादीको पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
- (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ ।
- (५) जीवनाशक विषादीको पुनः पञ्जीकरण गर्ने आधार, सोको लागि लाग्ने शुल्क तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७. पञ्जीकरण विषादीको नवीकरण:
- (१) दफा ३ र ६ बमोजिम पञ्जीकरण भएको जीवनाशक विषादीको म्याद समाप्त हुनु पैतिस दिन अगावै केन्द्र समक्ष नवीकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर छानबिन गर्दा मानसिब देखिएमा केन्द्रले अर्को तीन वर्षको लागि पञ्जीकरणको नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।
- (३) जीवनाशक विषादीको नवीकरण सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-३

इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

८. इजाजतपत्र लिनु पर्ने :

(१) पञ्जीकरण वा पुनःपञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, ओसार पसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ गर्न चाहने कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सो कार्य गर्नु पूर्व केन्द्रबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पूर्व केन्द्रले तोकिए बमोजिमको प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइने इजाजतपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैतिस दिन अगावै तोकिएको दस्तुर सहित सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले नवीकरणको लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन दिन नसक्ने इजाजतपत्रवालाले उपदफा (३) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको मितिको पन्थ दिनभित्र दोब्बर दस्तुर सहित इजाजतपत्रको नवीकरणको लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी केन्द्रले अर्को तीन वर्षको लागि इजाजतपत्रको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जीवनाशक विषादीको विक्री वितरण र छर्कने कार्यको इजाजतपत्र दफा ३ बमोजिम पञ्जीकरण गरिएको विषादीमध्ये विषादी विक्री वितरण तथा विषादी छर्कने व्यवसायको इजाजतपत्र प्रदान तथा सोको नवीकरण तथा खारेजी गर्न सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम नवीकरण नगारउने इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।

(९) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा, सोको लागि लाग्ने दस्तुर, प्रक्रिया, इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायको योग्यता र इजाजतपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने :

(१) कुनै इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा केन्द्रले जुनसुकै समयमा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि केन्द्रले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई पन्थ दिनको समय दिई इजाजतपत्र खारेज गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए पेश गर्नका लागि उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज हुन नपर्ने कुनै कारण पेश भएमा वा सो समयभित्र कुनै जानकारी प्राप्त हुन नआएमा केन्द्रले पन्थ दिनभित्रमा इजाजतपत्र खारेज सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धिमा इजाजतपत्रवालालाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र खारेजीको प्रारम्भ भई उपदफा (३) बमोजिम निर्णय नभएसम्मको अवधिमा उक्त इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

१०. प्रदेशबाट इजाजतपत्र लिनु पर्ने :

(१) पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक विषादीको विक्री, वितरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग तथा जीवनाशक विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-४

समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

११. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति :

(१) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय, सुभाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन एक जीवनाशक विषदी व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।

(२) समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् :-

क) सचिव, मन्त्रालय

- अध्यक्ष

- | | |
|--|--------------|
| ख) सहसचिव, वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय | - सदस्य |
| ग) महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग | - सदस्य |
| घ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् | - सदस्य |
| ङ) प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा विशेषज्ञ प्रतिनिधि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा | - सदस्य |
| च) विषादी विशेषज्ञ, वन विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ र उपभोक्ता कृषकहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना | - सदस्य |
| छ) विषादी व्यवसायीहरूमध्येबाट मन्त्रालयद्वारा मनोनित एकजना | - सदस्य |
| ज) उपसचिव (कानून), मन्त्रालय | - सदस्य |
| झ) प्रमुख | - सदस्य-सचिव |

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः एक पटकको लागि मनोनित हुन सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनित कुनै सदस्यले समितिको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा निजको पदावधि पूरा नहुँदै मन्त्रालयले निजलाई हटाउन सक्नेछ । तर यसरी हटाउनु अघि नीजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१२. समितिको बैठक र निर्णय :

- (१) समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एक पटक बस्नेछ ।
- (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
- (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
- (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (५) समितिको बैठकमा बहुमतले राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
- (६) समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ ।
- (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:

- (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
- (क) जीवनाशक विषादी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
- (ख) जैविक वनस्पतिजन्य तथा सुरक्षित रासायनिक विषादी उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न,
- (ग) जीवनाशक विषादीको गुणस्तर निर्धारण तथा विषादीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
- (घ) जीवनाशक विषादीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको अनुमोदन तथा कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
- (ङ) मानव, पशुपन्थी, जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावारण प्रतिकूल असर पार्ने जीवनाशक विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने,
- (च) निरीक्षक वा प्रमुखले गरेको निर्णय विरुद्धको उजुरी सुन्ने,
- (छ) कुनै पनि पदार्थ वा वस्तु विषादी भए वा नभएको सम्बन्धमा पहिचान गर्न, गराउने,
- (ज) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डहरू स्वीकृत गरी लागु गर्ने, गराउने,

- (भ) केन्द्र तथा उपसमितिलाई आवश्यकता अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,
 (ज) तोकीए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

(२) समितिले जीवनाशक विषादीको उत्पादन, सञ्चेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङको कार्यलाई सहज एवं सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सो उपसमिति गठन गर्दा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(४) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार केन्द्र, दफा ३९ बमोजिमको प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-५

पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र

१४. केन्द्र रहने :

- (१) जीवनाशक विषादीको नियन्त्रण, नियमन, पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत एक प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहनेछ ।
 (२) केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

१५. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार :

यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

- क) समितिको सचिवालयको रूपमा रही आवश्यक कार्य गर्ने,
- ख) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउने,
- ग) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने,
- घ) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण, पुनः पञ्जीकरण वा पञ्जीकरण विषादीको नवीकरण गर्नको लागि प्राप्त हुन आएका निवेदनहरू उपर छानबिन गर्ने,
- ड) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपत्र दिने तथा सोको नवीकरण गर्ने,
- च) जीवनाशक विषादी सम्बन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र दिने तथा सोको नवीकरण गर्ने,
- छ) जीवनाशक विषादीको प्रयोगको लागि तोकिए बमोजिमका पूर्वाधार तयार गर्ने,
- ज) विषादी प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको मापदण्ड तोक्ने,
- झ) समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने,
- ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१६. प्रमुख :

मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन प्रमुखको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

१७. प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार:

- (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
 (क) केन्द्रको प्रमुख भई कार्य गर्ने,

- (ख) जीवनाशक विषादीको गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भए नभएको अनुगमन तथा परिक्षण गरी वा गर्न लगाई मापदण्ड विपरित भएको पाइइमा कारबाही गर्ने,
- (ग) जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
- (घ) केन्द्रले सम्पादन गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
- (ङ) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
- (च) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।
- (२) प्रमुखले आफुमा रहेको अधिकार आवश्यकता अनुसार मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-६

जीवनाशक विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापन

१८. जीवनाशक विषादीको प्रयोग :

- (१) कसैले जीवनाशक विषादीको जथाभावी प्रयोग गर्न तथा त्यस्तो विषादीको अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नु हुदैन ।
- (२) मिसावट गरिएको वा कम गुणस्तरको जीवनाशक विषादी हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै कसैले पनि त्यस्तो विषादी बिक्री, वितरण, भण्डारण वा प्रयोग गर्नु, गराउनु हुदैन ।
- (३) जीवनाशक विषादीको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सुरक्षित जीवनाशक विषादी तथा सो विषादी प्रयोग र विसर्जन गर्दा लगाइने सुरक्षित पहिरन समेत बिक्रीको लागि राख्नु पर्नेछ ।
- (४) जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग भण्डारण वा बिक्री वितरण तथा ओसारपसार वा विसर्जन गर्दा तोकिए बमोजिम आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपानाउनु पर्नेछ ।
- (५) विषादी र खाघ पदार्थको भण्डारण र बिक्री अलग अलग स्थानबाट गर्नु पर्नेछ ।
- (६) यस ऐन बमोजिम जुन उद्देश्यको लागि जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
- (७) जीवनाशक विषादी पैठारी वा संश्लेषण गर्नुअघि सो विषादीको कन्टेनर र नेपालीमा लेखिएको सूचकपत्र र पर्चाको ढाँचा समेत केन्द्रबाट स्वीकृत गराएर मात्र प्रयोग गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।
- (८) जीवनाशक विषादीको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. घरेलु विषादीको प्रयोग :

यस ऐन बमोजिम घरेलु विषादीको उत्पादन र वितरण वातावरणमैत्री ढङ्गले गर्नु पर्नेछ । साथै सो विषादीको पञ्जीकरण, उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार र बिक्री वितरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२०. वनस्पतिजन्य र जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने :

मन्त्रालयले बाली, विरुवा, घर र भण्डारणमा लाग्ने विभिन्न रोग वा कीराको व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग हुने वनस्पतिजन्य र जैविक विषादी उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ ।

२१. जीवनाशक विषादी उत्पादन तथा संश्लेषण :

- (१) जीवनाशक विषादीको उत्पादन तथा संश्लेषण गर्दा मानव तथा पशु स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
- (२) विषादीको उत्पादन तथा संश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२२. जीवनाशक विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने :

- (१) समितिले केन्द्रको सिफारिसमा मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावारण प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जीवनाशक

विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग भण्डारण वा विक्री वितरण तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिम प्रतिबन्ध भएका जीवनाशक विषादीको नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) जीवनाशक विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२३. स्याद नाघेका जीवनाशक विषादीको व्यवस्थापन:

(१) आयातकर्ताले पैठारी गरेका कुनै जीवनाशक विषादीको अवधि समाप्त भएमा आफै खर्चमा सोको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

तर उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा विक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ गरेको जीवनाशक विषादीको हकमा उक्त विषादीमा उल्लिखित स्याद भुक्तान हुने अवधिभन्दा एक महिना अगावै सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगले सोको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकाय, व्यवसायी वा उचितमिले जीवनाशक विषादी सम्बन्धी कारोबार गर्दा तोकिए बमोजिम मापदण्डको अधीनमा यही स्याद नाघेका विषादीको व्यवस्थापन आफैले गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन गर्दा स्याद समाप्त भएको प्रतिबन्धित, टुटेफुटे वा चुहिएका जीवनाशक विषादी सम्बन्धित विषादी कम्पनी, उद्योग तथा व्याक्तिले पैठारीकर्ता मार्फत नै फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता विषादीलाई तत्काल भण्डारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता लैजाने तथा भण्डारण गर्न सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२४. निरीक्षक नियुक्त गर्ने :

(१) मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सो सरहको योग्यता पुरेका नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्गित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीलाई जीवनाशक विषादीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि जीवनाशक विषादी निरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सो सरहको योग्यता पुरेका कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जीवनाशक विषादीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि जीवनाशक विषादी निरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षक नियुक्त गरेको जानकारी सम्बन्धित प्रदेशले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

२५. निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

- क) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी समितिमा सिफारिस गर्ने,
- ख) जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपासार, प्याकिङ, पुनः प्याकिङ वा जीवनाशक विषादीको विज्ञापनको काम गरिने स्थानमा प्रवेश गरी आवधिक वा आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गरी समितिमा सिफारिस गर्ने,
- ग) अनुगमनको क्रममा मिसावट गरिएको वा कम गुणस्तरको जीवनाशक विषादी भेटिएमा त्यस्तो विषादीको विक्री वितरण रोक्का राख्ने वा वितरण कक्षमा सिलबन्धी गर्ने,
- घ) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायमा रहेका जीवनाशक विषादीसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र, अभिलेख लगायतका कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन विश्लेषण गर्ने ,

- (ङ) तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई जीवनाशक विषादी तथा बालीको नमूना सङ्कलन विश्लेषण गर्ने, गराउने,
- (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन भएको शङ्खा लागेमा सोको अनुसन्धान गर्ने, गराउने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्र समक्ष पेश गर्ने,
- (छ) खण्ड (च) बमोजिम अनुसन्धान गर्दा ऐन तथा नियामावलीको उल्लङ्घन भएको पाइएमा त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको उपकरण, जीवनाशक विषादी, अभिलेख, कागपत्र वा अन्य सम्बन्धित सामग्री जफत गरी सम्बन्धित उल्लङ्घनकर्ता व्यक्तिलाई जफतको भरपाई दिने,
- (ज) खण्ड (६) बमोजिम जफत गरीएका जीवनाशक विषादीको सुरक्षित तबरले भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने
- (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
- (२) दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले आफुले सम्पादन गरेका कामको चौमासिक प्रतिवेदन केन्द्र र दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले आफुले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२६. नमूना सङ्कलन गर्ने :

- (१) केन्द्रले जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि नमूना सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।
- (२) जीवनाशक विषादीको नमूना सङ्कलन र विश्लेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. प्रयोगशालाको स्थापना :

- (१) जीवनाशक विषादीको गुणस्तर तथा अनुसन्धानात्मक परीक्षण लगायतका कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले जीवनाशक विषादी सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।
- (२) मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी प्रदेश सरकारले विषादी सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।
- (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले हाल नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका वा निजीस्तरमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहरेको मान्यताप्राप्त प्रयोगशालालाई उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रयोगशालाको रूपमा काम गर्ने गरी तोकन सक्नेछ ।

२८. पञ्जीकरण नगरिएका तथा प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीको प्रचार प्रसार गर्न नहुने:

कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले पञ्जीकरण नगरिएको तथा प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीका बारेमा गलत भ्रामक विवरण उल्लेख गर्न तथा कुनै अर्को जीवनाशक विषादीसँग भ्रम पर्ने तथा भुक्याउने नियतले प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन ।

२९. विषादी विसर्जन गर्ने :

- (१) जीवनाशक विषादीको विसर्जन गर्दा मानव, पशुपन्थी, जलचर, बोट विस्वाको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।
- (२) जीवनाशक विषादी, विषादीजन्य फोहोर तथा सोको कन्टेनर नष्ट गर्नु पर्दा सो वस्तुको प्रकृतिका आधारमा छुटाछुटै विसर्जन गर्नु पर्नेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिम जीवनाशक विषादीको नष्ट गर्ने तरिका र मापदण्ड समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३०. अभिलेख राख्नु पर्ने :

- (१) जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा विक्री वितरण, ओसारपसार तथा विसर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफुले कारोबार गरेको विषादीको परिमाण, मूल्य तथा तोकिएको अन्य विवरण सहितको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार गर्दा राखिएको अभिलेख निरीक्षक, प्रमुख वा केन्द्रले माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

- (३) जीवनाशक विषादीको अभिलेख राखे सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३१. आचार संहिता बनाउन सक्ने :

- (१) केन्द्रले समितिको स्वीकृति लिई जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा विक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा निकायले पालन गर्नु पर्ने गरी आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
- (२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजिम बनाएको आचार संहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश भित्रका जीवनाशक विषादीको विक्री वितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोगकर्ता र थोक तथा खुद्रा विक्रेताले पालना गर्नु पर्ने गरी आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - ७

कसूर, सजाय तथा क्षतीपूर्ति

३२. कसूर गरेको मानिने :

कसैले देहाय बमोजिमका कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ :-

- (क) दफा ४ विपरित पञ्जीकरण नगरिएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात, निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग वा विसर्जन गरेमा,
- (ख) दफा ८ विपरित इजाजतपत्र नलिई जीवनाशक विषादी सम्बन्धी कारोबार गरेमा,
- (ग) दफा १८ वितरीत जीवनाशक विषादीको अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा विक्री वितरण गरेमा वा मिसावट गरिएको विषादी विक्री वितरण गरेमा,
- (घ) दफा १८ विपरीत विषादीको जथाभावी प्रयोग वा मिसावटयुक्त विषादीको प्रयोग गरेमा,
- (ङ) दफा २२ विपरीत प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग पुनः प्याकिङ्ग वा विसर्जन सम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे, गराएमा,
- (च) दफा २३ विपरित स्पाद नधेका जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नगरी बेचबिखन गरेमा,
- (छ) दफा २८, २९ र ३० विपरित कार्य गरेमा,
- (ज) मापदण्ड पूरा नभएको वा नकली जीवनाशक विषादीको प्रयोग वा कारोबार गरेमा,
- (झ) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन मा अवरोध पुऱ्याउने,
- (ञ) वातावरणीय प्रदुषण हुने गरी जीवनाशक विषादीको प्रयोग गरेमा,
- (ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरे, गराएमा ।

३३. दण्ड जरिवाना: दफा ३२ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा देहाय बमोजिम दण्ड जरिवाना हुनेछ :-

- (क) खण्ड (क) बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,
- (ख) खण्ड (ख) बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा दश हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,
- (ग) खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,
- (घ) खण्ड (घ) बमोजिम कसूर गरेमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ङ) खण्ड (ङ) बमोजिम कसूर गरेमा पचास हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

- (च) खण्ड (च), (छ), (ज), (भ), (ञ) र (ट) बमोजिम कसूर गरेमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ।
३४. मुद्राको अनुसन्धान र दायरी :
- (१) यस ऐन बमोजिमको मुद्राको अनुसन्धान तथा तहकिकात दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको निरीक्षकले गर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य समाप्त भएपछि निरीक्षकले सरकारी वकीलको राय लिई मुद्रा चलाउने निर्णय गरेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्रा दायर गर्नु पर्नेछ ।
३५. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यावस्था :
- विषादी उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, मिसावट, ढुवानी, व्यावसायिक प्रयोग, बिक्री वितरण तथा भण्डारणको प्रयोग वा विसर्जन गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले पीडितलाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
- तर दफा ३२ बमोजिमको कसूर गरेको मनिने कार्य गरेको कारणबाट कुनै प्रकारको क्षति पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिइने छैन ।
३६. जफत गरिने :
- (१) दफा ३३ बमोजिम दण्ड जरिवाना भएमा उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुन : प्याकिङ गरिएको जीवनाशक विषादीलाई समेत जफत गरिनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले जफत गरिएको विषादी मुद्राको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्तो विषादीको सुरक्षित भण्डारण तथा विसर्जन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित जीवनाशक विषादी धनीले नै बेहोर्नु पर्नेछ ।
३७. नेपाल सरकार वादी हुने :
- यस ऐन अन्तर्गतको मुद्रामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
३८. पुनरावेदन गर्न सक्ने :
- (१) निरीक्षक वा प्रमुखले गरेको निर्णयमा चित नबुझ्ने पक्षले उक्त निर्णय भएको मितिले पैतिस दिनभित्र समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
- (२) यस ऐन बमोजिम कसूर सम्बन्धी मुद्रामा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर चित नबुझ्ने पक्षले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
३९. प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति :
- (१) जीवनाशक विषादीको बिक्री वितरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग र विषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने र सो कार्यको अनुगमन गर्ने, मन्त्रालयबाट तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न लगाउने लगायतका विषादी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
४०. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था :
- (१) जीवनाशक विषादी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन गर्न जिम्मेवारी केन्द्रको हुनेछ ।
- (२) प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिले प्रदेशमा रहेका जीवनाशक विषादी सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेतौ मन्त्रालय र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
- तर प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिको गठन नभएको अवस्थामा समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिन सम्बन्धित निकाय वा अधिकृतलाई तोकन सक्नेछ ।

४१. सहयोग गर्नु पर्ने :

- (१) निरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा सुरक्षा लगायतका कुनै सहयोग आवश्यक भएमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्न सक्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ ।

४२. भण्डारण गृह बनाउनु पर्ने :

नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा जफत गरिएका विषादीको भण्डारण गर्ने र विभिन्न कारणले प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिका जीवनाशक विषादीको सुरक्षित विसर्जन नगरेसम्मका लागि सुरक्षित राख्न भण्डारण गृहको निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

४३. विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने :

रासायनिक विषादीको प्रयोगबाट वातावरण तथा मानव, पशुपन्थी, जलचर, बिरुवा लगायतका स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले विकल्पमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

४४. नियम बनाउने अधिकार :

यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

४५. निर्देशिका, कार्यक्रम तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने :

यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

४६. खारेजी र बचाउ :

- (१) जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।
- (२) जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० (पहिलो संशोधन २०६४ सहित)

जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १द ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यी नियमहरूको नाम “जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०” रहेको छ।

(२) यो नियमावली ऐन लागु भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,

(क) “ऐन” भन्नाले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ।

(ख) “कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना भएको कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ग) “कन्टेनर” भन्नाले विषादीलाई राख्न, छोप्न, बन्द गर्न, समावेश गर्न वा प्याक गर्नलाई प्रयोग गरिने भाँडो वा बट्टा वा पोका सम्झनु पर्छ।

(घ) “सूचकपत्र (लेवल)” भन्नाले विषादी वा विषादी राखिएको कन्टेनर वा कन्टेनरको बाहिरी भागमा वा विषादीको पोकामा लेखिएको, छापिएको वा रेखाइक गरिएको विषादी सम्बन्धी सूचना सम्झनु पर्छ।

(ङ) “निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिम नियुक्ति विषादी निरीक्षक सम्झनुपर्छ।

३. विषादी पञ्जीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने :

(१) कुनै विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति/संस्था वा निकायले त्यस्तो कार्य गर्नु अघि त्यस्तो विषादीलाई ऐनको दफा ९ बमोजिम पञ्जीकरण गराउनको लागि समितिले तोकिदिएको ढाँचामा पञ्जीकरण दस्तुर एकहजार रुपैयाँ समेत संलग्न राखी कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषादी पञ्जीकरण गर्न निवेदन दिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पञ्जीकरणको सम्बन्धमा कार्यालयले मागेको विषादीसँग सम्बन्धित आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य जानकारीहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

४. विषादी पञ्जीकरण गर्ने :

(१) नियम ३ बमोजिम विषादी पञ्जीकरण गराउनको लागि कुनै निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो विषादीबाट मानिस वा पशुपक्षीलाई वा पर्यायवरणमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी बिना कुनै शर्त वा शर्त सहित पञ्जीकरण गरी निवेदकलाई समितिले तोकिदिएको ढाँचामा विषादी पञ्जीकरणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको विषादी पञ्जीकरण प्रमाणपत्रको मान्यता अवधि पाँच वर्ष हुनेछ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्यालयले विषादी पञ्जीकरण गर्ने सम्बन्धमा निवेदकहरूसँग मागेको विषादीसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू प्राप्त नहुञ्जेलसम्म विषादी पञ्जीकरण गर्ने छैन।

५. विषादी पञ्जीकरण गर्न इन्कार गर्न सक्ने :

(१) कुनै विषादी पञ्जीकरण गर्न निवेदन दिने निवेदकले नेपाल अधिराज्यमा त्यस्तो विषादीको उपयोगको आवश्यकता प्रमाणित गर्न नसकेमा वा कार्यालयको दृष्टिकोणमा त्यस्तो विषादीको उपयोगले मानिस वा पशुपक्षीलाई वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना देखेमा सोको कारण उल्लेख गरी कार्यालयले त्यस्तो विषादीको पञ्जीकरण गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयले कुनै विषादी पञ्जीकरण गर्न इन्कार गरेमा त्यस्को कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गर्ने निवेदकले त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न समिति समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिन सक्नेछ, र त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

६. विषादीको पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्ने : समितिको दृष्टिकोणमा नियम ४ बमोजिम पञ्जीकरण भएको विषादीको निरन्तर प्रयोग अप्रभावकारी ठहरिएमा वा त्यस्तो विषादीको सामान्य प्रयोगबाट पनि मानिस वा पशुपक्षीलाई वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भएमा समितिले जुनसुकै समयमा पनि त्यस्तो विषादीको पञ्जीकरण खारेज

गर्न वा कुनै खास समयसम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ। त्यसरी खारेज वा निलम्बन गरिएको कुराको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।

७. विषादी पैठारीको विवरण पेश गर्नुपर्ने :

- (१) विषादी पैठारी गर्न इजाजत प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायले एक आर्थिक वर्षमा पैठारी गरेको विषादी, त्यस्को परिमाण र मूल्य समेत उल्लेख गरी समितिले तोकिदिएको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वा समितिले माग गरेमा सो भन्दा अगावै कार्यालय समक्ष विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम पैठारीकर्ताले विषादी पैठारीको विवरण नदिएमा त्यस्तो विषादीको पञ्जीकरण कार्यालयको सिफारिशमा समितिले रद्द गर्न सक्नेछ।

८. कन्टेनर र सूचकपत्रको स्वीकृति :

- (१) कुनै पनि विषादी बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले कन्टेनर र सूचकपत्रको स्वीकृतिको लागि कन्टेनर र सूचकपत्रको नमूना समेत संलग्न राखी समितिले तोकिदिएको ढाँचामा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले समितिले तोकिदिएको स्तर अनुरूप कन्टेनर भए नभएको र सूचकपत्रमा उल्लेख गरिनु पर्न सबै कुरा उल्लेख भए नभएको यकीन गरी कन्टेनर र सूचकपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

९. बिक्री वितरण गर्न नहुने :

- (१) वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि पैठारी गरिएको विषादी बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन।
- (२) कुनै पनि विषादी कार्यालयबाट स्वीकृत कन्टेनरमा नराखी बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन।
- (३) कुनै पनि विषादी कार्यालयबाट स्वीकृत सूचकपत्र नटाँसेको कन्टेनरमा राखी बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन।

१०. इजाजतपत्र लिनुपर्ने : कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले विषादी बिक्री गर्न, संश्लेषण गर्न वा छर्कने व्यवसाय गर्न चाहेमा समितिबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।

११. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने : कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले नियम १० बमोजिम इजाजतपत्र लिन चाहेमा समितिले तोकिदिएको ढाँचामा विषादिको खुद्रा बिक्रेताको लागि इजाजतपत्र दस्तुर पाँच सय रुपैयाँ, विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजतपत्रको लागि पाँच हजार रुपैयाँ र विषादी संश्लेषण गर्न इजाजत पत्रको लागि दश हजार रुपैयाँ समेत संलग्न राखी समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

१२. विषादीको खुद्रा बिक्रेतालाई इजाजतपत्र दिने :

- (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले विषादीको खुद्रा बिक्री गर्नको लागि नियम ११ बमोजिम समिति समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएमा समितिले विषादी र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानको सम्बन्धमा निर्धारण गरेको मापदण्डका अधिनमा रही तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवुभ गरी इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा समितिले तोकेको ढाँचामा विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।
- (२) विषादीको खुद्रा बिक्रेताले इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्त र अवस्थाहरू पालन गर्नु पर्नेछ।

१३. विषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिने :

- (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले व्यवसायिक रूपमा विषादी छर्कनको लागि नियम ११ बमोजिम समिति समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएमा समितिले विषादी प्रयोगका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको मापदण्डका अधिनमा रही तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवुभ गरी इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा समितिले तोकेको ढाँचामा विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजत पत्र दिन सक्नेछ।
- (२) विषादी छर्कने व्यवसायीले इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्त र अवस्थाहरू पालन गर्नु पर्नेछ।

१४. विषादी संश्लेषण गर्नेलाई इजाजतपत्र दिने :

- (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले विषादी संश्लेषण गर्नको लागि नियम ११ बमोजिम समिति समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएमा समितिले विषादी संश्लेषणका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको मापदण्डको अधिनमा रही तत्

सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा समितिले तोकेको ढाँचामा विषादी संश्लेषण गर्ने इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।

(२) विषादी संश्लेषण गर्नेले इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्त र अवस्थाहरू पालना गर्नु पर्नेछ ।

१५. इजाजतपत्रको मान्यताको अवधि र नवीकरण :

(१) नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको मान्यताको अवधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र नवीकरण दस्तुर बापत विषादीको खुद्रा विक्रेताको इजाजत पत्रको लागि दुई सय रुपैयाँ, विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजतपत्रको लागि एक हजार रुपैयाँ र विषादी संश्लेषण गर्ने इजाजत पत्रको लागि दुईहजार रुपैयाँ संलग्न गरी नवीकरणको लागि समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको स्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा बिलम्ब शुल्क बापत विषादी खुद्रा विक्रेताको इजाजतपत्रको लागि थप तीन सय रुपैयाँ, विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजतपत्रको लागि थप एक हजार पाच सय रुपैयाँ र विषादी संश्लेषण गर्ने इजाजतपत्रको लागि थप तीन हजार रुपैयाँ लिई नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । यसरी नवीकरण गरिएको इजाजतपत्रको मान्यताको अवधि २ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको अवधि भित्र नवीकरण नगराईका इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछन् ।

१६. इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने :

नियम १२, १३ वा १४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू पूरा नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र समितिले रद्द गर्न सक्नेछ ।

१७. विषादी निरीक्षकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने :

(१) ऐनको दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएका विषादी निरीक्षकहरूको पहिचानको लागि नेपाल सरकारले निजहरूलाई कर्मचारी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ ।

(२) ऐन र यस नियमावली बमोजिम निरीक्षकले आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दा वा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा कसैले निजको परिचयपत्र हेन खोजेमा उप-नियम (१) बमोजिम निजले प्राप्त गरेको कर्मचारी परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ ।

१८. निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) निरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सम्बन्धमा जुनसुकै समयमा कुनै घर, जग्गा, सवारी, हवाईजहाज, कारखाना, वाणिज्य केन्द्र, भण्डार, टहरा आदिमा प्रवेश गरी कुनै पनि कागजात वा अभिलेखको जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) ऐन र यस नियमावलीको व्यवस्थाको विपरीत कसैले विषादी पैठारी वा बिक्री गरेमा निरीक्षकले त्यस्तो विषादी आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ ।

१९. उप-समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा वैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

(१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम गठित उप-समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) विषादीको आयात, निर्यात, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि समितिलाई आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गराउने ।

(ख) विषादीको आयात, निर्यात, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न समितिले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(२) उप-समितिहरूको वैठकसम्बन्धी कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२०. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : ऐन र यस नियमावलीको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न समितिले आवश्यकतानुसार विषादीसँग सम्बन्धित कुराहरूका सम्बन्धमा निर्देशिका बनाइ जारी गर्न सक्नेछ र त्यसरी जारी गरिएको निर्देशिकाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति : २०६४।६।१४ (पहिलो संशोधन) (भाग ३, खण्ड ५७, संख्या २५)

विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजतपत्र, सुरक्षित बिक्री वितरण, भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्यविधि, २०७१

पृष्ठभूमि

विषादीको आयात, निर्यात, उत्पादन, खुद्रा विक्री वितरण, विषादी छक्कने र संश्लेषणका लागि गरिने पञ्जिकरण तथा इजाजत पत्र प्रदानको विषय एक संवेदनशिल विषय हो । विषादीको दुरुपयोग व्यवस्थापन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई थप जिम्मेवार र दक्ष वनाउनु जरुरी छ । विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन तथा सर्वेक्षणले विषादी प्रयोग सम्बन्ध सल्लाह र सिफारीसमा विषादी खुद्रा विक्रेताको भूमिका अग्रणी रहको छ । कृषकको पहुँच प्राविधिक भन्दा पनि सजिलै विषादी खुद्रा विक्रेता संग हुने हुँदा विषादीको समुचित र सुरक्षित प्रयोगको लागि विषादी खुद्रा विक्रेतालाई थप प्राविधिक ज्ञान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । हाल भईरहेको ३ दिनको खुद्रा विक्रेता तालिमले विषादी व्यवस्थापनका सम्पूर्ण विषयहरु लाई समेट्न नसक्नेहुदा यो कार्यविधि तयार गरि नयाँ र अति आवश्यक विषय वस्तु तयार गरि तालिम अवधि ६ दिन कायम गरिएको छ । द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषणवाट प्राप्त नितजा हेर्दा कृषकले विषादी प्रयोग पर्खनु पर्ने समय अवधि वारेमा विक्रेताहरु पनि अनभिज्ञ रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कार्यविधि तयार गरिएको छ । यस कार्यविधिको कार्यान्वयनले विषादी विक्री वितरण गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको विषादीको सुरक्षित विक्री वितरण, भण्डारण एवम् प्रयोग सर्वान्ध क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै खुद्राविक्रेता इजाजत पत्र प्रदान गर्ने कार्य थप मर्यादित र व्यवस्थित हुनेछ । विषादी व्यवस्थापनमा विषादी खुद्राविक्रेताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा विषादी विक्रेतालाई थप उत्तरदायी र जिम्मेवार वनाउनु नितान्त जरुरी भएकोले विषादीको न्यायोचित एवम् प्रभावकारी प्रयोग भई वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा जीवनाशक विषादी ऐन २०४८, जीवनाशक विषादी नियमावली २०५०(पहिलो संशोधन २०६४) अनुसार विषादी विक्री वितरण लाई थप व्यवस्थित वनाउन र विषादी व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि यस विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्र, सुरक्षित विक्री वितरण, भण्डारण एवम् प्रयोग संचालन कार्यविधि २०७१ जारी गरिएको छ ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यो कार्यविधिको नाम “विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्र, सुरक्षित विक्री वितरण, भण्डारण एवम् प्रयोग संचालन कार्यविधि, २०७१” रहेको छ ।

(२) यो कार्यविधि कृषि विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा :

(क) “ऐन” भन्नाले जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ सम्झनु पर्छ ।

(ख) “विषादी” भन्नाले विजु, विरुवा, रुख, पशु, पंछी आदिमा लाग्ने घातक किटाणुहरु नाश गर्न प्रयोग गरिने जीवनाशक विषादी (पेस्टीसाइड्स) सम्झनु पर्छ ।

(ग) “निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिम नियुक्ति विषादी निरीक्षक सम्झनु पर्छ ।

३. उद्देश्य : यस कार्यविधिको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ :

(क) विद्यमान विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रूयालाई परिमार्जित गर्ने



नेपाल सरकार
कृषि विकास
मिनिस्ट्री

(ख) विषादी खुद्रा विक्रेताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने

(ग) विषादी खुद्रा विक्रेतालाई विषादि व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्ने

परिच्छेद २

कार्यक्रम संचालन प्रकृया

४. सञ्चालन प्रक्रिया : यस कार्यक्रम देहाय बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ :

(क) विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि तालिम अवधि ६ दिनको हुनेछ। प्रत्येक दिन ४ कक्षाका दरले जम्मा २४ कक्षा संचालन हुनेछ। तालिमको पाठ्यक्रम अनुसूचि - १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(ख) विषादी खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र लिन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा निवेदन, नागरिकताको फोटोकपि सहित आफ्नो विवरण शैक्षिक योग्यता खुलाई बुझाउनु पर्नेछ। ईजाजत पत्र लिन चाहने व्यक्ती अग्रेजी राम्रो संग पढ्न सक्ने हुनु पर्नेछ। विषादी निरीक्षकले निवेदन उपर जाच्वुङ्ग गरि उपयुक्त उम्मेदवार देखेमा तालिममा सहभागी गराउनेछ। यदि निवेदक अनुपयुक्त भएमा सोको कारण लेखी निवेदक लाई जानकारी दिईने छ।

(ग) सम्बन्धित जिल्लाको विषादी निरीक्षकको संयोजकत्वमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तालिम संचालन गर्नु पर्नेछ।

(घ) तालिममा सहभागी सब्धा २० देखि अधिकतम् २५ जना हुनुपर्ने छ। यदि एक जिल्लामा सो भन्दा कम भएमा छिमेकी जिल्लाका विषादी खुद्रा विक्रेतालाई पनि समावेश गर्न सकिने छ।

(ङ) इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि निवेदक व्यक्ति अनिवार्य रूपमा तालिम अवधिभर तालिममा सहभागी भई तालिम पश्चात लिईने परीक्षामा उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ। उत्तिर्ण हुनलाई पूर्णाङ्ग १०० मा ४० प्राताङ्ग हुनु पर्नेछ।

(च) परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र विषादी पर्जिकरण का वाली संरक्षण अधिकृतले तयार गरि विषादी रजिष्टराको स्विकृतीमा सिलवन्दी सहित जिल्लामा पठाउने र जाचैं पछि तुरुन्त सम्बन्धित जिल्लाको विषादी निरीक्षकले सिलवन्दी गरि विषादी पर्जिकरण तथा व्यवस्थापन शाखामा पठाउनु पर्नेछ। प्रश्नपत्रको जाचैं विषादी पर्जिकरणको जिम्मेवार अधिकृतले गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार समयानुकूल प्रश्नपत्रमा परिमार्जन हुडै जाने छ।

(च) विषादी खुद्रा विक्रेता ले विषादी विक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा पर्खनु पर्ने अवधि विषादी को वटा वा अनुसूची - २ मा निर्धारित पर्चामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(छ) विषादी खुद्रा विक्रेता को इजाजत पत्र प्राप्त गरि विषादी कारोबार गरिरहेका विक्रेताको हकमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि माग र आवश्यकताको आधारमा ३ दिनको पूर्णताजगी तालिम कार्यक्रममा राखी अनुसूची - ३, अनुसूची - ४, को तालिम तालिका अनुसार संचालन गर्न सकिनेछ। विषादी कारोबारमा ५ वर्ष पुगेका खुद्रा विक्रेतालाई अनिवार्य रूपमा तालिममा सहभागि हुने व्यवस्था विषादी निरीक्षकले गर्नु पर्नेछ। सहभागि लाई प्रमाण पत्र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रदान गर्नेछ।

(ज) तालिममा समावेश हुने सहभागिलाई तालिम भत्ता एवम् भ्रमण खर्च को व्यवस्था हुने छैन।



- (भ) तालिम संयोजक, प्रशिक्षक भत्ता, स्टेसनरी खर्च, खाजा खर्च प्रचलित नर्मस अनुसार हुनेछ ।
- (न) तालिमको लागि प्रशिक्षक आवश्यक भएको खण्डमा छिमेकी जिल्लाको विषादी निरीक्षक वा क्षेत्रीय वाली संरक्षण प्रयोगशालाको वाली संरक्षण अधिकृतलाई प्रशिक्षकको रूपमा लिन सकिनेछ ।
- (ट) प्रश्नपत्र (पुर्णाङ्क १००) तयार गर्दा रु ५०० र उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रति पुस्तिका रु २५ का दरले रहने छ ।

परिच्छेद - ३

विविध

५. अनुगमन / मुल्याङ्कन :

कार्यक्रमको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, विषादी पञ्जिकरण तथा व्यवस्थापन शाखा एवम वाली संरक्षण निर्देशनालयबाट अनुगमन मुल्याङ्कन हुन सक्नेछ । अनुगमन प्रतिवेदनको एक प्रति विषादी पञ्जिकरण तथा व्यवस्थापन शाखामा अभिलेखको लागि दिनु पर्नेछ ।

६. बाधा अडकाउ फुकाउ

यो कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा पर्न आएका बाधा अडकाउहरु ऐन अनुसार गठन भएको प्राविधिक उप-समीतिले फुकाउन सक्नेछ ।

७. संशोधन र खारेजी

यो कार्यविधिमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार संशोधन र खारेजी गर्न सक्नेछ ।

अनुसुचि १

(दफा ४को खण्ड क संग संबन्धित)

तालिम तालिका

क्र स	समय	विषयवस्तु	कैफियत
१ (पहिलो दिन)	१०:०० –१०:३०	नाम दर्ता/कार्यक्रम वारे जानकारी	
	१०:३०–१२:००	विषादी वारे जानकारी (परिभाषा, विश्व र नेपालमा यसको इतिहास)	
	१२:००–१:३०	जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८	
	१:३० –२:००	खाजा चिया	
	२:००–३:३०	जीवनाशक विषादी नियमावली र विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७०	
	३:३० –५:००	जीवनाशक विषादी र तिनका प्रकार	
२ (दोस्रो दिन)	१०:००–११:३०	विषादीको विषालुपन र यसका आधारमा विषादीको वर्गिकरण	WHO classification and LD 50

	११:३० -१:००	नेपालमा पंजिकृत विषादी विवरण र प्रतिवन्धित विषादी वारे जानकारी	
	१:०० -१:३०	खाजा चिया	
	१:३० -३:००	विषादी खुद्राविक्रेता, व्यावसायिक प्रयोगकर्ता, सश्लेषणकर्तालाई इजाजत पत्र दिने कार्यविधि	
	३:०० -४:३०	विषादीको संश्लेषण, विषादी प्रयोग वारे जानकारी ..	
३ तेस्रो दिन	१०:०० -११:३०	विषादीको सुचक पत्रासंकेत र शब्दहरू प्राविधिक नाम, व्यापारीक नाम, विषालुपना, सावधानि	
	११:३० - १:००	विषादी र बातावरण (Bio accumulation, Bio magnification, Effect on tropic level and food chain)	
	१:०० -१ :३०	खाजा चिया	
	१:३० - ४:३०	विषादी खुद्रा विक्रेता पसलमा भ्रमण र अवस्थाको वारेमा प्रयोगात्मक अभ्यास (अनुसुचि ४)	
४ चौथो दिन	१०:००-११:३०	बाली उपचार शिविर आवश्यकता, संचालन प्रक्रिया र विकास क्रम	
	११:३० -१:००	रोगको क्षति पहिचान र व्यवस्थापन	
	१:०० -१:३०	खाजा	
	१:३० -३:००	हानिकारक किराको क्षति पहिचान र व्यवस्थापन	
	३:०० -४:३०	एकिकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन	
५ पाचौ दिन	१०:००-११:३०	विषादी खुद्रा विक्रेताको लागि सुरक्षा, सुरक्षित विक्री वितरण, प्रयोग र भण्डारण	
	११:३० -१:००	जैविक विषादी को प्रयोग विधि, भण्डारण र शत्रुजिव व्यवस्थापन	
	१:०० -१:३०	खाजा	
	१:३० -३:००	विषादीको दुरुपयोग र दुरुपयोग व्यवस्थापनमा, पर्खने समयको अवलम्बन एवम सरोकार निकायको भूमिका	
	३:०० -४:३०	विषादीजन्य दुर्घटना र तिनवाट बच्चे उपायहरू	
६ छैटौ दिन	१०:००-११:३०	लाभदायक किरामा विषादीको असर (शुक्रम जिवाणु, मौरी, परागसेचित कीरा आदिमा)	
	११:३० -१:००	विष लागेको लक्षण र प्राथमिक उपचार	
	१:०० -१:३०	खाजा	
	१:३० -३:००	Date expiry pesticide disposal technique	
	३:००-४:३०	परिक्षा संचालन र कार्यक्रम समापन	

अनुसूचि २

(दफा ४ को खण्ड च संग संबंधित)

विषादी खुद्रा विक्रेताले विषादी संगै कृषकलाई दिनु पर्ने पर्चाको नमूना

क्र स	विवरण
१	विषादीको व्यापारी नाम :
२	प्रभावकारी हुने कुन रोग, कीरा वा भारपात
३	प्रयोग मात्रा र प्रयोग विधि:
४	प्रखनु पर्ने समय :
५	अन्य

अनुसूचि ३

(दफा ४ को खण्ड छ, संग संबंधित)

पुनर्ताजगी तालिम तालिका

क्र स	समय	विषयवस्तु	कैफियत
१ (पहिलो दिन)	१०:०० -१०:३०	नाम दर्ता/कार्यक्रम बारे जानकारी (खुद्रा विक्रेताको समस्या संकलन)	
	१०:३०-१२:००	जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ जीवनाशक विषादी नियमावली र विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७०	
	१२:००-१:३०	जीवनाशक विषादी र तिनका प्रकार	
	१:३० -२:००	खाजा चिया	
	२:००-३:३०	विषादीको विषालुपन र यसका आधारमा विषादीको वर्गीकरण	WHO classification and LD 50
	३:३० -५:००	विषादी र वातावरण (Bio accumulation, Bio magnification, Effect on trophic level and food chain)	
२ (दोस्रो दिन)	१०:००-११:३०	विषादी विक्रेताको समस्यामा आधारित व्यवस्थापन	
	११:३० -१:००	वाली उपचार शिविर परिचय, महत्व, सञ्चालन प्रक्रिया र विकास क्रम	
	१:०० -१:३०	खाजा चिया	
	१:३० -३:००	रोग किराको क्षति पहिचान र व्यवस्थापन	
	३:०० -४:३०	विषादी व्यवस्थापनमा एथोमेटको जिम्मेवारी र भूमिका	



३	तेस्रो दिन	१०:०० -११:३०	विषादीको सुचक पत्र(संकेत र शब्दहरू) प्रार्थिक नाम, व्यापारीक नाम, विषालुपना, सावधानि
		११:३० - १:००	जैविक विषादी को प्रयोग विधि, भण्डारण र एकिकृत शावृजव व्यवस्थापन
		१:०० - १:३०	खाजा चिया
		१:३० - ३:००	लाभदायक किरामा विषादीको असर (शुष्म जिवाणु, मौरी, परागसंचित कीरा आदिमा)
		३:०० - ४:३०	Date expiry pesticide disposal technique
		४:३०-५:००	कार्यक्रम समापन र प्रमाण पत्र वितरण

अनुसुचि ४

(दफा ४ को खण्ड छ संग संबंधित)

विषादी खुदा बिक्रीता तालिमको लागि प्रयोगात्मक अभ्यास तालिका

क्र स	विवरण /विषयवस्तु	विधि तरिका	कैफियत
१	खुदा बिक्रीताको इनाजत पत्र र पत्रमा उल्लिखित शर्त तथा नियकरण	सहभागिलाई देखाउने	
२	बिक्रीताको अवस्था	केश अध्ययन, छलफल	उपकरण देखाइ चिनाउने र कार्यवारेमा जानकारी गराउने
३	बिक्रीताको अनुभव	सहभागित्मक छलफल	विषादी बिक्री गर्दा भोग्नु पर्ने समस्याहरू,
४	क्षेत्रकाई दिने परामर्श तथा लिइने पृष्ठपोषण	सहभागित्मक छलफल	निरिक्षण एवम् अनुभव आदान प्रदान
५	पसलको निरिक्षण	अवलोकन	विषादी कसरी राखिएको छः विधि ठीक छ की छैन? के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छः ?
६	विषादीको Formulation मा आधारित वर्गीकरण	समुह अभ्यास	विभिन्न Formulation का विषादी देखाइ अभ्यास गराउने
७	विषादीका प्रकार	समुह अभ्यास	प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्न लगाउने
८	विषादीको सुचक पत्र	सम्पूर्ण संकेत एवम् पर्चा हेर्न लगाइ संकेतको जानकारी दिलाउने	व्यापारीक नाम, सामान्य नाम, संकेत (रातो, पहेलो निलो हारियो) प्रयोग विधि, सावधानीका संकेतहरू
९	जैविक विषादी र यसको भण्डारण	अवलोकन, छलफल	भण्डारणको अवस्था मूल्याङ्कन
१०	म्याद नार्थक विषादीको व्यवस्थापन	अवलोकन, छलफल	व्यापारीको अनुभव र तौरकार्ता जानकारी लिने
११	पसलको सम्पूर्ण निरिक्षण	अभ्यास, छलफल र प्रस्तुती	प्रत्येक सहभागिलाई निरिक्षण का कममा देखिएका रामा नरामा पक्षको मूल्याङ्कन गराइ के मा सुधार गर्नु पर्ने छ समुह अभ्यास र प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने

नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय

जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ को दफा ७ अनुसार विषादी पञ्जीकरण (दर्ता) गर्ने निकायको स्थापना र ऐनको दफा १३ अनुसार विषादी निरीक्षकको नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५/०८/०२ को निर्णयले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई विषादी पञ्जीकरण (दर्ता) गर्ने निकाय र कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत बाली संरक्षण अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) लाई विषादी निरीक्षक वा सो जिल्लामा नभएमा छिमेकी जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत बाली संरक्षण अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) लाई विषादी निरीक्षक तोकेको छ। सो सम्बन्धिका कार्य गर्नमा आवश्यक सहयोगको लागि प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले सात वटै प्रदेशमा रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई मिति २०७५/०८/१८ को पत्रद्वारा अनुरोध गरिसकेको छ र सोहि अनुरुप काम हुँदै आईरहेको छ।



विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका

परिचय :

नेपालमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग गरिने विषादीहरूको नियमानुसार पञ्जीकरण गराई प्रमाणपत्र दिने र विषादीको संश्लेषण (Formulation), वा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा बिक्री वितरण गर्ने खुद्रा विक्रेताहरूलाई इजाजतपत्र दिई विषादी व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नु प्रस्तुत कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य हो ।

१. जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन

(क) जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोग

विषादीको उचित र सावधानीपूर्वक उपयोग नगरिएमा यसले उपयोगकर्ता, समुदायका मानिस, घर पालुवा पशुहरू, वन्यजन्तुहरू, लाभकारी कीराहरू र उपाभोक्तालाई समेत हानी पुऱ्याउनुको साथै जैविक विविधता र वातावरणलाई समेत नोक्सानी गर्दछ ।

१) सामान्य सिद्धान्त :

(क) अनावश्यक रूपमा विषादी उपयोग नगर्नुहोस् ।

(ख) सम्भावित खतराबाट सावधान हुनुहोस् ।

(ग) विषादीको लेवल र अन्य पर्चाहरू पढनुहोस् ।

(घ) केटाकेटीहरूलाई सधै विषादीबाट टाढा राख्नुहोस् ।

२) कीटनाशक विषादी उपयोग गर्नु अगाडी :

(क) विषादी सुरक्षित ठाउँमा तालावन्दी गरेर राख्नुपर्छ ।

(ख) स्प्रेयर/डस्टर राम्रो अवस्थामा हुनुपर्छ ।

(ग) उपकरणलाई काम गर्नु अघि र काम सकिएपछि जाँच गर्नुपर्छ ।

(घ) कम घातक (प्रति किलोग्राम ५०१ मिलिग्राम भन्दा माथि एल.डी. ५० भएको) सुरक्षित विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ ।

३) मिश्रण बनाउदा र छर्दा :

(क) सुरक्षात्मक पहिरन लगाउनु पर्दछ जस्तै : पूरा वाहुलाको एप्रोन, लामो पतलुङ्ग, जुता वा रबर वुट, चौडा किनारा भएको टोपी, हातमा रबरको पञ्जा, मास्क, कृत्रिम श्वास उपकरण आदि ।

(ख) चुरोट पिउन वा धुम्रपान गर्नु हुँदैन ।

(ग) विषादीको प्याकेट वा बिर्कोलाई सावधानीपूर्वक खोल्नुपर्छ । खोल्दा विषादी अन्य ठाउँमा फैलिन नपाओस् ।

(घ) हावाको वहाव कम भएको बेलामा छर्ने गर्नुपर्दछ ।

(ङ) बन्द भएको नोजललाई मुखले फुक्नु हुँदैन ।

(च) खानेकुरा खानु हुँदैन ।

४) जीवनाशक विषादी प्रयोग पश्चात :

(क) विषादी प्रयोग गरेका कागजी पदार्थलाई एकान्तमा (सुरक्षित स्थान जस्तै: पानीको मुहान नभएको स्थान, मानिस र चौपाया नजाने स्थान, मानव वस्ती भन्दा टाढा) जलाएर वा गाडेर नष्ट गर्नुपर्दछ ।

(ख) प्रयोग गरिएको भाँडामा कम्तिमा ३ पटक साबुन पानीले सफा गर्नुपर्दछ ।

(ग) हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धनु पर्दछ ।

(घ) प्रयोग पछि उपकरणलाई राम्ररी सफा गरेर राख्नुपर्दछ ।

(ङ) झोल विषादीको कन्टेनरका हकमा विषादी तयार गर्दा ट्रिपल रेजिङ टेक्निक गरिसके पछि कन्टेनरलाई नष्ट गर्नु पर्दछ ।

(च) विषादी मिश्रण बनाउदा र छर्दा प्रयोग गरिएका भाडाहरूलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

(ख) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन

१. विषादी आयात निर्यात तथा उत्पादनकर्ताका लागि :

विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रयोग वा किनवेचको लागि पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले गरेको छ। यसर्थ विषादी आयात, निर्यात तथा उत्पादनकर्ताले आफुले आयात, निर्यात या उत्पादन गर्ने विषादी पञ्जीकरणको लागि आवेदन फर्ममा उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण र कागजातहरू संलग्न गरी विषादी पञ्जीकरण गराउन प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा रीतपूर्वक निवेदन दिनुपर्दछ।

२. विषादी संश्लेषणकर्ता (Formulators) विक्रेता एवं व्यवसायीहरूको लागि :

सूचित विषादीको संश्लेषण (फर्मुलेशन), विक्री वितरण तथा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले जीवनाशक विषादी समितिवाट नियमानुसार इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले गरेको छ। यस्ता पञ्जीकरण विषादीहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ।

उपरोक्त कुराहरूको विस्तृत जानकारीको लागि प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवन वा कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ।

३. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को मुख्य मुख्य बुँदाहरू :

जीवनाशक विषादी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा पञ्जीकरण गर्नु पर्ने। पञ्जीकरण नगरिएको विषादी प्रयोग गर्न नपाईने। वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोजनका लागि केन्द्रको पूर्व स्वीकृतमा विषादी त्याउन सक्ने। विषादीलाई खारेज तथा निलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्याकिङ गर्न चाहने कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले केन्द्रबाट इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था छ। पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक विषादीको विक्री, वितरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग तथा जीवनाशक विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिवाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ। इजाजत पत्रमा तोकिएका शर्तहरू पालना नगरेमा इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने छ। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय, सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन एक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति रहनेछ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र तथा प्रमुख को जिम्मेवारी तोकिएको र समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने। जीवनाशक विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापनका विषयमा सुरक्षित र न्यायोचित प्रयोग, घरेलु विषादीको प्रयोग, जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोगमा प्रोत्साहन तथा जीवनाशक विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्धका साथै स्याद समाप्त भएका विषादीको व्यवस्थापनका लागि प्रावधानहरू रहेको छ। विषादीको सूचकपत्र तथा कन्टेनरको स्वीकृती लिनु पर्ने तथा स्वीकृत कर्टेनर र सूचकपत्र विना विषादी विक्री वितरण गर्न नपाइने। कृषि तथा पशु पन्थी विकास मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारले विषादी निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था रहेको। विषादी निरीक्षकको काम कतव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको। विषादीको नमूना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण, पञ्जीकरण नगरिएको तथा प्रतिबन्धित विषादीको प्रचार प्रसार गर्न नहुने, विषादीको अभिलेख राख्नुपर्ने र विषादी विसर्जनका लागि व्यवस्था गरिएको। कसूर र कसर अनुसार दण्ड तथा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको। विषादी निरीक्षकलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा दायरीको लागि जिम्मेवारी दिईएको साथै विषादी जफत गर्ने र प्रदेशमा जफत गरिएका र अन्य प्रयोग गर्न निमिल्ने विषादीलाई भण्डारणका लागि भण्डारण गृहको व्यवस्था।

जीवनाशक विषादी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन गर्न जिम्मेवारी केन्द्रको हुने साथै प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिले प्रदेशमा रहेका जीवनाशक विषादी सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था। नियम तथा निर्देशिका, कार्यक्रम तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको। रासायनिक विषादीको प्रयोगबाट वातावरण तथा मानव, पशुपन्थी, जलचर, बिरुवा लगायतका स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले विकल्पमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

४. जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० को मुख्य मुख्य बुँदाहरू :
- विषादी पञ्जीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने, विषादी पञ्जीकरण गर्ने, विषादी पञ्जीकरण गर्न इन्कार गर्न सम्मेत, विषादीको पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सम्मेत, विषादी पैठारीको विवरण पेश गर्नुपर्ने, कन्टेनर र सूचक पत्रको स्वीकृति विना विक्री वितरण गर्नु नहुने, इजाजत पत्र लिनु पर्ने, इजाजत पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने, विषादीको खुद्रा विक्रेतालाई इजाजत पत्र दिने, विषादी छार्कन व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिने, विषादी संश्लेषण गर्नेलाई इजाजतपत्र दिने, इजाजतपत्रको मान्यताको अवधि र नवीकरण, इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने, विषादी निरीक्षकलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार, उप समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तथा वैठक सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका बनाई लागु गर्न व्यवस्था गरेको छ ।
- २. विषादी पञ्जीकरण (दर्ता) व्यवस्था र कार्यविधि**
- (क) विषादी पञ्जीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने :
- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ को दफा ३ र जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० को नियम ३ बमोजिम कुनै विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन वा व्यवसायिक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो कार्य गर्नु अघि त्यस्तो विषादीलाई ऐनको दफा ३ बमोजिम पञ्जीकरण गराउनको लागि समितिले तोकिदिएको ढाँचामा पञ्जीकरण दस्तुर एक हजार रुपैयाँ र आवश्यक कागजातहरू समेत सलान राखी पञ्जीकरण गर्न प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र समक्ष निवेदन (अनुसूची १) दिनुपर्नेछ ।
- विषादी पञ्जीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरू :**
- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ र जीवनाशक नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) र (२) अनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयात, निर्यात, उत्पादन वा किनबेच गर्ने विषादी पञ्जीकरण गराई प्रमाण पत्र लिनका लागि प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा निवेदन दिदा तपसिलमा उल्लेखित जानकारीयुक्त कागजपत्रहरू निवेदन साथ अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
१. विषादी पञ्जीकरणका लागि समितिले तोकिदिएको ढाँचामा रु. १०/- को टिकट सहितको निवेदन । (Application Form for Registration of Pesticide with Rs. 10 Rupees Ticket)
 २. पञ्जीकरण दस्तुर रु. १००० ।- (Registration Fee Rs. 1000/-)
 ३. विषादीको आयात तथा विक्री वितरण गर्नका लागि कम्पनीले दिएको आधिकारिक वितरक पत्र । (Letter of Authorization)
 ४. नेपालमा उक्त विषादीको प्रयोग आवश्यक छ भन्ने पुष्ट्याई । (Statement of the need to use in Nepal)
 ५. सक्षिप्त रूपमा विषादीको प्रयोग विधि खुलेको कागजपत्र । (Summary of Intended Use Pattern)
 ६. वातावरणमा विषादीको विषादीलुपना सम्बन्धी विवरण । (Ecotoxicological Data)
 ७. विषादीको प्रभावकारिता सम्बन्धी विवरण । (Efficacy Data)
 ८. विषादीको अवशेष विश्लेषण विवरण । (Residue Analysis)
 ९. भारत, चीन वा जुन मूलुकमा विषादी पञ्जीकरण गरिएको छ सो प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । (Copies of Foreign Registration Certificate)
 १०. विषादी आयात/उत्पादन वा किनबेच गर्दा प्रयोग गरिने सूचकपत्र-३ प्रति (3 Copies of the Original Label)
 ११. आयात गरिने विषादीको अनुमोदित सूचकपत्र । (Approved Labels)
 १२. नेपालमा आयात गरिने विषादीको नेपाली भाषामा तयार गरिएको पर्चा । (Leaflets in Nepali Language)
 १३. नेपालमा उत्पादन र संश्लेषण गरिने विषादीको नेपाली भाषामा तयार गरिएको सूचकपत्र र पर्चा । (Labels and Leaflets in Nepali Language)
- (ख) विषादी पञ्जीकरण गर्ने
- (१) विषादी पञ्जीकरण गराउनको लागि कुनै निवेदन परेमा प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो विषादीबाट मानिस वा पशुपन्थीलाई वा पर्यावरणमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी बिना कुनै शर्त वा शर्तसहित पञ्जीकरण गरी निवेदकलाई समितिले तोकि दिएको ढाँचामा विषादी पञ्जीकरणको प्रमाणपत्र दिइने छ ।

- (२) विषादी पञ्जीकरण प्रमाणपत्रको मान्यता अवधि ३ वर्ष हुनेछ ।
- (३) प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले विषादी पञ्जीकरण गर्ने सम्बन्धमा निवेदकहरूसँग मार्गोको विषादीसँग सम्बन्धित प्राविधिक जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू प्राप्त नहुन्नेलाई सम्बन्धमा विषादी पञ्जीकरण गरिने छैन । अतः विषादी पञ्जीकरणको सम्बन्धमा केन्द्रले मार्गोको विषादी सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य जानकारी समेत निवेदकले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

विषादी पञ्जीकरण गर्न इन्कार गर्न सक्ने :

कुनै विषादी पञ्जीकरण गर्न निवेदन दिने निवेदकले नेपाल अधिराज्यमा त्यस्तो विषादीको उपयोगको आवश्यकता प्रमाणित गर्न नसकेमा वा केन्द्रको दृष्टिकोणमा त्यस्तो विषादीको उपयोगले मानिस वा पशुपन्धीलाई वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना देखेमा सोको कारण उल्लेख गरी केन्द्रले त्यस्तो विषादीको पञ्जीकरण गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित निकायले विषादी पञ्जीकरण गर्न इन्कार गरेको कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिइने छ ।

विषादीको पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्ने :

पञ्जीकरण भएको विषादीको निरन्तर प्रयोग अप्रभावकारी ठहरिएमा वा यस्तो विषादीको सामान्य प्रयोगबाट पनि मानिस वा पशुपन्धीलाई वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भएमा समितिले जुनसुकै समयमा पनि यस्तो विषादीको पञ्जीकरण खारेज गर्न वा कुनै खास समय सम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ । यसरी खारेज वा निलम्बन गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने छ ।

उजूर गर्ने : कुनै विषादी पञ्जीकरण गर्न इन्कार गरेको सूचना प्राप्त गर्ने निवेदकले त्यस्तो निर्णयको पूनरावलोकन गर्न समिति समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिन सक्नेछ, र त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा विषादी समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

विषादी पैठारीको विवरण पेश गर्नुपर्ने :

विषादी पैठारी गर्न इजाजत प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायले एक आर्थिक वर्षमा पैठारी गरेको विषादी, त्यसको परिणाम र मूल्य समेत उल्लेख गरी समितिले तोकिदिएको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र वा समितिले माग गरेमा सो भन्दा अगावै केन्द्र समक्ष विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । यस प्रकारको विवरणबाट देशमा के कस्तो विषादी कति परिमाणमा खपत भएको भन्ने वारेको जानकारी हासिल हुनेछ र प्राप्त हुने विवरणबाट भावी योजना तर्जुमा गर्न बढी सहयोग मिल्न जाने छ ।

पैठारीकर्ताले विषादी पैठारीको विवरण नदिएमा यस्तो विषादीको पञ्जीकरण गर्ने केन्द्रको सिफारिसमा समितिले रद्द गर्न सक्नेछ ।

कन्टेनर र सूचक पत्रको स्वीकृती :

- (क) कुनैपनि विषादी विक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले कन्टेनर र सूचकपत्रको स्वीकृतिको लागि कन्टेनर र सूचक पत्रको नमूना समेत संलग्न राखी समितिले तोकि दिएको ढाँचामा केन्द्र समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
- (ख) केन्द्रले स्तर अनुरूप कन्टेनर भए नभएको र सूचक पत्रमा उल्लेख गरिनु पर्ने सबै कुरा उल्लेख भए नभएको यकिन गरी कन्टेनर र सूचक पत्र स्वीकृत गर्नेछ ।

विक्री वितरण गर्न नहुने :

- (क) वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि पैठारी गरिएको विषादी विक्री वितरण गर्नु हुँदैन ।
- (ख) कुनै पनि विषादी केन्द्रबाट स्वीकृत कन्टेनरमा नराखी विक्री वितरण गर्नु हुँदैन ।
- (ग) कुनै पनि विषादी केन्द्रबाट स्वीकृत सूचक पत्र नटाँसेको कन्टेनरमा राखी विक्री वितरण गर्नु हुँदैन ।

३. विषादी खुद्रा बिक्रेता, व्यावसायिक प्रयोगकर्ता, संश्लेषणकर्तालाई इजाजतपत्र दिने कार्यविधि इजाजत लिनुपर्ने :

वातावरण, जनस्वास्थ्य जस्तो सार्वजनिक चासोको विषयलाई सर्वोपरी हितमा राखी कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले विषादी उत्पादन गर्न, संश्लेषण (Formulation) गर्न, निकासी पैठारी गर्न, प्याकिङ वा पुनःप्याकिङ गर्न, विक्री गर्न, वा छर्कने व्यवसाय गर्न चाहेमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश कानून अनुसार तोकिएको निकायबाट इजाजत पत्र लिनु पर्नेछ ।

इजाजत पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने :

विषादी व्यवसायमा एकरुपता र सामाज्जस्यता त्याउने उद्देश्यले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले इजाजत पत्र लिन चाहेमा समितिले तोकी दिएको ढाँचामा इजाजत पत्र दस्तुरसमेत संलग्न राखी केन्द्र तथा प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त हुने इजाजत पत्र निम्नानुसार छन् ।

विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्र :

कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले इजाजत पत्रको लागि निवेदन (अनुसूची २) दिएमा निर्धारण गरेको मापदण्डको कार्याविधिको अधिनमा रही खुद्रा बिक्रेतालाई इजाजत पत्र दिइनेछ ।

इजाजत पत्र दिने कार्याविधि :

इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने प्रत्येक पसलको कम्तिमा एकजना (पसल मालिक वा मेनेजर) ले अनिवार्य रूपमा निम्नलिखित काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- (क) जीवनाशक विषादी र विषादीबाट सुरक्षण र विषादी भण्डारण सम्बन्धी लेख, पुस्तिकाहरूमा दिईएको सामाग्री अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।
- (ख) विषादी सम्बन्धी सुरक्षण र भण्डारण विषयक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ । नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५/०९/३० गतेको निर्णय अनुसार विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्र, सुरक्षित भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्याविधि २०७५ को परिच्छेद २ को बुदा ४ (ड) मा संशोधन गरि पूर्णाङ्क १०० को परीक्षामा उत्तीर्ण हुनलाई ५० प्राप्ताङ्क हुनुपर्ने छ ।
- (ग) विषादी रहेको भवनको निरीक्षण गर्न गराउन र परीक्षामा सामेल हुनको लागि सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत (विषादी निरीक्षक) समक्ष सम्पर्क गर्नु पर्नेछ ।
- (घ) विषादी खुद्रा बिक्रेताहरूसँग विषादी, त्यसको सुरक्षित प्रयोग र भण्डारण बारेमा स्वीकार योग्य स्तरको जानकारी छ, भन्ने निधो गर्न विषादी समितिले जीवनाशक विषादी र तिनबाट सुरक्षण र जीवनाशक विषादी भण्डारण बारे बेगला बेरलै पुस्तिकाहरूमा दिईएको जानकारीहरूको आधारमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५/०९/३० गतेको निर्णयानुसार विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्र, सुरक्षित भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्याविधि २०७५ अनुसार तालिम दिई परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको छ ।
- (ङ) परिक्षा उत्तीर्ण पश्चात विषादीको सुरक्षित भण्डारण तथा प्रयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने छ । त्यस पश्चात सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालयमा कार्यरत विषादी निरीक्षक (बाली सरक्षण अधिकृत) द्वारा चेकलिष्ट (विषादी गोदाम/पसल निरीक्षण प्रतिवेदन) भराई मापदण्ड वमोजिम प्राप्त चेकलिष्ट, नागरिकताको प्रतिलिप र कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यालयको सिफरिसको आधारमा विषादी खुद्रा बिक्रेतालाई विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्र प्रदान गरिनेछ ।
- (च) विषादीको खुद्रा बिक्रेताको इजाजत पत्रमा उल्लेख भएका शर्त र अवस्थाहरू पालन गर्नु पर्नेछ । विषादी खुद्रा बिक्रेताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू :
१. यो इजाजत पत्र स्वीकृत भवन वा गोदाममा राख्नु पर्नेछ र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २४ बमोजिम नियुक्त विषादी निरीक्षक वा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा अधिकार प्रदत्त अन्य कुनै अधिकृतले खोजेमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
 २. तालिम प्राप्त वा कृशल स्टाफको परिवर्तन हुँदा सोको खबर विषादी पञ्जीकरण गर्ने प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
 ३. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ बमोजिम पञ्जीकृत विषादी बाहेक अन्य विषादी प्रयोग, आयात, निर्यात र उत्पादन गर्न नहुने । सार्वजनिक र जन चासोको विषयमा सर्वसाधरण सबैको जानकारीको लागि ऐनको दफा ३ बमोजिम पञ्जीकृत विषादीको सूची हरेक पसलमा अनिवार्य रूपमा राख्नु र टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 ४. विषादी खुद्रा बिक्रेताहरू कृषकहरू र अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग वारम्वर सम्पर्कमा रहने गरेकोले, तिनीहरूसँग विषादी सम्बन्धी राय सल्लाह मारने गरिन्छ । सही सल्लाह दिनको लागि विषादी बिक्रेता र तिनीहरूका काम गर्नेहरूमा विषादी, त्यसको प्रयोग, फाईदा, वेफाईदाहरू र कृषकहरूले सुरक्षित किसिमबाट यस्ता विषादी प्रयोग गर्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू सम्बन्धी राम्रो जानकारी हुनुपर्दछ ।

४. विषादीको सुरक्षित भण्डारण:

भण्डार गर्ने सुविधाहरू उपयुक्त हुनुको साथ साथै, पसल अथवा गोदाम घरहरूमा पनि यिनीहरूलाई सुरक्षितपूर्वक राख्नु जरुरी छ । सामानको सुरक्षा तथा अन्य सामानहरूसित संमिश्रण र प्रदुषण हुन नदिन र ती ठाउँमा कार्यरत कर्मचारी/कामदारहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको निमित्त यो कार्य अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ ।

- विषादी सुरक्षित भण्डार सम्बन्धमा निम्न तथ्यहरूमा ध्यान दिइनुपर्दछ । विषादी बेचबिखन र खाद्य पदार्थहरू बिक्री हुने पसल एउटै हुनुहुन्न ।
- विषादीलाई मल, बीउ तथा खेती कार्यमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणहरूबाट टाढा नै राखिनु पर्दछ र गन्ध तथा पोखिएका विषादीहरूबाट बच्नु र बचाउनु पर्दछ ।
- ज्यादै विषालु विषादीहरू पनि पसलमा उपलब्ध छन् भने यिनीहरूलाई मात्र विशेष रूपले ताला लगाउन हुने कपबोर्ड अथवा क्याविनेटहरूमा राखिनु पर्दछ । यदि पसलमा यस प्रकारको व्यवस्था मिलाउन नसकिने अवस्था छ भने, ग्राहक तथा केटाकेटीहरूले नभेट्ने गरी ताला लगाउनु पर्दछ ।
- विषादी चिसो तर सुख्खा र सूर्यको प्रकाश सिधै नपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्दछ । ओसको कारणले काठबोर्ड, कन्टेनरहरू बिग्रन सक्छ तथा कुनै कृतै विषादी चिस्यानको कारणले बेकम्मा पनि हुन सक्छ ।
- न्यानो गरम अवस्थाहरूको कारणले पनि विषादी धेरै बिग्रन सक्छ र सूर्यको प्रकाश विषादीहरूमा सिधै पर्नाले यिनीहरूमा टाँसेका लेबलको रंग उडाने र पढन नसकिने हुन सक्छ ।
- म्याद नाघेका विषादीहरू बिक्री कक्षमा राख्नु हुदैन साथै त्यस्ता विषादीको अभिलेख विषादी निरीक्षकलाई वुझाई गोदामको छट्टै भागमा सुरक्षित तरिकाले राखेको हुनुपर्ने छ ।
- जैविक विषादीको भण्डारण रसायनिक विषादी सँगै गर्नु हुदैन ।
- विषादी पसल वा गोदाम खुला छोडेर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति अन्यत्र जानुहुदैन ।
- विषादी पसल वा गोदाममा विषादी जनाउने खतराको संकेत अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्नेछ ।
- विषादी पसल वा गोदाममा आफुले खानेकुरा राख्नु र खानु हुदैन ।

५. विषादी व्यवस्थापन प्रणाली

कुनै पनि विषादी सुरक्षा कार्यको सामान्य व्यवस्थापन प्रणाली एक अभिन्न अंग हो किनभने स्टोर तथा गोदाममा भएको विषादी बराबर चलाईरहनु पर्ने हुन्छ तथा यसबाट खतराहरू पनि बढी नै हुन्छन् ।

विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रममा अपनाउनु पर्ने मुख्य क्षेत्रहरू निम्न अनुसार छन् :

- वट्टा अथवा बिग्रेको भाडामा भएका विषादी कहिले पनि नबेच्ने अथवा वट्टामा टाँसेको लेबल च्यातिएमा रंग उडेको अथवा भिजेको भए यस्मा लेखिएको निर्देशिकाहरू पढन सकिन्न ।
- लेबल रहित भाडामा राखेको कहिले पनि नबेच्ने अथवा पेय पदार्थ राख्ने गरेको भाडा, खाद्य पदार्थ राख्ने गरेको भाडामा राखेको पनि नबेच्ने । विषादी सूचक पत्र भएको कन्टेनरमा मात्र बिक्री वितरण गर्ने ।
- स्टकमा रहेका वोतलहरू अथवा पाकेटहरू नियमित निरीक्षण गर्ने, धेरै समय अघि देखि स्टोरमा रहेका सामानहरूलाई तख्ताको अगाडी भागमा राख्ने र पहिले बेच्ने (First in & First out) । यो गर्ने गरेमा विषादीहरूको मिति नाले अथवा विषादी बेकम्मा हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
- विषादीका पाकेटहरू तख्तामा राम्ररी मिलाएर राख्ने, त्यसमा भएका लेबलहरू देखिने गरी राख्नाले विषादी भिक्दा वा छनौट गर्दा गल्ती हुने सम्भावनाहरू कम हुन्छन् र विषादीहरूलाई चाँग मिलाएर पनि नराख्ने ।
- प्राप्त भएका सबै विषादी रेकर्ड कायम गर्ने, प्राप्त भएको मिति र बेचेको मिति उल्लेख गरी राख्ने ।
- आईपुरोका सबै विषादीका भाँडाहरू राम्ररी निरीक्षण गर्ने र कुनै भाँडो चुहिएको छ वा बिक्री राम्ररी लागेको छ छैन र पाकेटहरू राम्ररी सील गरिएका छन्/छैनन् बारे समय समयमा जाँच गर्ने ।
- कुनै कुनै विषादी विशेष गरी अर्गानोफोस्फेट (Organophosphate) कीटनाशक हरूको विशेष गन्ध हुन्छ र यी कीटनाशकहरू हावा अथवा प्याकेटबाट खुल्ला भएमा अथवा चुहिन थालेमा यस प्रकारको गन्ध आउने गर्दछ । यदि कुनै प्रकारको गन्ध पाईएमा राख्ने गरेको ठाउँको राम्ररी निरीक्षण गर्नुपर्दछ ।
- भण्डारण कक्ष र पसललाई सफा सुग्राहर राख्नुपर्दछ ।

- यदि कैत चुहिएको छ भने तुरन्तै सफा गर्ने र त्यस ठाउँबाट प्रदूषण पैदा गर्न नदिने ।
- विषादीको पसल अथवा स्टोरमा काम गर्दा पुरा बाहुला भएको कमिज र सुरुवाल अथवा पाइन्ट पनि लामै हुनुपर्छ । यदि केहि गरी दुर्घटना परिहालेमा पनि विषादी पोखिएर छालासित सौभै सम्पर्कमा आउदैन र प्रदूषण हुन पाउदैन ।
- पसल अथवा स्टोरमा जहिले पनि एक दुई बाल्टिन पानीको प्रवन्ध मिलाई राख्नुपर्छ, केहि गरी विषादीहरू पोखिए अथवा चुहिएमा र पञ्जा नलगाई पुछपाछ गरिएको छ भने यस्को कारणबाट दुषित भएको (छाला) भागलाई तुरन्तै सफा गरिनु पर्दछ । यसो गरेमा विषादी सोसेको भएमा पनि कम हुन्छ र विषाक्त हुनबाट पनि बचाउदछ ।
- स्टोरमा एक बाल्टिन बालुवा वा सुख्खा धुलो तयार राख्नुपर्छ, यदि केहि गरी पोखिएमा यस्को सहायतबाट तुरन्तै सफा गर्न सकिन्छ र अन्य भाडाहरूसित दुषित हुन सक्ने सम्भावना कम हुनुको साथै पसल अथवा स्टोरमा कार्यरत अन्य व्यक्तिहरूलाई विषाक्तताबाट बचाउदछ ।
- दुर्घटनाको समयमा लगाउन सुरक्षात्मक कपडा सदैव तयार अवस्थामा हुनुपर्दछ । (जस्तै कम्तिमा दुई जोर PVC पंजाहरू, रबरको बुटहरू, प्लाष्टिकको एप्रोन र फेर्नको लागि एकजोर पूरा लुगा) । आपतकालिन अवस्थामा यदि उपर्युक्त कुनै पनि सामानहरू उपलब्ध हुन सकेन भने हात, पैतला छोप्नको लागि प्लाष्टिकका थैलीहरू प्रयोग गर्ने र खुट्टा बचाउनको लागि कम्मरमा बोरा कस्ने ।
- पोखेका विषादीहरू सफा गर्न सावेल, कुचो उपलब्ध हुनुपर्छ र विषादी पोखिएमा सुरक्षित पहिरन लगाई त्यसबाट फैलन नदिइ काठको धूलो वा माटो राखी कुचोले सफा गर्ने र मानिसको आवत जावत कम हुने र पानीको स्रोतबाट टाढा स्थानमा लगेर गाइने ।
- सफा गर्न कपडा, साबुन र माटो राख्नको लागि ऐटा ड्रम अथवा केहि बाल्टिनहरू, वाक्लो प्लाष्टिकका थैलीहरू समेत उपर्युक्त ठाउँमा राखी राख्नुपर्छ ।

६. विषादी छर्कने व्यवसायी इजाजत पत्र

- (क) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले व्यावसायिक रूपमा विषादी छर्कनको लागि निवेदन (अनुसूची ३) दिएमा समितिले विषादी प्रयोगका सम्बन्धमा चेक लिष्टमा निर्धारण गरेको मापदण्डका अधिनमा रही तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजत पत्र दिन उपर्युक्त देखेमा कार्यालयले तोकेको ढाँचामा विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजत पत्र दिन सक्नेछ ।
- (ख) विषादी छर्कने व्यवसायीले इजाजत पत्रमा उल्लेख भएका शर्त र अवस्थाहरू पालन गर्नु पर्नेछ ।

७. विषादी संश्लेषण इजाजत पत्र

- (क) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले विषादी संश्लेषण गर्न निवेदन (अनुसूची ४) दिएमा विषादी संश्लेषणका सम्बन्धमा चेक लिष्टमा निर्धारण गरेको मापदण्डको अधिनमा रही इजाजत पत्र दिन उपर्युक्त देखेमा समितिले तोकेको ढाँचामा विषादी संश्लेषण कर्तालाई इजाजत पत्र दिन सक्नेछ ।
- (ख) विषादी संश्लेषणकर्ताले इजाजत पत्रमा उल्लेख भएका शर्त र अवस्थाहरू पालना गर्नुपर्दछ ।

इजाजत पत्रको मान्यताको अवधि र नवीकरण :

विषादी खुद्रा विक्रेताको इजाजतपत्र, विषादी छर्कने व्यावसायीको इजाजत पत्र र विषादी संश्लेषणकर्ताको इजाजत पत्रको मान्यता अवधि ३ वर्षको हुनेछ र नियमानुसार प्रदान गरिएको इजाजत पत्रको मान्यता अवधि समाप्त हुनु भन्दा मितिले ३५ दिन अगावै नवीकरणका लागि जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्दछ यदि यो थपिएको अवधिमा पनि नवीकरण नगरिएमा इजाजत पत्र स्वतः बदर हुनेछ ।

इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्नेछ :

विषादी समितिले इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्नेछ, यदि,

- (क) उपयोग गरिएको भवनमा भण्डारण र सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरू आवश्यकता अनुरुप नभएमा,
- (ख) विषादीबाट सुरक्षण बारेमा स्तरयुक्त आवश्यक जानकारी राख्ने मध्ये कोही पनि नभएमा,
- (ग) भण्डारणमा लेबुल नलगाएको वा पञ्जिकृत नगरेको विषादी भएमा,
- (घ) विषादी सुरक्षण र पसल तथा गोदाम सञ्चालन विधि असुरक्षित भएमा,

- (ङ) अपर्याप्त वा भुटो रेकर्ड भएको प्रमाणित भएमा
- (च) विषादी व्यवसायिक प्रयोगकर्ता र विषादी संश्लेषण कर्ताले विषादी समितिले निर्धारण गरेको अनुरूप पूर्वाधार र अन्य कार्यहरू पूरा नभएमा ।

द. विषादी पञ्जीकरण व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि

(क) विषादी खुद्रा बिक्रेता तालिम :

विषादी सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम विषादी खुद्रा बिक्रेताले विषादीको सुरक्षण र भण्डारण विषयक तालिम पश्चातः लिइन्ने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यस प्रकारको विषादी व्यवस्थापन तालिमले विषादी खुद्रा बिक्रेताहरूको विषादी सम्बन्धी ज्ञानको स्तरमा अभिवृद्धि हुनुका साथै समय सापेक्ष अद्यावधिक हुने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ । कृषकहरू प्रयाः खुद्रा बिक्रेताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कारणले विषादी कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, संस्था, निकायको विषादी सम्बन्धी प्रयोग ज्ञान मौजुद हुनु पर्ने देखिन्छ । यसबाट विषादीको न्यायोचित एवं प्रभावकारी प्रयोग भई वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई न्यून हुन प्रशस्त सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

उद्देश्य :

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र जीवनाशक विषादी नियमावलीको प्रावधान बमोजिम विषादी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको विषादी सम्बन्धी ज्ञानको स्तर निर्धारण गर्ने ।
- विषादी खुद्रा बिक्रेतालाई विषादी व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्ने ।

कार्य सञ्चालन कार्यविधि :

- विषादीको उचित प्रयोग र जनमानस एवं कृषकहरूलाई भविष्यमा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाटे जनचेतना दिई जानुपर्ने यस अवस्थामा जिल्लाको औचित्य र आवश्यकता होरि नियमानुसार विषादी खुद्रा बिक्रेताको दरखास्त विषादी निरीक्षकले लिने । यसरी दरखास्त दिने खुद्रा बिक्रेतालाई तालिममा समावेश गर्ने ।
- तालिममा सहभागी संख्या २०-२५ जना हुनुपर्नेछ । यदि एक जिल्लामा सो भन्दा कम भएमा छिमेकी जिल्लाका विषादी खुद्रा बिक्रेतालाई पनि समावेश गर्न सकिने छ ।
- तालिम प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अन्तरगतको विषादी व्यवस्थापन तथा पञ्जीकरण शाखा र कृषि ज्ञान केन्द्रको संयुक्त तत्वावधानमा सञ्चालन हुने र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रको बाली संरक्षण अधिकृत वा क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाको बाली संरक्षण अधिकृत वा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको बाली संरक्षण अधिकृत (विषादी निरीक्षक) तालिम सयोजक हुनेछ ।
- विषादी सम्बन्धिका २४ वटा कक्षाहरू सञ्चालन हुने यस तालिमको अवधि ६ दिनको हुनेछ, र तालिम पश्चात मात्र परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
- तालिममा समावेश हुने विषादी खुद्रा बिक्रेताहरूलाई तालिम भत्ताको व्यवस्था हुने छैन ।
- तालिमको पाठ्यक्रम समयानुसार परिमार्जन हुँदै जानेछ ।
- यस्तो तालिम प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको विषादी व्यवस्थापन तथा पञ्जीकरण शाखाले क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूलाई समन्वय गरी गर्नु परेमा यसै कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

कार्यक्रमको सम्भाव्य प्रतिफल :

- विषादी बिक्रेताहरूको विषादी सम्बन्धी ज्ञानमा अभिवृद्धि हुने,
- विषादी सम्बन्धी सुरक्षित भण्डारण प्रविधिमा सुधार आउने,
- विषादीको विष लागदाको लक्षण र प्राथमिक उपचारमा जानकारी उपलब्ध हुने,
- जीवनाशक विषादी ऐन तथा नियमावली बारे जनचेतना जागरण हुने,
- विषादीको सुरक्षित ढुवानी प्रविधि ज्ञानको जानकारी हुने र विषादीबाट कृषक स्तरमा हुने दुर्घटनाको उपचारीय तरिकाको बोध उपलब्ध हुने ।
- विषादीको सूचक पत्र (Label) बारे प्राविधिक ज्ञानको जानकारी हुने ।
- विषादीको सुरक्षित प्रयोग र बैकल्टिक उपायहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त हुने ।

लक्षित वर्ग :

विषादी खुद्रा बिक्रेताहरू

जिम्मेवार निकाय :

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, बाली संरक्षण प्रयोगशाला

कार्य सञ्चालन गर्दा लाग्ने रकम :

१ प्रश्न पत्र (पूर्णङ्ग १००) तयार रु. ५००।-

२. उत्तर पुस्तिका परीक्षण (२५ जनाको) रु. २५।- का दरले रु. ६२५।- अन्य खर्च तालिमको नर्मस अनुसार हुने छ र सहभागीले कुनै भत्ता पाउने छैनन्।

कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार र सम्भाव्य प्रतिफल र दिगोपनाको सम्भाव्यता :

विषादी प्रयोग एक सार्वजनिक चासोको विषय हो । विषादीको जथाभावी, अत्याधिक र अनियन्त्रित प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुरा निश्चित छ । विषादीको प्रभावले सम्पूर्ण पर्यावरण नै खलबलिने हुँदा विषादीको न्यायोचित बिक्री वितरण र प्रयोगले अहंम् भूमिका लिएको हुन्छ । तसर्थ, विषादी प्रयोगमा प्रभावकारी र न्यायोचित गर्न गराउन विषादी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, संघ संस्था र निकायलाई दिगो रुपमा ज्ञानको स्तरलाई समय सापेक्ष तुल्याउदै लैजानु टड्कारो आवश्यकता छ । यो तालिम कार्यक्रमको भूमिका वातावरण र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने भएकोले विषादी खुद्रा बिक्रेता तालिमको दीगोपना रहने कुरामा दुइमत नहोला ।

(ख) विषादी खुद्रा बिक्रेता अनुगमन र तथ्यांक संकलन :

हालको परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा नेपालले पनि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कारणले देशभित्र आयात र खपत हुने विषादीको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । जिल्लाभित्र रहेका विषादी आयातकर्ता र खुद्रा बिक्रेताबाट क्रमशः आयात र खपत विवरण संकलन गरी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीलाई प्रभावकारीरुपमा लागु एवं कार्यान्वयन गर्न जिल्लाबाट प्रत्येक चौमासिकमा विषादी निरीक्षकबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ ।

उद्देश्य :

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र नियमावली २०५० मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू स्थलगत रुपमा कार्यान्वयन भएर नभएको अनुगमन गर्ने ।
- जिल्लाको विषादी सम्बन्धी आयात र खपत सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने ।

लक्षित वर्ग :

विषादी खुद्रा बिक्रेता

कार्य सञ्चालन कार्यविधि :

- जिल्लामा अवस्थित वातावरणसँग सम्बन्धित निकाय, विषादी व्यवसायी संघ (Pesticide Enterpreneur Association of Nepal), जिल्लास्तरीय विषादी व्यवस्थापन समन्वय समितिको समन्वयमा जिल्लास्तरीय अनुगमन सुपरिवेक्षण कार्यक्रम गर्ने ।
- जिल्लाभित्र रहेका विषादी खुद्रा बिक्रेताहरूको पसलहरूमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसारको तथ्यांक संकलन गर्ने ।
- अनुगमन निरीक्षण कम्तीमा प्रत्येक चौमासिकमा १/१ पटक र तथ्यांक वर्षको एक पटक लिनु पर्ने छ । तोकिदिएको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वा माग गरेमा सो भन्दा अगावै प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र समक्ष विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

जिम्मेवार निकाय :

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र

कार्य सञ्चालन गर्दा लाग्ने अनुमानित रकम : अनुगमन निरीक्षण र तथ्यांक संकलन गर्दा लाग्ने रकम नियमानुसार जिल्लाको आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव गर्ने ।

सम्भावित प्रतिफल :

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीको विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरूबाटे जानकारी हुने । विषादीको गुणस्तर नियन्त्रित गर्ने गराउने मा सहयोग पुग्ने ।
- विषादीको गुणस्तर निर्धारण हुने ।
- विषादी खुद्रा विक्रेता र सरकारी क्षेत्र बीच समन्वय कायम हुने ।
- प्रतिवन्धित र पञ्जीकरण नगरिएका विषादीहरूको समेत अनुगमन हुने ।
- विषादीको आयात र खपतको तथ्यांक विवरण संकलन हुने ।

कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार र दिगोपनाको सम्भाव्यता :

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन नियम अनुसार जिल्लामा विषादीको समुचित व्यवस्थापनमा सधाउ पुग्न जाने हुँदा यस प्रकारको कार्यक्रमबाट व्यवस्थापनमा स्थायित्व प्राप्त भई निश्चित दिशावोध हुनेछ ।

(ग) जिल्लास्तरीय विषादी व्यवस्थापन समन्वय समितिको वैठक :

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीका प्रावधान अनुसार जिल्लास्तरीय विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नेर विषादी समिति, उप-समिति र विषादी व्यवस्थापन तथा पञ्जीकरण नीति निर्दर्शनहरू कार्यान्वयन गराउने काममा समन्वय गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय) कोमिति २०५५/३/१४ को निर्णय अनुसार समिति गठन भएकोछ । समन्वय समितिको गठन :

१.	प्रमुख (रा.प.द्वि.प्रा), कृषि ज्ञान केन्द्र	अध्यक्ष
२.	अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय	सदस्य
३.	जिल्ला सरकारी वकिल	सदस्य
४.	प्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य
५.	पेटिसाइड एसोसिएसनले मनोनित गरेको विषादी खुद्रा विक्रेता	सदस्य
६.	गैर सरकारी संस्था महासंघले मनोनित गरेको जिल्ला स्थित कृषि वा वातावरण सम्बन्धी गैर सरकारीसंस्थाको अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
७.	अधिकृत प्रतिनिधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय	सदस्य
८.	विषादी निरीक्षक (रा.प.तृ.प्रा.)	सदस्य सचिव

उद्देश्य :

सम्पूर्ण विषादी व्यवसायीहरू र प्रयोग कर्तालाई जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन नियमको पालना गर्ने तर्फ उन्मुख गराउने । लक्षित वर्ग : आयातकर्ता, संश्लेषणकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायिक प्रयोगकर्ता, विषादी खुद्रा विक्रेता र प्रयोगकर्ता ।

कार्य सञ्चालन कार्यविधि :

- विषादीको व्यवस्थापनमा जिल्लामा निश्चित मार्गदर्शन दिन आवश्यकतानुसार समितिको वैठक बस्नुपर्नेछ । उक्त वैठकमा छलफल हुने विषयहरू जिल्लाको समस्यामा आधारित हुनुपर्नेछ ।
- वैठकमा पारित भएका सुभावहरू : सम्बन्धित निकाय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
- सम्भव भएसम्म प्रत्येक चौमासिकमा १/१ वटा वैठकको लक्ष्य प्रस्ताव गर्ने ।
- वैठक सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि जिल्लास्तरीय विषादी व्यवस्थापन समन्वय समितिले निर्धारण गर्नेछ ।

जिम्मेवार निकाय : कृषि ज्ञान केन्द्र

कार्य सञ्चालन गर्दा लाग्ने अनुमानित रकम : वैठक बस्दा नियम अनुसार लाग्ने रकम प्रस्ताव गर्ने ।

सम्भावित प्रतिफल :

जिल्लाभित्र रहेका विषादी सम्बन्धी कारोबार गर्ने निकायहरूले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र नियमानुसार कार्य गरे नगरेको कार्य हेर्ने र यसल विषादी निरीक्षकलाई समेत थप बल पुग्नेछ । यसबाट देशमा पञ्जीकृत विषादीको मात्र कारोबार हुनेछ । जिल्लामा विषादी प्रयोगको स्थिति आंकलन समेत हुने छ ।

कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार र दिगोपनाको सम्भाव्यता :

विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समस्यामा आधारित कार्यनीति तयार हुने र यसबाट जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र नियमावली बमोजिम जिल्लाको विषादी व्यवस्थापन कार्यमा प्रभावकारिता आउने छ ।

(घ) विषादी सम्बन्धी ऐन, नियम र विषादी व्यवस्थापन जनचेतना कार्यक्रम :

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, नियमावली र विषादी व्यवस्थापन जनस्तरमा जनचेतना जागरण गर्नुपर्ने आजको समयको माग रहेको छ। यसै भावनालाई जनस्तरमा प्रचार प्रसार गर्न जिल्लाको कार्यक्रममा विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यम प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्देश्य : जनस्तरमा विषादी व्यवस्थापन ऐन, नियम र विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना उजागर गर्ने ।

लक्षित वर्ग :

विषादी सम्बन्धी सम्बद्ध निकाय/व्यक्ति, संघ, संस्था

कार्य सञ्चालन कार्यविधि :

- जिल्लामा रहेका वातावरण सम्बन्धी सरोकार भएका सरकारी, गैर सरकारी संघ, संस्थासँग समन्वय कायम गरी चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- जिल्लाको आवश्यकता अनुसार भेला, मेला, गोष्ठी, पोष्टर, पम्पलेट, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आदि जस्ता जनचेतना जगाउने कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- व्यवस्थापनमा जनचेतना जगाउने यस्ता कार्यक्रमको रेकर्ड/अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकाय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा नियमित रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।

जिम्मेवार निकाय : कृषि ज्ञान केन्द्र

कार्य सञ्चालन गर्दा लाग्ने अनुमानित रकम : जनचेतना जगाउने कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार रकम प्रस्तावित गर्नुपर्नेछ ।

सम्भावित प्रतिफल : यस कार्यक्रमबाट निम्नानुसार प्रतिफल प्राप्त हुनेछन् ।

- विषादी पञ्जीकरण कार्यविधिवारे सम्बन्धित व्यक्ति संस्थाहरूलाई जानकारी हुने ।
- पञ्जीकृत विषादीको विवरणात्मक सूचीको जानकारी हुने ।
- विषादी खुद्रा विक्रेताको इजाजतपत्र दिन सहयोग पुग्ने ।
- विषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिन सहयोग पुग्ने ।
- विषादी संश्लेषण गर्नेलाई इजाजतपत्र दिन सहयोग पुग्ने ।
- प्रतिबन्धित विषादीको सूचीको जानकारी हुने ।
- विषादीको वातावरण प्रति नकारात्मक प्रभावको जानकारी हुने ।

कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार र दिगोपनाको सम्भाव्यता :

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको जानकारी जनस्तरमा सम्ममा जनचेतना जागरण भै विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रममा दिगोरूपमा सहयोग पुग्नेछ ।



अनुसूची १

Post
stamp
Rs. 10

APPLICATION FOR REGISTRATION/RE-REGISTRATION OF A PESTICIDE

To,
Chief,
Plant Quarantine and Pesticide Management Centre,
Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

I/we hereby submit this application for the Registration/Re-registration of the pesticide for the objective as specified below. I agree to abide by the rules and regulations framed under the Pesticide Act, 1991 and the Pesticide Rules, 1993. I agree that any contravention to Act and Regulations shall be subject to penalty.

1. Name and Address of Company :

Name: ... Postal Address : ...

VDC/Municipality: ... Ward No: ... District:

Telephone: ... Fax: ... Email : ... 2. Objective of Registration (Tick Whichever applies) :

() Import () Export () Production () Formulation

Purpose of Use (Tick whichever applies)

General: () Agricultural, () Public Health, () Sale, () Private Use, () Other use (Specify)

Research : () Agricultural, () Public Health, () Other use (Specify)

Name of Pesticide : (a) Trade Name: Old Registration No (if regd before and also mention old stock):.....

Common Name : ...

Chemical family (eg Organophosphate, Carbamate, etc):

Chemical Name¹ (Including empirical formula and molecular weight³):

Pure Active Ingredient :

Melting Point : ... Boiling Point : ...

Density⁴ Solubility⁵ : ...

Active ingredient contents (g/L or g/kg) : Minimum: Maximum:

Name and Address of Manufacturer :

The pesticide meets the followings specifications (Indicate with a tick) : () FAO Specification

() WHO Specification () Any Other Identity of Specification)

Formulated Product :

Formulator's name and address : ...

Type of formulation : ...

Use category (Tick Whichever applies): () Insecticide () Acaricide

() Herbicide () Fungicide () Bio(pesticide) () Rodenticide

() Botanical pesticide () Other (Specify) : ...

Concentration of technical active ingredient(s) (g/kg or g/L)⁶ : ...

1 Chemical name should be provided according to internationally agreed nomenclature, preferably IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

2 For Liquid only.

3 Solubility in water and organic solvents with a temperature range of 20-25° C.

4 If there are more than one active ingredients, information on each should be given.

Physical/ Chemical properties of formulated products :

Color : ... Odor : ... Density² : ... Flammability^{7⁵} :

Recommended Waiting Period so that the residue remaining on the crop at harvest is within acceptable limits

Particulars where this pesticide is registered for use in any other country. a) Country:.....

I) Trade name of Pesticide : II) Formulation of Pesticide :

III) Uses allowed :

a) Country:.....

I) Trade name of Pesticide : II) Formulation of Pesticide :

III) Uses allowed :

LD50 of the active ingredient⁸ : (Oral and Dermal) LD 50:

Poisoning Symptoms and Antidote Statement :.....

Container⁹ : Type : ... Sizes : ...

Sizes : ...

WHO Classification (Indicate which applies) :

() IA Extremely hazardous () IB Highly Hazardous

() II Moderately hazardous () III Slightly hazardous

() IV Non-hazardous

Storage of pesticide¹⁰: ...

I/We the applicant, hereby declared that all the information that have given in this application, to the best of my/our knowledge, are true and correct.

(Signature and Name of Applicant)

(Date) (Designation)

(Affix seal or stamp of Applicant)

(For and on behalf of)

17 . Attachments :

17.1 Evidence (s) of foreign registration certificate (s).

17.2 Three copies of original label of pesticide (s) to be registered, with approved label.

17.3 Authorized dealership.

17.4 Efficacy data¹¹.

17.5 Residue analysis^{12¹⁰}.

17.6 Eco(toxicological data^{13¹¹}.

17.7 Use pattern

17.7 Details of intended use pattern and need in Nepal, including recommended use and freq. of application.

17.8 Labels and leaflets in Nepali language (Domestic Formulator and Producer only)

17.9 Leaflets in Nepali language (Importers only)

5 Describe whether the product is flammable or not.

6 Lethal dose of the pesticides (Data transferable).

7 Describe pesticide container material and size.

8 Describe the storage facility, where and how you are going to store the pesticides.

9 Registration authority will assess the efficacy and crop safety of new pesticides in order to evaluate the benefits to be obtained from their use. The efficacy data, if not available from local trials, could be shared from other countries or regions with similar climatic and agricultural conditions. The efficacy data, in general, should contain evidence of performance of a standard pesticide with a comparable mode of action, which has been included in the trials alongside the material under test.

10 The use of pesticides may leave residues in agro-food so residue data are for setting maximum residue limit. Residue data, if not available locally could be shared from other countries, like pre-harvest intervals. Information on the nature, concentration and fate of residues of the pesticide in foods and feeding stuffs, and proposed use directions should be included.

11 Eco-toxicological properties include toxicological test results and environmental fate analysis of pesticides to be imported. in general such data can be transportable.



अनुसूची २

रु. १०/- को
हुलाक टिकट

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
विषादी समिति

विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजत पत्रको लागि आवेदन पत्र

(विषादी बिक्री गर्ने पसल वा कम्पनीका मालिक र स्यानेजरले भर्नुपर्ने र सम्बन्धी विषादी निरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु
पर्ने)

विषादी निरीक्षकको नाम: फोन नं.

१. कम्पनीको नाम :

ठेगाना : फोन नं. :

२. परीक्षार्थीको नाम :

ठेगाना :

कम्पनीमा निजको स्थान :

३. पसल (हरू) को ठेगाना :

..... (माथिको भन्दा फरक भएमा)

४. विषादी भण्डार वा

गोदाम (हरू) को ठेगाना

५. हस्ताक्षर : मिति :

कार्यालय प्रयोगको लागि :

प्राप्त मिति :

समितिलाई परामर्श दिएको मिति : निणाय :

विषादीको खुद्रा विक्रेता इजाजतपत्रको नमूना



नेपाल सरकार
Government of Nepal
कृषि विकास मन्त्रालय
Ministry of Agriculture Development
विषादी समिति
PESTICIDE BOARD
(Constituted under Sec. 3 (1) of the Pesticide Act-2046)

**विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत-पत्र
PESTICIDE RESELLER LICENCE**

धीरो
विषादी गोदाम "विषादीको सूरक्षित भण्डारण" सम्बन्धी विषादी समितिको मापदण्ड अनुसार पाइएकोसे उल्लेचित शर्त अन्तर्गत खुद्रा विक्री तथा भण्डारण गर्न यो इजाजत-पत्र प्रदान गरिएको छ।

विषादीको सूरक्षित भण्डारण तथा प्रयोगसम्बन्धी प्रमाण-पत्र र परिचय-पत्र प्राप्त देहात्पक्त व्यक्ति(हरु) कम्पनीको तरफबाट विषादी व्यवस्थापन र विक्री वितरणमा संलग्न रहेकोहै।

नाम :

प्रमाण पत्र नं. :

नाम :

प्रमाण पत्र नं. :

नाम :

प्रमाण पत्र नं. :

The Pesticides Premises of

at

Comply with the pesticide Board's requirements on

THE SAFE STORAGE OF PESTICIDES

and are licenced to sell and store pesticides with subject to the mentioned conditions.
That the following person(s) with certificates in the safe storage and Use of Pesticides
are associated with the management and sale of pesticides for the Company.

Name:

Cert No.:

Name:

Cert No.:

Name:

Cert No.:

इजाजत पत्र नं. :

Licence No.

जारी मिति : २०७.....।.....।.....

Date of Issue: 207.....-.....-

स्थाद सकिने मिति : २०७.....।.....।....

Date of Expiry: 20.....-.....-

प्रमुख
Chief



अनुसूची-३
नेपाल सरकार

रु. १०।- को
हुलाक टिकट

कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय विषादी समिति
विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजतपत्रका लागि आवेदन पत्र

मिति :

श्रीमान् प्रमुख ज्यू

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर ।

देहायाको विवरण खोली विषादी छर्कने व्यवसायीको इजाजतपत्रका लागि यो निवेदन पेश गर्दछु । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० (२०६४ संशोधन) को परिधिमा रही काम गर्ने व्यहोरा पनि अनुरोध गर्दछु ।

निवेदक

नाम :

सही :

पद :

सम्पर्क नम्बर:

१. विषादी छर्कने व्यवसायी र कम्पनीको नाम र ठेगाना :

नाम : गा.पा./न.पा. : .. वार्ड नं. : टेलिफोन नं. : ..

जिल्ला : फ्याक्स : ईमेल :

२. आवेदन साथ संलग्न कागजातहरू :

१. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय (कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय) मा कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र ।
२. मूल्य अभिवृद्धि कर/आयकर दर्ता प्रमाणपत्र ।
३. कम्पनीको विवरण (Company Profiles)
४. अनुभव : - विषादी प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति विवरण (तालिम समेत)

व्यावसायिक कामको अनुभव

विषादी सम्बन्धी ज्ञान

साक्षर जनशक्ति



अनुसूची ४

नेपाल सरकार
विषादी संश्लेषण गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन पत्र

रु. १०।- को
हुलाक टिकट

मिति :

श्रीमान् प्रमुखज्यू

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर ।

देहायको विवरण खोली विषादी संश्लेषण गर्ने इजाजतपत्रका लागि यो निवेदन पेश गर्दछ । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० को परिधिमा रही काम गर्ने व्यहोरा पनि अनुरोध गर्दछ ।

निवेदक नाम : सही : पद :

१. विषादी संश्लेषण गर्ने कम्पनीको नाम र ठेगाना :

नाम : गा.वि.स./न.पा.:

वार्ड नं.: जिल्ला :

टेलिफोन नं. :

फ्याक्स : ईमेल :

२. आवेदन साथ संलग्न कागजातहरू :

१. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र ।
२. मू.अ.कर/आयकर दर्ता प्रमाणपत्र ।
३. कम्पनीको विवरण (Company Profiles)
४. दक्ष जनशक्ति विवरण (तालिम समेत) ।
५. अन्य ।



नेपाल सरकार
Government of Nepal
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
Ministry of Agriculture and Livestock Development

विषादी समिति

PESTICIDE BOARD

(Constituted under Sec.3 (1) of the Pesticide Act-2048 (19991))

विषादी छक्कने व्यावसायीको इजाजत पत्र PROFESSIONAL PESTICIDE APPLICATION LICENCE

श्री लाई
(कम्पनीको नाम र ठेगना)

विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ र जीवनाशक विषादी नियमाबली, २०५०

बमोजिम देहायका शार्टहरु पालना गर्ने गरिं विषादी छक्कने व्यावसायीको इजाजत प्रदान गरिएको छ।

इजाजत पत्र नं.....

मिति.....

The Professional Pesticide Application Licence is hereby issued to

.....
subject to the conditions specified hereafter pursuant to

Pesticide Act. 2048 and Pesticide Rules, 2050

Licence No.....

Date :.....

प्रमुख
Chief

विषादीका विविध पक्षहरू

बिरुवामा रोग कीराहरूका कारणल हुने नोक्सानी

विश्वमा सबै बालीहरूमा वर्षेनी रोग, कीरार भारपातबाट नोक्सानी ३१-४२% हुने अनुमान गरिएको छ। औषत जम्मा नोक्सानी रोगहरूबाट १४.१%, कीराबाट १०.२%, भारपातबाट १२.२% र काटेपछि भण्डारण गर्दा ६-१२% पाइन्छ। यस्तो नोक्सानी विकसित देशमा बढी र विकाशोन्मुख देशमा भन अलि बढी हुने देखिन्छ। महादेश अनुसार २५% यूरोपमा, २९% उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा, ३०% रुस र चीनमा, ३३% दक्षिण अमेरिकामा, ४२-४३% अफिका र दक्षिण पूर्व एसियामा हुने गर्दछ। नोक्सानीको मात्रा रोग, कीरा र भारपात जस्ता शत्रु जीवले गर्दा बाली विशेष फरक पर्दछ, जस्तै फलफूलमा २३.४%, खाद्यान्नमा ३४.५%, उखुमा ५५% हुन्छ। त्यस्तै मौसम, वर्ष, विषादीको उपलब्धता, तालिम प्राप्त व्यक्ति र उत्पादकको ज्ञान अनुसार पनि नोक्सानी फरक पर्दछ। विश्वमा लगाइने सबै प्रकारका बालीहरूको उत्पादन करिब १५०० बिलियन डलर (सन् २००२) हुन्छ र यसको ५५० बिलियन डलर बराबरको रोग, कीरा र भारपातले गर्दा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको पाइन्छ।

रोग, कीरा र भारपातले गर्दा आर्थिक नोक्सानी मात्र हुँदैन यसको कारणले खाद्यान्नको अभाव हुन गई राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत असर पुर्दछ। आयरल्याण्डको मुख्य खाना आलु हो। सन् १८४५ मा आयरल्याण्डमा आलुको डडुवा रोगको कारणले भोकमरी भयो। सन् १८४० मा ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा भोकमरीको कारणले ४० लाख मात्र पुग्यो। आयरल्याण्डबाट सन् १८४७-१८५४ सम्ममा १६ लाख मानिस उत्तर अमेरिकामा बसाई सरे। यसरी बालीहरूमा विश्वमा समयमा रोगहरूले गर्दा ठूल ठूल नोक्सानीका घटनाहरू देखिने गरेका छन्। बिरुवामा रोगहरूका कारणले नोक्सानी भएका उदाहरणनीय केही घटनाहरू

रोग	स्थान	पुष्ट्याई
आलुको डडुवा	चिसो, आद्रिलो हावापानी हुने क्षेत्र	वर्षेनी देखिने सन् १८४५-१८४६ मा आयरल्याण्डमा भोक मरी
मकैको पात डडुवा	अमेरिका	सन् १९७० मा १ विलियन डलरको नोक्सानी
अंगुरको पाउडरी मिल्ड्यू	यूरोप र अमेरिका	सन् १८४०-१८५० मा रोग व्यापक
डच इल्म	यूरोप र अमेरिका	सन् १९१८ हालसम्म रोग व्यापक र नोक्सानी
कफीको सिन्दूरे	एसिया र दक्षिण अमेरिका	सन् १८७०-१८८० मा व्यापक नोक्सानी र अहिलेसम्म पनि दक्षिण अमेरिका समस्या
रबरको पातको डडुवा	दक्षिण अमेरिका	रबरको बिरुवालाई व्यापक नोक्सानी
अमिलो फलफूलको ट्रिस्टेजा भाइरस	अफिका र अमेरिका	लाखौं रुखहरू मरेका
अमिलो फलफूलको क्याड्र	एसिया, अफिका, ब्राजिल र अमेरिका	सन् १९१०, १९८० र १९९० लाखौं रुखहरूमा
स्याउको फायर ब्लाइट	उत्तरी अमेरिका, यूरोप र विश्वभर	प्रत्येक वर्ष हजारौं रुखहरू मर्दछन्
आरु बखडा मर्ने	प्यासिफिक, क्यानाडा र यूरोप	सन् १९६० मा हजारौं रुखहरू मरेका
जरामा लाग्ने नेमाटोड	विश्वभर	वर्षेनी तरकारी र विभिन्न बालीहरूमा ठुलो नोक्सानी

यी उल्लेखित र नयाँनयाँ रोगहरूको कारणले बर्षेनी तरकारी र विभिन्न बालीहरूमा ठुलो नोक्सानी हुने सम्भावना आइरहेको छ। तसर्थ बाली संरक्षण क्षेत्रमा संलग्न संघ, संस्था, कृषक वा विशेषज्ञहरूले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति तयार गर्ने र कार्यन्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। तसर्थ हाम्रो काम र लक्ष्य वातावरणलाई सन्तुलित गरेर अधिकतम उत्पादन बढाउने हुनुपर्दछ। विषादीलाई रोग, कीरा र भारपात व्यवस्थापनका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेर यसबाट हुन जाने ठुलो परिमाणको नोक्सानीलाई कमगर्न सकिन्छ। जसका लागि विषादीका प्रयोगकर्ताले विषादीका विविध पक्षहरूमा जानकारी हुनु नितान्त जरुरी छ।

१. विषादी

बीउ, बिरुवा, रुख, पशुपन्धी, मानव स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्र आदिमा लाग्ने शत्रुजीवहरूलाई रोक्ने, हटाउने, नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र नाश गर्ने लक्ष्य राखी प्रयोग गरिने विषादु पदार्थलाई नै विषादी भनिन्छ । विषादीले मानिस, जनावर, चरा, माछा, मौरी, माटोका शुक्म जीवाणु, जंगली जनावर, लाभदायी कीराहरूको क्षति र समग्र वातावरण नै दुषित बनाउने हुँदा यिनीहरूको लगातार र जथाभावी प्रयोग स्वीकार गर्न सकिदैन । विषादी लाई अंग्रेजीमा Pesticide भनिन्छ । जसमा Pest को अर्थ शत्रुजीव रicide को अर्थ मार्नु भन्ने बुझिन्छ । शत्रुजीव भन्नाले बोट बिरुवा, पशुपन्धी, मानिस एवं मानवको सम्पत्तिलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने जीव लाई शत्रुजीव भनिन्छ ।

नेपालमा पञ्जीकृत भएका विषादीहरू

विषादीको प्रकार	साधारण नाम	व्यापारिक नाम
कीटनाशक	५६	१७८८
दुसीनाशक	४२	११४१
व्याक्टेरियानाशक	१	२४
नेमाटोडनाशक	१	१
भारनाशक	३०	६२०
सुलसुलेनाशक	५	३२
शंखेकीरानाशक	१	४
मुसानाशक	२	४१
जैविक विषादी	१४	१७१
वनस्पतिजन्य	१३	१७
जम्मा	१६५	३०३५

१.१ विषादीको प्रयोग

आर्थिक उपार्जन र उपभोगको लागि लगाईएका कृनै पनि बोट बिरुवा, बाली नाली आदिमा विभिन्न किसिमका रोग, कीरा, भारपात, मुसा आदिले बाली कटानी अघि र पछि समेत गरेर विभिन्न तरिकाले करिब २०-३५% सम्म वार्षिक क्षति पुऱ्याइरहेको अवस्था छ । एकातिर उत्पादनको यति ठुलो हिस्सा वर्षेनी शत्रुजीवहरूबाट नोक्सान भइरहेको छ भने अर्कोतिर भूमिको उत्पादकत्व ह्लास र जनसंख्या वृद्धि तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कमसेकम शत्रुजीवहरू नोक्सान भइरहेको उत्पादनको हिस्सालाई मात्र कम गर्न सकियो भने पनि खाद्य सुरक्षामा ठुलो टेवा पुन्ने देखिन्छ । साथै मानव स्वास्थ्य, मानव सम्पत्तिको सुरक्षा एवं विभिन्न पुरातात्त्विक धरोहरहरूको बचाउकालागि समेत विषादीको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । साथै मानव तथा पशुहरूमा लाग्ने विभिन्न रोगका संबाहक (vectors) को नियन्त्रण गर्न पनि विषादीको प्रयोग गरिन्छ ।

१.२ विषादीको प्रयोगको विकासक्रम अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश :

विषादीको प्रयोग प्राचिन कालमा समेत हुने गरेको देखिन्छ । २०० B.C. मा समेत विषादीको प्रयोग भएको देखिन्छ, आर्सिनेट (arsenate), पेरिस ग्रिन (Peris green), सिसा (lead), गन्धक (sulfur) जस्ता आदि । तर त्यतिबेला प्रयोग हुने विषादीहरू Inorganic र Botanical Compounds हरू मात्र थिए । जसको प्रयोग सन् १९४० को दशकको अन्त्य सम्म भएको थियो र ती विषादीहरूलाई प्रथम पुस्ताका (First generation Pesticide) भनिन्छ ।

आधुनिक रासायनिक विषादी (Synthetic chemical Compound) को प्रयोग तब मात्र शुरु भयो जब सन् १९३९ मा स्वीस रसायन शास्त्री डा. पाउल मुलर ले डि.डि.टि. (DDT,dichloro-diphenyl-trichloroethane) मा कीटनाशक गुण पत्ता लगाए जुन फिंगा र लाम्खुद्वेको नियन्त्रणमा निकै प्रभावकारी पनि ठहरियो र यसले मलेरिया आदि रोगको

नियन्त्रण गरी लाखौ मानिसको ज्यान जोगियो । यसैका निमित्त उनले Nobel Prize समेत प्राप्त गरे । DDT को आविष्कार सँगै अरु आधुनिक विषादीहरूको पनि क्रमशः आविष्कार र प्रयोग हुँदै गयो । फलस्वस्प सन् १९५० देखि १९७० कौं दशकसम्ममा अन्य अर्गानोक्लोरोरीन्स कम्पाउण्ड, अर्गानाफोस्फेट कम्पाउण्ड, कार्बामेट्स् र सिन्थेटिक पाइरेश्रोआईड विषादीको आविष्कार भयो, प्रयोगमा ल्याइयो र यी विषादीहरूलाई दोस्रो पुस्ताको विषादी (Second generation pesticide) भनेर पनि भनिन्छ ।

यसैगरी १९८० को दशकदेखि एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (IPM) को Concept शुरू भए संगसँगै शक्तिजीव जन्य विषादी (Microbial pesticide) को प्रयोग शुरू भयो र यो समूहको विषादीलाई तेस्रो पुस्ताको विषादी (Third generation pesticide) पनि भनिन्छ । सँगसँगै बोट बिरुवामा शत्रुकीरा नियन्त्रण गर्न हर्मोनको प्रयोगको पनि शुरुआत भयो र यी कम्पाउण्ड हरूलाई चौथो पुस्ताको विषादी (fourth generation pesticide) पनि भनिन्छ । यसरी विषादीहरूको प्रयोग र विकास निरन्तर अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपाल परिवेश :

- नेपालमा प्रथम पटक सन् १९५२ मा औलो रोग नियन्त्रणको लागि डिडीटी आयात गरिएको ।
- सन् १९५५ मा पुनः सोही प्रयोजनको लागि डिडीटी आयात भयो ।
- बालीमा प्रयोग गर्न १९५६ मा डिडीटी आयात गरियो ।
- पहिलो विषादी उत्पादन गर्ने कारखाना Nepal Pesticide and Chemical Industries Private Ltd. (NEPCIL) को नामले सन् १९७७ मा कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा BHC, Methyl parathion, Zinc phosphide को उत्पादनका लागि स्थापना भयो ।
- त्यो समयमा NEPCIL ले ९ भन्दा बढी विषादी उत्पादन गर्दथ्यो र त्यो त्यसबेलाको बजारमा २० प्रतिशत थियो ।
- कृषि सामाग्री संस्थान NEPCIL को उत्पादन खरिद गर्ने प्रमुख खरिदकर्ता थियो ।
- सन् १९९५ पछि कृषि सामाग्री संस्थानले NEPCIL को उत्पादन खरिद गर्न बन्द गरे लगातै NEPCIL को उत्पादनमा कमी आयो र सो कम्पनी बन्द पनि भयो ।
- कृषि सामाग्री कम्पनिले खरिद कार्य बन्द गरे पछि निजी विषादी डिलरको विकास सन् १९९५ बाट शुरू भयो । जसले निजी थोक तथा खुद्रा बिक्रेताको सञ्जाल बढाने बाटो खुल्यो ।
- २०७८ फाल्गुन मसान्तसम्म ६ वटा विषादी संश्लेषक (Pesticide Formulator), ३५ वटा विषादी व्यवसायिक प्रयोगकर्ता, ३२० वटा विषादी आयातकर्ता र १६१२० विषादी खुद्रा बिक्रेता रहेका छन् ।

२. विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापना र उद्देश्य

जितिबेलासम्म विश्वमा जनसंख्याको चाप महशुस गरिएको थिएन त्यतिबेलासम्म खाने र खुवाउने चिन्ताको पनि महशुस गरिएन । तर समयसँगै जनसंख्या वृद्धि द्रुत गतिमा हुन थाल्यो भने कृषि क्षेत्र सिमित हुँदै गयो र बढदो जनसंख्याको खाद्यान्न आपूर्तिको चिन्ता सँगै सन् १९६० को दशकबाट हरित क्रान्तिको शुरुआत भयो । बालीका उन्नत जात, मलखाद र विषादीको प्रयोग अत्यधिक हुन थाल्यो र निरन्तर बढिरहेयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि विस्तारै पर्न थाल्यो । विषादीको सुरक्षित प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका सन्धि, समझौता, सम्झेलन, निर्देशिका एवं The international code of conduct on distribution and use of Pesticide (FAO, 1990) को शुत्रपात भयो ।

नेपालमा पनि विषादीको कारोबार र प्रयोग विस्तारै बढ्दै जान थाल्यो र नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता महशुस भई विषादीको आयात, निर्यात, संज्ञेषण, विक्री वितरण र व्यवसायिक प्रयोगलाई नियमन गरी व्यवस्थित गर्ने गराउने उद्देश्यले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ र जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० तयार भई २०५१ साल श्रावण १ गते देखि नेपालभर लागु गरियो । सोहि ऐनको दफा ७ को प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारले २०५१ सालमा तत्कालिन बाली संरक्षण तथा व्यवसायिक कीट विकास महाँसाखा अन्तर्गत विषादी पञ्जीकरण कार्यालयको स्थापना गरी विषादी पञ्जीकरण निकाय तोकेको थियो । पछि २०६१ सालको कृषिको नयाँ सांगठनिक संरचना अनुरूप कार्यालयको नाम परिमार्जन गरी विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा रहेको छ र नेपालभरी ७५ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन हुँदै आएको थियो ।

जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ को दफा ७ अनुसार विषादी पञ्जीकरण गर्ने निकायको स्थापना र सोहि ऐनको दफा १३ अनुसार विषादी निरीक्षकको नियुक्ति

गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५/०८/०२ को निर्णयले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई विषादी पञ्जीकरण गर्ने निकाय र कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत बाली संरक्षण अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.)लाई विषादी निरीक्षक वा सो जिल्लामा नभएमा छिमेकी जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत बाली संरक्षण अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) लाई विषादी निरीक्षक तोकेको छ । तदानुसार प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा विषादी व्यवस्थापन तथा पञ्जीकरण शाखालाई विषादी पञ्जीकरण र व्यवस्थापन कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ मिति २०७६/०५/१३ गर्ने जारी गरी विषादीको पञ्जीकरणका लागि प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । सो ऐन अनुसार केन्द्र प्रमुखले विषादी पञ्जीकरण गर्ने र सोको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

उद्देश्य : जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको अधिकारको प्रयोग गरी देशभित्र आयात, उत्पादन एवं खपत हुने विषादीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका निम्न उद्देश्य रहेका छन् :

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ र नियमावली २०५० (पहिलो संशोधन - २०६४ समेत) को परिधिभित्र रही विषादीको आयात, निर्यात, उत्पादन, किनबेच तथा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ।
- विषादी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, विषादीको गुणस्तर नियमन र निजी तथा सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्ने ।

३. नेपालमा विषादी प्रयोगको वर्तमान स्थिति

नेपालको प्रायः जसो सबै खेतीयोग्य जमिन प्रयोग भैसकेको र सीमित जमिनबाट बढि उत्पादन दोब्बर गर्नुपर्ने अवस्थालाई विचार गर्दा उपयुक्त योजना, भूउपयोग, वैज्ञानिक कृषिबाट र कृषि सामाग्रीको न्यायोचित प्रयोगबाट जमिनको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सकेमा राष्ट्रियोंको बढ्दो जनसंख्यालाई आवश्यक गास, बास र कपास राष्ट्रमै उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । कुनै बेला दक्षिण एसिया मै उल्लेख्य रहेका नेपालको कृषि उत्पादन यतिबेला विश्वकै कम हुन पुगेको छ । अझ कुनै समय मुलुकमा झण्डै आधा दर्जन धान चामल निर्यात गर्ने कम्पनी थिए भन्दा आश्चर्य मान्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालमा कृषि विकासको समस्यालाई गहिराएर विश्लेषण गर्नु पर्दा दिगो कृषि विकासको लागि वातावरण एवं समय अनुकूल उपयुक्त प्रविधि र रासायनिक मल र विषादीको समुचित प्रयोग एवं सही विकल्पको खाँचो नै विद्यमान न्यूनतम उत्पादकत्व र वातावरण प्रदुषणको प्रमुख कारण देखिन्छ ।

बातीनालीमा रोग/कीराको प्रकोप हुनु भनेको शत्रुजीव, बाली र वातावरण यी तीन पक्ष बीचको जटिल अन्तरसम्बन्धको असन्तुलनको परिणाम हो । प्राकृतिक अवस्थामा सामान्यतया यो सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ । तर, यो सन्तुलन खलबलिदां शत्रुजीवको प्रकोपले महामारीको रूप लिन्छ र आर्थिक नोक्सानीको तह (Economic Threshold) भन्दा पनि माथि जान्छ । यस्तो अवस्थामा सो सन्तुलन पुनः कायम राख्न बाली संरक्षणका बैकल्पिक उपायहरूको उपयोग र विषादीको सही र समुचित प्रयोगलाई प्रोत्साहन र निरन्तरता दिन अपरिहार्य हुन्छ ।

कुनै पनि बालीमा प्रयोग गरिएको करिब द० प्रतिशत जीवनाशक विषादी साधारणतया माटोमा टुङ्गिन पुगदछ । माटोमा पुगेको विषादी निस्किय हुन निकै समय लाग्छ । यसबाट माटोमा रहेका शुक्ष्म जीवाणुहरूलाई आघात पुग जानुका साथै भूमिगत जलश्रोत, खाल्डो र खोलामा विष प्रदुषण हुने खतरा बढ्न जान्छ । यसका लागि विषादीको न्यूनतम प्रभावकारी मात्रालाई प्रयोगमा ल्याएर माटोमा हुने प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । माटोका सुक्ष्म जीवाणुहरूको गतिविधिमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले माटोलाई थप प्रदुषित पार्नमा नै मद्दत पुऱ्याउँछ ।

विषादीबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा विषादी प्रयोगको सही दिशा आत्मसात गर्नु पर्दछ । आखिरमा विषादी विष नै हो र यसलाई ओषधिको रूपमा व्यबहार गर्न सकिदैन । तसर्थ विषादीलाई सावधानीपूर्वक तथा वृद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरिएमा र विषादीको साथमा हुने पर्चामा दिईएका निर्देशनहरूलाई राम्ररी पालन गरिएमा वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्न सम्भो प्रतिकुल प्रभाव न्युन गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता विषादीको दुरुपयोग गरिएमा भने त्यसको प्रयोगबाट फाइदा भन्दा कैयो गुना बढी नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । केही देशहरूको विषादीको प्रयोग मात्रा केजी प्रति हेक्टर

क्र.सं.	देश	विषादीको प्रयोग मात्रा केजी प्रति हेक्टर
१	इजराइल	११.६
२	मालिप्प्स	१.२.२.९
३	कोरिया	१.४.७४
४	जापान	१४.१८

क्र.सं.	देश	विषादीको प्रयोग मात्रा केजी प्रति हेक्टर
५	सेन्ट लिसिया	१ ४.३३
६	कोलोम्बिया	१ ४.५७
७	माल्टा	१ ६.७७
८	बार्बाडोस	१८.० ६
९	कोस्टारिका	१८. ७८
१०	बाहामास	३२.२२
११	भारत	०.२६१
१२	चीन	१०. ४५
१३	नेपाल	०.३९६ खास विष (Sharma et. al, 2015)
१४	अमेरिका	३.८८६

श्रोत (एफ ए ओ, २०१६)

विकासोन्मूख देशले विश्वमा खपत हुने जम्मा विषादीको २५ प्रतिशत खपत गर्दछ तर विषादीबाट हुने मृत्यु भने ९० प्रतिशत हुने पाइएको छ । (WHO, 2014)

नेपालमा विषादीको औषत प्रयोग ३९६ ग्राम खास विष प्रति हेक्टर (विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, २०७०) बाली विशेष हेर्दा, विषादी प्रयोगको अवस्था भयानक जस्तो देखिने । चियामा २१०० ग्राम खास विष प्रति हेक्टर, कपासमा २५६० ग्राम खास विष ग्राम प्रति हेक्टर, तरकारीमा १६०५ ग्राम खास विष प्रति हेक्टर, अन्य बालीहरूको हकमा विषादीको प्रयोगको अवस्था हेर्दा अन्तबालीमा ४६ ग्राम खास विष प्रति हेक्टर, नगदेबालीमा १८८ ग्राम खास विष प्रति हेक्टर, दालबालीमा ५० ग्राम खास विष प्रति हेक्टर, फलफूलमा २९ ग्राम खास विष प्रति हेक्टर रहेको छ । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विषादीको प्रयोगको अवस्था हेर्दा हिमालमा ८५ ग्राम खास विष/हे., पहाडमा ३१५ ग्राम खास विष/हे., तराईमा ९९५ ग्राम खास विष/हे., उपत्यकाको हकमा ४७० ग्राम खास विष/हे. वार्षिक रहेको छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति

विकास र वातावरण बीचको सम्बन्धलाई अहम् महत्व दिएर संयुक्त राष्ट्र संघबाट विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रहरूले संचालन गर्नु पर्ने कार्यहरूको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यही अवधारणालाई ध्यानमा राखि संयुक्त राष्ट्र संघको २२ डिसेम्बर १९८९ को साधारण सभाले सन् १९९२ को जुन ३ देखि १४ तारिखसम्म विश्वको वातावरण संरक्षणको लागि ब्राजिलको राजधानी रियो द जेनेरियोमा पृथ्वी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको यो सम्मेलनले सिफारिश गरेका “वातावरण र विकास” शीर्षक अन्तर्गतका सवालहरूले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा ठुलो महत्व राख्दछ । यस एजेण्डामा मानव स्वास्थ्यको संरक्षण तथा सम्बद्धन र वायुमण्डलको संरक्षणका लागि विभिन्न बुँदाहरू सिफारिश भएका छन् ।

वातावरण संरक्षणको अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी पृथ्वी सम्मेलन पछि नेपालको आफ्नो वातावरण नीति र कार्य योजनालाई वातावरण संरक्षण परिषदले सर्वप्रथम सन् १९९३ मा प्रकाशनमा ल्यायो । उक्त योजना अन्तर्गत नै विभिन्न क्षेत्रको अनुकूल नीति र कार्ययोजनाहरूलाई राष्ट्रको वातावरण, जनताको स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास र संस्कृतिको जगोनासंग आवद्ध गरी अघि बढाउदै लैजान नीति तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि रासायनिक विषादीबाट सिर्जना हुने वातावरणीय समस्याले नगाँजेको मुलुक शायदै कुनै होला । वातावरणीय प्रतिकूलता आज विश्वकै ऐउटा विकराल समस्या बनेको छ । कैनै एक कृनामा भएको प्रदृशणको असर विश्वको अर्को कृनामा समेत पर्ने भएकोले अहिले वातावरण प्रदृशणलाई विश्वको साफ्ना समस्याको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । खासगरी मानव जीवनलाई सर्वसुलभ तुल्याउने अभिप्रायले गरिएका विभिन्न क्रियाकलापहरूले वातावरणका साथसाथै मानव स्वास्थ्यलाई समेत प्रभावित पार्ने त्यस्ता मानवीय क्रियाकलापहरूमध्ये एक प्रमुख होस विषादीको उत्पादन तथा यसको जथाभावी प्रयोग ।

कृषिमा प्रयोगको लागि भनेर बनाइएका शुरुमा दर्जन नहुने १२ वटा अत्यन्त घातक एवं चीर स्थायी रसायन वा विषादीहरूलाई (Dirty Dozen) भनिन्थ्यो । आज यो संख्या १६ थप भाएर २८ वटा पुगेको देखिन्छ । यस्तै विषादीहरू वातावरणमा थुप्रिदै जाने (PersistantOrganic Pollutants) वर्ग भित्र पर्दछन् । त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई अध्ययन गरी केहि रसायनहरूलाई घातक रसायन PIC listed (Prior Informed Consent) भनेर तोकिएका छन् र यो संख्या पनि बढ्ने क्रममा छ । Persistant Organic Pollutant tyf Prior Informed Consent(POP/PIC) रसायनहरूमा जनस्वास्थ्य एवं वातावरणीय दृष्टिले प्रायः निषेध गरिएका र निषेध हुने सम्भावना भएका विषादीहरू पर्दछन् ।

५. नेपालको प्रतिबद्धता

नेपालले अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा वातावरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा एक्यवद्धता व्यक्त गरेको छ। Pesticide / POPs Management को लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि महासन्धिहरू

- Basel Convention (5 May 1992)
- Rotterdam Convention (24 February 2004)
- Stockholm Convention (May 2004)

Treaty	Signature	Ratification	Status
Basel Convention of the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal	22/03/1989	15/10/1996	Accession
Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in the international trade		09/02/2007	Accession
Stockholm convention on persistent organic pollutants	05/04/2002	06/03/2007	Accession

- Basel Convention (May 1992)

The Convention was opened for signature on 22 March 1989, and entered into force on 5 May 1992. Nepal has already ratified the treaty on October 15, 1996 and was fully effective from January 13, 1997.

The Basel Convention on the Control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, usually known simply as the Basel Convention, is an international treaty that was designed to reduce the movements of hazardous waste between nations, and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries (LDCs). The Convention is also intended to minimize the amount and toxicity of wastes generated, to ensure their environmentally sound management as closely as possible to the source of generation, and to assist LDCs in environmentally sound management of the hazardous and other wastes they generate

- Rotterdam Convention (February 2004)

This treaty was approved on September 11, 1998 and came into force on February 24, 2004. The house of representative on 02 February 2007 has ratified and Rotterdam Convention on PIC to become party to this convention came into force on 10 May, 2007. The Rotterdam Convention is a global treaty on the Prior Informed Consent, PIC, (पूर्व जानकारीको सर्त) procedure for certain hazardous chemicals and pesticide in international trade.

Objectives of Rotterdam Convention

- to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm;
 - to contribute to the environmentally sound use of those hazardous chemicals, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.
- Stockholm Convention (May 2004)

The Stockholm convention was approved on 22 May, 2001. The treaty was entered into force from 17 May, 2004. Nepal showed its commitment to this convention by signing the treaty on 5 April, 2002 and recently on 17 October, 2006 house of representative ratified this convention to become the party to the convention.

अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा नेपालले ऐक्यवद्धता जनाईसकेका कुराहरूलाई धेरै हदसम्म विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ मा समावेश गरी नेपालले वातावरणीय पक्षलाई निकै महत्व दिएको प्रतित हुन्छ। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्यको हाईसियतले दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलामा विषादी व्यवस्थापन तर्फ पि.आई.सि. लिएट भित्र पर्ने मिथायल पाराथायन र मोनोकोटोफस विषादीहरूको उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धमा समिक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुरूप हाल ती विषादीहरूको प्रयोग र पञ्जीकरणमा प्रतिबन्ध लगाईसकिएको छ।

अत्यन्त घातक एवं चीर स्थायी रसायन वा विषादीहरूको श्रोत विषादी (Pesticide), औद्योगिक रसायनहरू (Industrial chemicals) र नचाहदा नचाहदै बनेका उत्पादनहरू (Unintentional production) हुन । शुरुमा नष्ट नहुने अत्यन्त घातक एवं चीर स्थायी १२ वटा रसायन वा विषादीहरू

SN	Chemicals	Group	Annex
1.	Aldrin	Pesticide (P)	A(Elimination)
2.	Chlordane	Pesticide	A(Elimination)
3.	Dieldrin	Pesticide	A(Elimination)
4.	Endrin	Pesticide	A(Elimination)
5.	Heptachlor	Pesticide	A(Elimination)
6.	Hexachlorobenzene	Pesticide(P) and industrial chemicals (IC)	A(Elimination)
7.	Mirex	Pesticide	A(Elimination)
8.	Toxaphane	Pesticide	A(Elimination)
9.	PCB	Industrial chemicals and Unintentional production (UP)	A(Elimination) C(Unintentional production)
10.	DDT	Pesticide	B (Restriction)
11.	Polychlorinated dibenzo-pdioxins and dibenzofurans	Unintentional production	C(Unintentional production)
12.	Hexachlorobenzene	Unintentional production	C(Unintentional production)

P= Pesticide IC=Industrial chemical UP= Unintentional production E= Elimination R=Restriction
सन् २००९ मा भएको बैठकले गरेको निर्णय र सन् २०१७ मा भएको Stockholm Convention बाट १६ वटा थप भएर २८ वटा पुगेकोले थप भएका नयाँ अत्यन्त घातक एवं चीर स्थायी रसायन वा विषादीहरू

SN	Chemicals	Group	Annex
1.	Alpha hexachlorocyclohexane and beta hexachlorocyclohexane	P	A
2.	Beta hexachlorocyclohexane	P	A
3.	Chlordecone	P	A
4.	Hexabromobipheny	IC	A
5.	Hexabromocyclododecane	IC	A
6.	Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether (commercial octabromodiphenyl ether)	IC	A
7.	Hexachlorobutadiene	IC	A,C
8.	Lindane	P	A
9.	Pentachlorobenzene	IC	A,C
10.	Pentachlorophenol and its salts and esters	P/IC/UP	
11.	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	P	A
12.	Polychlorinated naphthalenes	IC/UP	A,C
13.	Technical endosulfan and its related isomers	P	A
14.	Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial pentabromodiphenyl ether)	IC	A
15.	Decabromodiphenyl ether (Commercial mixture, c-DecaBDE)	IC	A
16.	Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs)	IC	A

P= Pesticide IC=Industrial chemical UP= Unintentional production

According to PIC of Rotterdam Convention, the new group of PIC listed Annex III compounds, updated at Dec., 2018.

There are a total of 50 chemicals listed in Annex III, 34 pesticides (including 3 severely hazardous pesticide formulations), 15 industrial chemicals, and 1 chemical in both the pesticide and the industrial chemical categories.

S.N.	Chemicals	Category	Date of first dispatch of decision guidance document
1	2,4,5-T and its salts and esters	Pesticide	Prior to adoption of Convention
2	Alachlor	Pesticide	24- Oct -2011
3	Aldicarb	Pesticide	24- Oct -2011
4	Aldrin	Pesticide	Prior to adoption of Convention
5	Azinphos-methyl	Pesticide	10- Aug -2013
6	Binapacryl	Pesticide	1- Feb -2005
7	Captafol	Pesticide	Prior to adoption of Convention
8	Carbofuran	Pesticide	
9	Chlordane	Pesticide	Prior to adoption of Convention
10	Chlordimeform	Pesticide	Prior to adoption of Convention
11	Chlorobenzilate	Pesticide	Prior to adoption of Convention
12	DDT	Pesticide	Prior to adoption of Convention
13	Dieldrin	Pesticide	Prior to adoption of Convention
14	Dinitro-ortho-cresol(DNOC)and its Salts	Pesticide	1- Feb -2005
15	Dinoseb and its salts and esters	Pesticide	Prior to adoption of Convention
16	1,2-dibromomethane(EDB)	Pesticide	Prior to adoption of Convention
17	Endosulfan	Pesticide	24- Oct -2011
18	Ethylene dichloride	Pesticide	1- Feb -2005
19	Ethylene oxide	Pesticide	2- Feb -2005
20	Fluoroacetamide	Pesticide	Prior to adoption of Convention
21	HCH(mixed isomers)	Pesticide	Prior to adoption of Convention
22	Heptachlor	Pesticide	Prior to adoption of Convention
23	Hexchlorobenzene	Pesticide	Prior to adoption of Convention
24	Lindane (gamma HCH)	Pesticide	Prior to adoption of Convention
25	Mercury compounds including inorganic, alkyl, alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds	Pesticide	Prior to adoption of Convention
26	Methamidophos	Pesticide	15- Sep -2015
27	Monocrotophos	Pesticide	1- Feb -2005
28	Parathion	Pesticide	1- Feb -2005
29	Pentachlorophenol and its salts and esters	Pesticide	Prior to adoption of Convention
30	Toxaphene	Pesticide	1- Feb -2005

31	Tributyl tin compounds	Pesticide	1- Feb -2009
32	Trichlorfon	Pesticide	
33	Dustable powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10% and thiram at or above 15%	Severely hazardous pesticide formulation	
34	Methyl parathion	SHPF	Prior to adoption of Convention
35	Dustable Powder formulation		
	containing a combination of: Benomyl at or above 7% Carbofuran at or above 10% Thiram at or above 15%	SHPF	1- Feb -2005
36	Phosphamidon(soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)	SHPF	Prior to adoption of Convention
37	Actinolite Asbestos	Industrial	1- Feb -2005
38	Anthophyllite Asbestos	Industrial	1- Feb -2005
39	Amosite Asbestos	Industrial	1- Feb -2005
40	Tremolite Asbestos	Industrial	1- Feb -2005
41	Crocidolite Asbestos	Industrial	1- Feb -2005
42	ComercialOctabromodiphenyl ether inculding: Hexabromodiphenyl ether, Heptabromodiphenyl ether	Industrial	10- Aug -2013
43	Comercialpentabromodiphenyl ether inculding: Tetrabromodiphenyl ether,Pentabromodiphenyl ether	Industrial	10- Aug -2013
44	Perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonys	Industrial	10- Aug -2013
45	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Industrial	Prior to adoption of Convention
46	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Industrial	Prior to adoption of Convention
47	Polychlorinated terphenyls (PCTs)	Industrial	Prior to adoption of Convention
48	Tetraethyl lead	Industrial	Prior to adoption of Convention
49	Tetramethyl lead	Industrial	1- Feb -2005
50	Tributyltin compounds	Industrial	
51	Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate	Industrial	Prior to adoption of Convention

६. आ.व. २०७७/२०७८ मा नेपालमा विषादी आयातको विवरण Total Pesticide Imported and Formulated in Nepal 2020/2021 (2077/78)

S.No.	Pesticides	Total Quantity (Kg)	Total a.i. (Kg)	Total Amount Rs.
1	Insecticide	1108011.44	186493.42	577436904.04
2	Fungicide	653458.10	407887.76	255941779.98
3	Bactericide	350.00	35.00	1201360.00
4	Herbicide	406140.40	184718.59	213689198.93
5	Rodenticide	13810.00	4008.44	6426973.90
6	Molluscicide	2500.00	150.00	1500000.00
7	Bio pesticide	11735.00	17.60	4343508.00
9	Herbal	1000	32.5	1284105.9
	Grand Total	2197004.94	783343.30	1061823830.75

७. नेपालमा प्रतिबन्धित विषादीहरूको सूची (List of Banned Pesticides in Nepal)

क्र.सं.	विषादीको नाम	प्रतिवन्धित गरेको मिति	नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मिति र राजपत्र विवरण	कैफियत
१	क्लोरडेन(Chlordane)	२०५७।१२।२७	खण्ड ५०, मिति २०५७।१२।२७, संख्या ५१, भाग ३	
२	डि.डि.टि.(DDT)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
३	डाईअल्ड्रिन(Dieldrin)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
४	ईन्ड्रिन(Endrin)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
५	अल्ड्रिन(Aldrin)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
६	हेप्टाक्लोर(Heptachlor)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
७	मिरेक्स(Mirex)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
८	टोक्साफेन(Toxafen)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
९	लिंडेन(Lindane)	२०५७।१२।२७	""""	Persistent Organic Pollutant
१०	वियच सी(BHC)	२०५७।१२।२७	""""	
११	फफ्समिडन(Phosphamidon)	२०५७।१२।२७	""""	
१२	अर्गोनोमर्करीक्लोराइड(Organo mercury chloride)	२०५७।१२।२७	""""	
१३	मिथायलपाराथियन(Methyl Parathion)	२०६४।०९।१६	खण्ड ५७, मिति २०६४।०९।१६, संख्या ३७, भाग ३	
१४	मनोक्रोटोफस(Monocrotophos)	२०६४।०९।१६	""""	
१५	इण्डोसल्फान(Endosulfan)	२०६९।०७।२०	खण्ड ६२, मिति २०६९।०७।२०, संख्या ३१, भाग ३	Persistent Organic Pollutant
१६	फोरेट(Phorate)			जीवनाशक विषादी समितिको मिति २०७२/०३/२० गतेको वैठकबाट प्रतिवन्धित गर्ने निर्णय, राजपत्रमा प्रकाशित हुनबाँकी

क्र.सं.	विषादीको नाम	प्रतिवन्धित गरेको मिति	नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मिति र राजपत्र विवरण	कैफियत
१७	कार्बोफ्युरान(Carbofuran)	२०७५।०९।१६	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
१८	कार्बारिल(Carbaryl)	२०७५।०९।१६	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
१९	डाइक्लोरभस(Dichlorvos))	२०७५।०९।१६	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
२०	ट्रायजोफस(Tiozophos)	२०७५।०९।१६	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
२१	बेनोमाइल(Benomyl)	२०७५।०९।१६	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
२२	डायकोफोल (Dicofol)	२०७६।०४।१९	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
२३	कार्बोसल्फान (Carbosulfan)	२०७६।०४।१९	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	
२४	एलम्यूनियमफोस्फाइड ३ग्रामटेब्लेट(A luminum Phosphide 3 gram tablet)	२०७६।०४।१९	खण्ड ६९, मिति २०७६।१०।१३, संख्या ४२, भाग ५	

द. विषादीको वर्गीकरण

विभिन्न वीउ, विरुद्धा, रुख, पशु, पंक्षी आदिमा लाग्ने घातक कीटाणुहरू नाश गर्न प्रयोग गरिने पदार्थ हो जीवनाशक विषाद। जीवनाशक विषादी कीराहरू, बालीरोग, झारपात, मुसा र अन्य पिराहा जनावरहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोजनको लागि बनाएको हुन्छ। जीवनाशक विषादीहरूलाई निम्न रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

१. वातावरणीय दृष्टिले विषादीहरू दुई किसिमका छन्।

१.१ वातावरणमा क्षय हुँदै जाने (Environmentally Degradable or Non-Persistent) खालका

वातावरण (पानी, हावा, प्रकाश, ताप) को सम्पर्कमा आईसकेपछि विस्तारै क्षय हुँदै जाने (Environmentally Non-Persistent) वा वातावरणमा थोरै दिन मात्र रहे पछि आफै क्षय (Breakdown) भएर जाने किसिमका विषादीहरू यस वर्गमा पर्दछन्।

उदाहरण: डाइमेयोट (नुगर, रोगर, डाइमेट), मालाथायन, डाइक्लोरभोस (डुम, भेपोना), केनिट्रोथिओन (फोलीथिओन) आदि

१.२ वातावरणमा थुप्रिदै जाने (Environmentally Non-Degradable or Persistent) खालका

यस वर्ग अन्तरगत वातावरणमा छिदै क्षय नहुने वा हाम्रो शरीरमा हुने वोसोको अंशमा मिसिएर रहिरहने र वातावरणमा समेत लामो समयसम्म रही वातावरणलाई दुषित पार्ने खालका (POPs) विषादीहरू पर्दछन्। Persistant Organic Pollutants(POPs) मा अल्ड्रिन, क्लोरोडेन, डि.डि.टि., डायअल्ड्रिन, एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, माइरेक्स, टोक्साफेन, एच.सि.वि., र फ्युराडन आदी जस्ता सजिलै नष्ट वा क्षय नहुने (अविनाशी) प्रकृतिका विषादीहरू पर्दछन्। यस्ता किसिमका रसायनहरू विसर्जन गर्न Special Treatment Facility को आवश्यकता पर्दछ जुन हाल नेपालमा उपलब्ध छैन।

२. लक्षित जीवको आधारमा विषादीको वर्गीकरण

क) कीटनाशक विषादी (Insecticide)

बालीनाली, घरगोठ, अन्न भण्डारण, घरको जग, बगैंचामा हानी गर्ने कीराको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने रासायनिक, जैविक तथा वनस्पतीजन्य विषादी समझनु पर्दछ।

कीटनाशक विषादीहरू यस्ता किराहरूलाई तत्काल मार्न, नपुंषक बनाउन, प्यारालाईसिस् गराउन, भगाउन वा भोक मार्ने बनाउन आदिमा प्रयोग गरिन्छ।

कीरा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने विषादी । जस्तै: ईमिडाक्लोप्रिड ,मालाथियन, एसिफेट, क्लोरोपाइसिफोस, साइपरमेश्विन, फेनवालारेट, एजिडोरेक्टिन आदि ।

ख) दुसीनाशक विषादी (Fungicide)

दुसी सम्बन्धी रोगहरू रोक्न, नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने विषादीहरूनै दुसीनाशक विषादीहरू हुन् ।

जस्तै: म्यान्कोजेव, कार्बेन्डाजिम, कपरअक्सिक्लोराइड, हेक्जाकोनाजल, थिराम, जिनेब आदि ।

ग) झारपातनाशक विषादी (Herbicide/Weedicide)

झारपात मार्न, उम्रन नदिनका लागि प्रयोग गरिने विषादीहरू नै झारपातनाशक विषादी हुन् । जस्तै: ब्युटाक्लोर, ग्लाइफोसेट, २-४ ढी, पाराक्वाट आदि । यी विषादीहरू यस प्रकारका हुन्छन् ।

१. विशिष्ट झारपातहरू /Selective Herbicide: निश्चित प्रकृतिका वनस्पतिलाई मात्र मार्ने । उदाहरणका लागि

- सागुरोपात झारपातनाशक जस्तै: Acetachlor
- चौडापाते झारपातनाशक जस्तै: २ ४D र Pendimethalin

२. सम्पूर्ण झारपातनाशक /Non selective Herbicide: सबै प्रकारका वनस्पति मार्द्धन जस्तै: पयाराक्वाट, डाइक्वाट, Glyphosate

३. Pre planting Herbicide- बाली लगाउनु अगाडि प्रयोग गरिनेजस्तै: Pendimethalin

४. Pre-emergency Herbicide- बाली लगाएपछि झारपात नउम्भै प्रयोग गरिने जस्तै: Pendimethalin

५. Post emergency Herbicide- झारपात उम्रिसकेपछि प्रयोग गरिने जस्तै: 2,4-D, Glyphosate

घ) मुसानाशक विषादी (Rodenticide)

मुसा र त्यसै जातका अन्य जनावर मार्न प्रयोग गरिने विषादी । जस्तै: जिन्क फोस्फाइड, ब्रोमाडियोलान ।

ङ) सुलसुलेनाशक विषादी (Acaricide/Miticide)

सुलसुले मार्न प्रयोग गरिने विषादी । जस्तै: प्रोपार्जाइट (Propargite), फेनपाइरोक्सिमेट (Fenpyroximate), हेक्सीथायजक्स (Hexythiazox), फेनाजाक्वीन (Fenazaquin) आदी ।

च) व्याकटेरियानाशक विषादी (Bacteriacide)

व्याकटेरिया मार्न प्रयोग गरिनेविषादी

जस्तै: स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट + टेट्रामाइसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड (Streptomycin sulphate + Tetracyclin Hydrochloride) ।

छ) शंखे कीरा नाशक विषादी (Molluscicide)

शंकेकीरा (Snails/Slugs) मार्न प्रयोग गरिने विषादी

जस्तै: मेटलडिहाइड (Metaldehyde)

३. कार्य प्रकृतिको आधारमा किटनाशक विषादीको वर्गीकरण

क) सम्पर्क विषादी (Contact Pesticide)

- कीराको शरीरमा विष लागी कीराहरू मर्ने
- प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउदा कीराको बाहिरी आवरणले विष लाई सोस्दछ र मर्दछ ।
- खासगरी नरम शरिर भएका कीराहरू यस्ता विषादीले सजिलै मर्दछन् जस्तै :लाही, झुस नभएका लार्भ, थ्रिप्स, सेते झिंगा ।

जस्तै: मालाथिएन, एसिफेट, क्लोरोपाईरिफस, साइपरमेश्वीन, फेन्भालेरेट, डेल्टामेश्वीन, अल्फामेश्वीन आदि ।

ख) आन्तरिक विषादी (Stomach Pecticide)

- विषादीलाई कीराहरूले खाएपछि मात्रै विषादी लागी कीराहरू मर्ने
- कुनै न कुनै प्रकारावाट कीराहरूले खाएर पेटमा पुगेको हुनुपर्छ ।
- उपचार गरिएको विषादी लागेको विरुवाका पातहरू वा फलफूललाई कीराहरूले खाँदा कीराहरू मर्द्धन ।
- काट्ने-चपाउने मुखाकृति भएका किराहरू जस्तै: खपटे, खुम्रे, झुसिलकिरा, फटेडग्रा, किर्थो आदी ।

जस्तै: मालाथिएन, क्लोरोपाईरिफस, साइपरमेश्वीन, फेनभेलेरेट, इमामेक्टीन बेन्जोएट आदि ।

ग) दैहिक विषादी (Systemic Pesticide)

- विरुवाको सम्पूर्ण भागहरूमा पुगी विरुवा नै विषात्त बन्दछ ।
 - बोटका पात वा जराहरूले विष सोस्ने गर्दछ ।
 - विरुवाको रस चुस्दा कीराहरूले यस प्रकारको कीटनाशक विषादी सेवन गर्दछ र कीरा मर्दछ ।
 - चुस्ने जातका कीराहरू र गुबो, ढुड्गो आदी भित्र लुकेर क्षति गर्ने खालका कीराहरू नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ जस्तै पतेरा, फड्के, लाही, थ्रिप्स, सेतो झिंगा, लिफ माईनर, गबारो आदी ।
- जस्तै: कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, डाइमेथोएट, फिप्रेनिल, ईमिडाक्लोप्रिड, एसिडामिप्रिड आदी

घ) धुवाउने विषादी (Fumigants)

यस्ता विषादीहरूवाट हावाको सम्पर्कमा आएपछि विषालु ग्याँस निस्कन्छ र सो ग्यास कीराहरूले सास फेर्दा कीराहरूको शरीरभित्र पसि कीराहरूलाई मार्दछ । यस्ता विषादीहरू खास गरि भण्डारणमा लारने किराहरू नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

जस्तै: एलुमिनियम फस्फाइड, मिथाईल त्रोमाइड आदि

हाल नेपालमा एलुमिनियम फस्फाइड ३ ग्रामको ट्याब्लेट प्रतिवन्ध गरिएको छ । मिथाईल त्रोमाइड पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

धुवाउने विषादी एलुमिनियम फस्फाइड(Aluminium Phosphide) १० ग्रामको धुलो पाउच र एलुमिनियम फस्फाइड(Aluminium Phosphide) १५ प्रतिशतको १२ ग्राम ट्याब्लेट कसरी प्रयोग गर्ने

एल्युनियम फोस्फाइटएक धुवादार कीटनाशक विषादी हो । जसको धुवाले कीराहरूलाई मार्दछ । यो विषादी हावामा खुला रहदा फोस्फाइन गैस तथार हुन्छ । यो निकै धातक हुन्छ । यस ग्यासले संग्रह गरिएको अनाजका कीराहरू नष्ट गर्दछ । यो धुलो प्रयोग गर्न सजिलो तथा यसको प्रयोगमा कुनै ठुला र महंगो औजारको आवश्यकता पढैन । यसलाई विभिन्न प्रकारका संचित अनाजका कीराहरू मार्न प्रयोग गरिन्छ । यसको रेसिड्यु विषास र हानिकारक हुँदैन साथै यसले अनाजको गुणस्तरमा असर गर्दैन । यो यस्तो प्रकारको कीटनाशक तथा मुशानाशक हो जसको स्वास्प्रधास, भेटावोलिक र स्नायुमा विशास बनाइ काम गर्दछ ।

S. No	Formulation	Dose
1	12 gm TAB/ AIP 15%	4 / MT
2	10 Gram Pouch /AIP 56%	1/MT

- यो विषादी प्रयोग गर्दा अनिवार्य ग्यास मास्क र सुरक्षात्मक सामग्री प्रयोग गर्ने ।
- विषादीको प्रयोग हावा बाहिर जान नसक्ने मेटल विन वा हावा लिक नहुने अवस्थामा गर्नु पर्दछ ।
- विषादीको प्रयोग गरेर करिब १ हप्ता बढि समयसम्म राख्नु पर्दछ ।
- यो विषादीको प्रयोग पछि हावा चल्ने ठाउँमा अनाज राख्दा करिब ७ देखि १५ दिन पछि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

इ) भौतिक विषादी

- यस्ता विषादीहरूले कीराहरूलाई गुम्स्याएर वा उकुसमुकुस पारी सास फेर्न नमिल्ने बनाई मार्दछ ।
- जस्तै: खनिज तेल (पेट्रोलियम तेलहरू), सर्वो एग्रो स्प्रे आदि ।

४. क) रासायनिक संरचनाको आधारमा कीटनाशक विषादीको वर्गीकरण

अ) अर्गानोक्लोरोरीन्स समूह (Organic –Chlorine Group of Pesticide)

- सम्पर्क र आन्तरिक प्रकृतिका ।
- लामो समयसम्म माटोमा, वातावरणमा रहिरहने ।
- वोसोयुक्त शरिरको भागमा संचय हुने ।
- अल्ड्रिन, डाइअल्डिन, डि.डि.टि., बि.ए.च.सि., क्लोरोडेन, लिन्डेन, आदी पर्दछन् र यी सबै हाल नेपालमा प्रतिवन्धीत भइसक्ने छन् ।

ख) अर्गानो फस्फेट समूह (Organic Phosphate Group of Pesticide)

- प्रयोग कर्ताको लागि बढी धातक तर वातावरणमा कम प्रभावशाली

- धेरेजसो सम्पर्क र केही दैहिक प्रकृतिका ।
- जनावरको बोसोमा संचय नहुने ।
- बहुआयामिक (Broad spectrum) गुण भएका ।
- एस्फेट, क्लोरोपाइरीफस, मालाथियन, डाइमेथोएट आदि ।

ग) कार्बामिट समूह (Carbamate Group of Pesticide)

- अर्गानोफस्फेट जस्तो बहुआयामिक हुन्छ ।
- अर्गानोक्लोरिन्स जस्तो लामो समयसम्म वातावरणमा प्रभावशाली रहदैन ।
- केही खाँदा लाग्ने, आन्तरिक र केही दैहिक प्रकृतिका हुन्छन् ।
- कार्वारिल, कार्वोप्यूरान, कार्वोसल्फान आदि । हाल नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

घ) सिन्थेटिक फाइरओआइड (Synthetic Pyrethroid Group of Pesticide)

- अरुको तुलनामा पछि प्रचलनमा आएको हो ।
- प्रभाव अवधिको दृष्टिले अर्गानो क्लोरीन्स र अर्गानोफस्फेटको बीचमा पर्दछन् ।
- मानिसहरुको लागि कम घातक र माटोमा धेरै समयसम्म अवशेष नरहने प्रकृतिका हुन्छन् ।
- यस समूहका विषादी प्रयोग गर्दा एउटै खालको विषादी एकै ठाउँमा पटक पटक प्रयोग गर्दा कीरामा विष प्रतिरोधात्मक गुण विकसित हुन्छ ।
- परमेश्विन, साइपरमेश्विन, फेन्मलरेट, डेल्टामेश्विन आदि ।

ड) नियोनिकोटिनोइड समूह (Neo-nicotinoids Groups of Pesticide)

- नयाँ समूहका विषादीहरु खास गेरेर निकोटिन सँग सम्बन्धीत
- दैहिक कार्य प्रकृति
- मौरीका लागि पनि एकदम घातक
- पानीमा सजिलै घुल्ने र माटोमा प्रयोग गरेपछी विरुवाले सजिलै लिन सक्ने
- कीराको स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने
- चुसेर खाने प्रवृत्तिका कीराका लागि प्रभावकारी
- जस्तै : इमिडाक्लोरोपिड, एसिटामिप्रिड, थायोमेथोक्सजाम

५. विषादीको सबिन्यास वा रूप (Formulation)को आधारमा वर्गिकरण

- दुधिलोसार (Emulsifiable Concentrate-EC)
- पानीमा मिसिने झोल(Soluble Concentrate-SL)
- पानीमा मिसिने पाउडर(Wettable Powder-WP)
- पानीमा घुलिने पाउडर (Soluble Powder-SP)
- धुलो (Dust-DP)
- पानीमा मिसिने मसिनो दाना(Flowables)
- दाना (Granules-G)
- चारा (Baits-B)
- धुवाँउने विषादी(Fumigant)
- अन्य
 - पानीमा घुलनसील दाना(Soluble Granules-SG)
 - Concentrate Granule/Encapsulated Granules
 - Concentrate Emulsion
 - WD/WDG: Water Dispersible Granules
 - AE-Aerosols
 - CS: Controlled Release Formulation
 - M:Microencapsulated Pesticides
 - WSB or WSP: Water Soluble Packaging

६. विश्व स्वास्थ संगठनले गरेको विषादीको वर्गीकरण

(क) जीवनाशक विषादीको विषालुपनाको तुलनात्मक वर्गीकरण (WHO,2009)

विश्व स्वास्थ्य संगठन को वर्गीकरण	खतराको स्तर	खतराको स्तर एल.डी. ५०मुसामा (मिलिग्राम प्रति कि.ग्रा. शारीरिक तौल)	
		मौखिक एल.डी.— ५०	छालामा एल.डी.— ५०
Ia	अत्यन्त खतरनाक (Extremely Hazardous)	५ मि.ग्रा. भन्दा कम	५० मि.ग्रा. भन्दा कम
Ib	खतरनाक (Highly Hazardous)	५-५० मि.ग्रा. सम्म	५०-२०० मि.ग्रा. सम्म
II	मध्यम रूपले खतरनाक (Moderately Hazardous)	५०-२००० मि.ग्रा. सम्म	२००-२००० मि.ग्रा. सम्म
III	सामान्य रूपले खतरनाक (Slightly Hazardous)	२००० मि.ग्रा. भन्दा माथि	सामान्य रूपले खतरनाक
U	अपेक्षाकृत सुरक्षित (Unlikely to present acute hazard)	५००० मिलिग्राम वा सो भन्दा माथि	अपेक्षाकृत सुरक्षित

LD 50 (एल.डी. ५० को परिभाषा — विषादीको त्यो मात्रा जसले परीक्षण गरिएको जनावरको ५०% संख्यालाई मार्ने क्षमता राखदछ) ।

• केही प्रचलित रासायनिक कीटनाशक विषादीका नामहरू:

एसिफेट, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोपाइरफस, इमामेक्टीनवेन्जोएर, फेनभेलारेट, इमिडाक्लोरप्रिड, मालाथियन, प्रोपोक्जर, साइपरमेथ्रिन, प्रोपोक्जर, डेल्टामेथ्रिन, डाइमेयुएट

• केही प्रचलित दुसीनाशक विषादीहरू

-क्याप्टान, कार्बोन्डाजिम, क्लोरोथालोनिल, कपरअर्क्सक्लोराइड, मेनकोजब, डाइमिथोमोर्फ, डिनोक्याप, हेक्जाकोनाजल, कासुगामाइसिन, मेनकोजब, मेटालाक्सिसल, मेटिराम, प्रोविकोनाजल, प्रोपिनेव, थिराम, टाइसाइक्लाजेल, भेतिडामाइसिन, जिनेव

• केही प्रचलित सुलसुलेनाशक विषादी (miticide/Acaricide)

फेनपाइरोक्विजमेट, प्रोपरजाइट

• मुसानाशक(Rodenticide)- ब्रोमाडियोलान, जिंक फस्फाइड

• शंकेकिरानाशक(Molluscide)- मेटलाडिहाइड

• ब्याक्टेरियानाशक(Bactericide)-स्ट्राप्टोमाइसिन सल्फेट+टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड

• झारपातनाशक (Herbicide/Weedicide)-२,४ D, एट्राजिन, प्युटाक्लोर, ग्लाइफोसेट, मेट्रिव्युजिन

पाराक्वाटडाइक्लोराइड, पेन्डिमिथालिन, प्रेटिलाक्लोर

९. विषादीको सबिन्यास वा रूप (Formulation)

लक्षित उपयोगका लागि विक्री हुने सबै जीवनाशक विषादी उत्पादनहरूमा सामान्यतया दुई प्रकारका भाग हुन्छन्, सक्रिय अंश र सहायक अंश ।

- सक्रिय अंश जो शत्रुजीव नियन्त्रण गर्ने काममा सक्रिय रहन्छ । धेरै जसो अवस्थामा यस सक्रिय अंशलाई सोभै उपयोग गर्न सम्भव र उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण विषको सक्रिय अंशलाई अन्य सहायक सामाग्रीमा निश्चित शुत्रअनुसार मिसाइन्छ र विषादी तयार पार्ने यही प्रक्रियालाई विषादीको शुत्रिकरण वा Formulation भनिन्छ ।
- विषादी Formulation process मा, सहायक अंशको अलबा पतल्याउने पदार्थहरू पनि मिसाइन्छ जसले गर्दा विष सामाग्री मापन गर्न र सञ्चालन गर्न बढि सुरक्षित र सजिलो हुन्छ । जसबाट विषादी पानीमा राम्ररी घुलनशिल होस, बोट बिरुवामा राम्ररी फैलिन सकोस र अन्यत्र निष्कासित नहोस । विष पदार्थलाई तरल भोल, पाउडर, धलो, गेडा, चारा वा अन्य धेरै रूपमा बनाउन सकिन्छ । मानिस, घर पालुवा जनावर, अन्य लाभदायक जीव, र वातावरणलाई पुनर्सक्ते खतरा, उपचार गरिने बोट बिरुवाको सुरक्षण, लागत तथा प्रभावकारीताको दृष्टिकोणले विषादीका सबिन्यासहरू फरक फरक हुन्छन् ।

विषादीका सविन्यास र शत्रिकरणहरू

क्र.सं	सविन्यासर शुत्रिकरणहरू	गुण	अवगुण
१	दुधिलो सार (इ.सी०) (Emulsifiable Concentrate) तरल विष पदार्थको सविन्यास बनाउँदा पानीमा धुलनशिल तेल, मट्टीतेल, पाराफीन (मैनबर्ती इत्यादि बनाउने बोसो जस्तो पदार्थ) मा सार तत्व धोली र विशेष प्रकारको तेल पानीको धोल पनि मिसाईएको हुन्छ जसबाट सविन्यास सजिलैसँग पानीमा धुल जानेछ। दुधिलो सारलाई पानीमा मिसाएपर्छि सामान्यतया दुधिलो सेतो रंग हुन आउँदछ। Cypermethrin 10 % EC, Chlorpyrifos 20 % EC	दुधिलो सार अन्य प्रकारको तुलनामा संचालन, परिवहन, सचय र खेतमा प्रयोग गर्न निकै सजिलो हुन्छ। यस सविन्यासलाई स्प्रे ट्यांकीमा पानीसँग मिसाउन धेरै हल्लाउनु पर्दैन, उपकरणलाई खियाउदैन र स्प्रे नोजल तथा फिल्टर टालिदैन।	यो सविन्यास आगोमा तत्काल ज्यादै बल्न सक्ने प्रकृतिको भएको तुलनामा संचालन, परिवहन, कारणबाट शितल ठाउँमा भण्डरण सविन्यास महंगो पर्दछ। पाउडर वा धुलोको तुलनामा यो सविन्यास महंगो पर्दछ। दुधिलो सार विष पदार्थको ठूलो अवगुण मानव र जनावरको छ। लालाबाट सजिलै सोसिने अवगुणले गर्दा प्रयोगकर्ताको निम्ति अलि खतरापूर्ण हुन जान्छ।
२	पानीमा मिसाउने पाउडर (डब्लु.पि.) Wettable Powder (WP) पानीमा मिसिने पाउडरलाई अति मसिनो धुलोमा विशेष पदार्थ थपेर स्प्रे ट्यांकको पानीमा तैरने बनाईएको हुन्छ। Mancobeb 75% WP, Copper Oxychloride 50% WP, Carbendazim 50% WP	(अन्य सयोजन भन्दा यो सस्तो हुने र भण्डार तथा दुवारी गर्न सजिलो (दुधिलो सार भन्दा कम गर्ने र खस्नोपनाको कारण नोजल र पम्पलाई खियाउन सक्ने चलाई (धुलोलाई मिसाउँदा वा स्ट्रिंगमा हाल्दा स्वास खतरापूर्ण हुन सक्ने लिंदा	(यसलाई बेला बेलामा रहनु पर्ने नव ट्यांकीको पिंधमा जम्मा हुने (स्प्रे नोजल तथा फिल्टरलाई बन्द मात्रामा छालामा सोसिन जाने हावा, पानीबाट सजिलैसँग अन्यत्र उडेर वा बोगेर जान सक्ने भएकोले गैर लक्षित क्षेत्रलाई दुषित पार्न सक्दछ। यस प्रकारको सविन्यासले प्रयोगकर्ता, वातावरण र मौरीलाई बढी असर पुऱ्याउँदछ।
३	धुलो (डि.पी.) Dust Powder (DP) साधारणतया धुलो सविन्यास (वा धुलो पाउडर) प्रयोग गर्न सकिने (तयारी) रूपमा बिक्री गरिन्छ। यस सविन्यासमा कम मात्रामा सार तत्वलाई अभ्रक, माटो र अन्य तनुकारक (diluents) सँग मिसाईएको हुन्छ। Chlorpyrifos 1.5 % DP, Malathion 5% DP	यो सविन्यास सुख्खा धुलो विष पदार्थ भएकोले प्रयोगको लागि पुनः मिसावट गर्नु आवश्यक पर्दैन, संचालन गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ,	हावा, पानीबाट सजिलैसँग अन्यत्र उडेर वा बोगेर जान सक्ने भएकोले गैर लक्षित क्षेत्रलाई दुषित पार्न सक्दछ। यस प्रकारको सविन्यासले प्रयोगकर्ता, वातावरण र मौरीलाई बढी असर पुऱ्याउँदछ।
४	Soluble Powders (SP) पानीमा धुलिने पाउडर साधारणतया यो सविन्यास पानीमा मिसाउने पाउडर (डब्लु.पि.) जस्तै हो तर यसले नोजल र पम्पलाई खियाउदैन। Cartap hydrochloride 50 % SP		
५	Soluble concentrate (SL) पानीमा मिसिने झोल साधारणतया यो सविन्यास दुधिलो सार (इ.सी०) (Emulsifiable Concentrate) जस्तै हो तर सार तत्वलाई अन्य तनुकारक (diluents) सँग मिसाईएको हुदैन। Imidacloprid 17.8 % SL		
६	Flowables (F) पानीमा मिसिने मसिनो दाना साधारणतया यो सविन्यास पानीमा मिसाउने पाउडर (डब्लु.पि.) जस्तै हो फरक यो छ की यो सविन्यास मसिनो दानाको रूपमा रहेको हुन्छ।		
७	Baits (B) चारा सार तत्वलाई खाने कुरामा मिसाइ चाराको रूपमा दिइन्छ। यिनीहरू धेरैजसो ठोस रूपमा ब्लक, चारा वा चक्कीमा पाइन्छ। भिँगा, साडला, चरा, मुसा, शंखे कीरा मार्न प्रयोग गरिन्छ।	प्रयोगको लागि अन्य साम्रगी जस्तै स्प्रेएर ट्यांकी आवश्यक पर्दैन	कहिले काही लक्षित नगरिएको जीवले पनि खान सक्छ। यो सविन्यास महंगो पर्दछ।

क्र.सं	सविन्यासर शत्रिकरणहरू	गुण	अवरण
८	Granules (G) & Pellets (P) दानादार र चक्रिक Eg: Carbofuran granules	प्रयोगको लागि अन्य सामग्री जस्तै स्प्रेएर ट्यांकी आवश्यक पद्देन माटोमा हुने कीरा र जका व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने	कहिले काही लक्षित नगरिएको जीवले पनि खान सक्छ ।
९	धृवाउने विषादी (Fumigants) – Aluminum Phosphide	भण्डारणमा लाग्ने कीराहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयोग हुने	सावधानी अपनाएर प्रयोग नगरिएमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुन सक्ने

अन्य

SG : Soluble Granule (पानीमा घुलनसील दाना) CG : Encapsulated Granule

EW : Concentrate Emulsion

WD/WDG : Water Dispersible Granule

AE : Aerosol

CS : Controlled Release formulations M: Microencapsulated Pesticides

WSB or WSP: Water-Soluble Packaging

१०. जीवनाशक विषादीको सूचक पत्र (Label)

जीवनाशक विषादीलाई कसरी सुरक्षित र प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विषादी निर्माताहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई आवश्यक जानकारी दिने सबभन्दा महत्वपूर्ण साधन विषादीका लेबलहरू नै हुन् । त्यसैले विषादी लेबलमा दिएको निर्देशन अनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ र सो मा दिईएका सूचनालाई विषेषज्ञले राम्ररी जाँच गरेको हुनु जरुरी छ ताकी विषादीले मानव स्वास्थ्य, पशुपन्थी र वातावरणलाई नोक्सान नगरिकन लक्षित शबुजीव प्रति प्रभावकारी होस । जीवनाशक विषादीका शिशीहरू सानो भएको अवस्थामा निर्माताहरूले अतिरिक्त कागज/पर्चा (Leaflets) राखी त्यस्ता जानाकारीहरू विस्तृत रूपमा दिन्छन् र दिनुपर्दछ । आवश्यक परे विभिन्न भाषाहरूमा पनि दिने गरिन्छ । विषादी प्रयोग गन्तपूर्व त्यस्ता सूचनामुलक पर्चा पढ्नु जरुरी हुन्छ । विषादी बिक्रेताले अनिवार्य विषादीको लेबलका सूचनाहरूको जानकारी राखि विषादी किन्ने किसानलाई लेबलमा भएका सूचनाहरूको जानकारी दिनु पर्दछ ।

विषादीका लेबलमा उपलब्ध हुने सूचनाहरू

क. खतारको संकेत वा शब्दहरू

रातो रंग भएको - धेरै विषालु

पहेलो रंग - विषालु

नीलो रंग - मध्यम विषालु

हरियो रंग - सामान्य विषालु

संकेत रहित

ख. पहिचान सम्बन्धी भाग

व्यापारिक नाम

सामान्य नाम

विषादीमा सकिय तत्वको प्रतिशत

सविन्यासको किसिम

निर्माणकर्ताको नाम ठेगाना

ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपयोगिता समाप्त हुने मिति

ग. प्रयोग सम्बन्धी निर्देशनको भाग (के, कहां, कहिले, कसरी)

घ. सुरक्षाको सावधानी सम्बन्धी भाग

ड. वातावरण सम्बन्धी सावधानीहरू

च. विषादी भन्डारण र नष्ट गर्ने सम्बन्धी निर्देशनको भाग



११. विषादी कसरी मानिसको शरिरभित्र प्रवेश गर्दछ

विषादीसँग हुन सक्ने शारीरिक सम्पर्क कम गराउन विषादीको उत्पादन, पैठारी, खुद्रा विक्री, परिवहन, मिसावट र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न सबै व्यक्तिले विषादी के कस्तो प्रकारसँग शरिरभित्र प्रवेश गर्न सक्छ, र यसरी प्रवेश गरेको अवस्थामा कतिसम्म विष लाग्न सक्छ त्यसबाटे राम्रो जानकारी राख्नुपर्दछ ।


विषादी र अन्य रसायनहरू शरिरभित्र यस प्रकार प्रवेश गर्दछ :

- छालाबाट (छाला सम्बन्धी)
- फोक्सोबाट (श्वास कियाबाट)
- मुखबाट (खाना सेवनबाट)
- आँखबाट

११.१ छालाबाट सोसिने (स्पर्श वा सम्पर्क)

धैरेजसो कषकहरू र प्रयोगकर्ताहरूका छालाबाट विष प्रदुषण हुन्छ । विष मिलाउँदा पोखिई वा छर्किएर लाग्न गई प्रदुषण हुन सक्छ । छर्किएको विषको भोल वा धुलो हावाको वहावाबाट पनि सोसिन सक्छ ।

छालाबाट विषादी सोसिन जानुको ऐटा सामान्य कारणमा प्रदुषित पहिरनलाई तत्काल नहटाई लामो समयसम्म लगाईरहँदा पनि उत्पन्न भएको पाइन्छ (चुहिएको स्प्रेयसले छर्कदा, हावाको दवावाबाट वा पोखिएर) घाउ लाग्नु, खसिनु र छालामा दाद जस्तो दाग हुनु जस्ता अवस्थाहरूमा छालाले सजिलोसँग विष सोस्ने गर्दछ । घाँटी, मुख र टाउको विष सोस्न बढी संवेदनशील हुने गरेको अध्ययनबाट देखिन आएको छ । विभिन्न प्रकारका विषादी सविन्यासहरूमा छालाबाट विष सोस्ने बेरला बेरलै क्षमता हुन्छ । साधारणतया दुधिलो सार (इ.सी.) सविन्यास पानीमा मिसिन सकिने पाउडर (डब्ल्यु.पि.), धुलो र दानेदार (गोडा) भन्दा बढी मात्रामा छालाबाट सोसिन सकिने प्रकृतिको हुन्छ ।



११.२ श्वास प्रश्वास कियाबाट प्रवेश हुन आउने

श्वासप्रस्वास कियाबाट विषादी प्रवेश हुन आएमा त्यसले रक्तलाई प्रभावित पारी विष लाग्न सक्ने हुन्छ । खासगरी मिसिनो पाउडर, धुलो र धुँवाउने विषादीबाट उपरोक्त अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

पानीमा मिसिने धुलोबाट मिसावट गर्दा, धुलो छर्दा र घर भित्र कीटनाशक विषादी छर्कदा, स्प्रेयरवाट विषादी छर्कदा साना ड्रपलेट श्वास क्रियाबाट विषादी प्रवेश हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । विषादी मानव शरिरमा प्रवेश गरेपछि त्यसबाट नाक, घाँटी र फोक्सोलाई नराम्रो असर पुग्न जान्छ ।

११.३ खाने प्रक्रियाबाट विष सेवन हुन जाने

खाच सामाग्रीको माध्यमद्वारा विषको सेवन हुन जान्छ र यसका साथै पेय पदार्थहरूबाट पनि विष प्रदुषण हुन जाने अवस्थाहरू तीन किसिमबाट हुन सक्छन् :

क) लेबुल नभएका वीयर, कोक जस्ता शिशीहरूमा विष राखिने गरिएमा र त्यस भाँडोबाट भुक्तिएर पेय पदार्थ समिक्ष वा अन्य खानेकुरा समिक्ष पिएमा वा खानासँग खाएमा प्रदुषण हुन पुग्छ ।

- ख) विषादी मिसाउंदा वा छर्दा संलग्न व्यक्तिको मुख, हातमा भोल वा धुलो छार्किन गएमा र त्यस प्रकारसँग संसर्गमा आएको अंगलाई खान पिन र धुमपान गर्नु अगाडि राम्ररी सफासँग नधोईएमा प्रदुषण हुन जान्छ ।
- ग) स्पैयरका नोजलहरू जाम भएको अवस्थामा मुखले फुकेर वा चुसेर सफा गर्न खोजिएमा पिन मुखको बाटो भई विष सेवन हुन जान्छ ।
- घ) पर्खर्नु पर्ने समय अवधि पालना नगरिकन विषादी छरेको बाली टिपेर उपभोग गर्दा वा विषादीको अवशेषयुक्त उत्पादन -अन्न, फलफूल, तरकारी सेवन गर्दा ।

११.४ आँखाको संसर्गबाट प्रदुषण

आँखा बढी कोमल अंग भएको कारणबाट यसको धेरै रसायनबाट प्रभावित हुने प्रकृति हुन्छ र विषलाई छिटै सोस्न सक्दछ । विषको भोल मिसावट गरी तयार गरिदा छिटा पर्ने गएमा, विषको भोल वा धुलो छर्दा हावाको वहावबाट र प्रदुषित हात वा पहिरनले आँखा पुछिएमा (मिच्चा) त्यसको संसर्गबाट प्रदुषण हुन सक्छ ।

१२. विषालुपना

जीवनाशक विषादीको विषालुपन भनेको उचित सावधानी नपुऱ्याई विषादीलाई संचालन/प्रयोग गरिएको अवस्थामा यो कति खतरापूर्ण हुन सक्छ, त्यसको मापन हो । “विषालुपनले शारिरीक वा जैविक गुण जनाउँछ, जसबाट यान्त्रिक कारणबाट नभई रसायनको प्रभावको कारणबाट जीवित प्राणीलाई कतिसम्म नोक्सान वा पिडा पुऱ्याईएको हुन्छ, त्यो निर्धारण गरिन्छ ।

विषालुपना : कुनै विषादीमा विद्यमान एक शारिरीक वा जैविक गुण, जस्ते कुनै पिन प्राणीमा नोक्सान वा विकार उत्पन्न गर्ने क्षमता निर्धारण गर्दछ ।

घातक : कुनै विषादीमा विद्यमान नकारात्मक असर जो कुनै पिन अवस्थामा प्रयोग गर्दा देख्न वा अनुभव गर्न सकिन्छ । विषादीको विषालुपना दुई किसिमको हुन्छ ।

तिब्र विषालुपना (Acute Toxicity) दर्दी विषालुपना (Chronic Toxicity)

कीटनाशक विषादीको विषालुपनलाई मुसा, खरायो, कुकुर र बाँदर जस्ता जनावरहरू माथि परीक्षण गरी मापन गरिन्छ । विषालुपनको परीक्षणबाट तिब्र विषालुपन (एउटा मात्र खुराकको असर) वा दीर्घ विषालुपन (धेरै स-साना खुराकहरूको असर) लाई मापन गरिन्छ ।

१२.१ विषादीको तिब्र विषालुपना (Acute Toxicity)

विषादीको ठुलो एकल मात्रा कुनै पिन माध्यमबाट शरिर भित्र प्रवेश हुनु वा पटक पटक सानो सानो मात्रा छोटो समयको अन्तरमा शरिर प्रवेश भई विषादीको घातकता देखिन्छ, वा अनुभव गरिन्छ भने त्यसलाई तिब्र विषालुपना भनिन्छ । जस्तै विषादी मिसाउंदा वा छर्दा कुनै दुर्घटना पर्नु । र परीक्षण गरिने जनावरहरूलाई विषको बेग्ला बेग्लै मात्रा सेवन गराई तिब्र विषालुपन रहेको नरहेको माप गरिन्छ, जस्तै:

मुख सम्बन्धी विषालुपन माप गर्न भोजनमा

छाला सम्बन्धी विषालुपन माप गर्न छालामा

श्वास सम्बन्धी विषालुपन माप गर्न हावामा

Acute toxicity of a pesticide refers to the effects from a single exposure or repeated exposure over a short time, such as an accident during mixing or applying pesticides.

विषादीका एल.डी. ५० (मारक मात्रा -५०)

विभिन्न परीक्षणहरूका नतिजालाई एल.डी.-५० (मारकमात्रा -५०) को अनुपातको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । परीक्षण गरिने जनावर हरूको आधा संख्या (सामान्यतया मुसाहरू) लाई मार्न जित मात्रामा वास्तविक विष प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई एल.डी.-५० भनिन्छ ।

परीक्षण गरिने जनावरहरूको तौल र वास्तविक विष प्रति के.जी. यति मिलिग्राम भनी रेकर्ड गरिएको हुन्छ ।

एल.डी.-५० को मात्रा जित कम रहन्छ, त्यति नै त्यो विषादी खतरापूर्ण हुन्छ ।

उदाहरण :

विषादी	मारक मात्रा - ५०
डाईक्लोरोभस	५६ मि.ग्रा./के.जी.शारीरिक तौल
साइपरमेथिन	४००० मि.ग्रा./के.जी. शारीरिक तौल

कुन बढ़ि विषालु ?

मारक मात्रा - ५० = ५६ मि.ग्रा./के.जी. अब ५० के.जी. तौल भएको जनावरको निम्नि 56×50 के. जी. २८०० मि.ग्रा. (एक चौथाइ चिया चम्चा) ले सो जनावर मर्ने ५०% सम्भावना रह्यो ।

मुसाको लागि खाएर लाग्ने डाईक्लोरोभसमा एल.डी. ५० को मात्रा ५६ मि.ग्रा. प्रति के.जी. हुन्छ । मानवीय सन्दर्भमा कुरा गर्दा ५० के.जी. तौल भएको कुनै व्यक्तिले शुद्ध डाईक्लोरोभस 56×50 मिलीग्राम (२८०० मिली ग्राम) सेवन गर्ने हो भने उस्को मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना ५० प्रतिशत हुन आउछ ।

अर्कोतिर साइपरमेथिन विषादीको एल.डी.-५०, ४००० मिली ग्राम प्रति के.जी. रहन्छ । मानवीय सन्दर्भमा भन्ने हो भने शुद्ध साइपरमेथिनको करिव २०० ग्राम वा २००००० मिली ग्राम कुनै व्यक्तिले सेवन गरेमा उसको मृत्युको सम्भावना ५० प्रतिशत हुन आउछ ।

यी घातक खुराक एल.डी.-५० को मात्राबाट कीटनाशक विषादीमा निहित विषालुपन माप सम्बन्धी जानकारी पाउन सकिन्छ, तर वास्तविक प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट संचालन गरिने, संचय गरिने र खेतमा प्रयोग गरिने सविन्यासित विषादीको विषालुपन कति रहेको हुन्छ सो थाहा पाउनु बढी जरुरी हुन आउछ ।

सविन्यासित विषादीको विषालुपन मुख्यतः दुई कुराहरूमा निर्भर गर्दछ :

सविन्यासको शक्ति : ५० प्रतिशत सक्रिय तत्व भएको सविन्यास २० प्रतिशत मात्र सक्रिय तत्व भएको सविन्यास भन्दा बढी विषालु हुन्छ ।

सविन्यासको किसिम : साधारणतया: पाउडर र धुलो जसलाई त्यति सजिलोसँग सेवन गर्न वा त्वचाबाट सोसिन सकिदैन त्यसको तुलनामा झोलदार सविन्यास (उदाहरणको लागि दुधिलो सार) बढी खतरनाक हुन्छ ।

विषादीको सविन्यासको एल.डी. ५० (मारक मात्रा ५०) पत्ता लगाउने तरिका :

सविन्यासको मारक मात्रा-५० = सक्रिय तत्वको मारक मात्रा-५० सविन्यासमा भएको सक्रिय तत्वको प्रतिशत $\times 100$

उदाहरण :

$$\frac{५६ \times १००}{७६} = \text{मि.ग्रा./के.जी.}$$

= ७३.७६ मि.ग्रा./के.जी.

त्यसैगरी अन्य विषादीहरूको सविन्यासको पनि मारकमात्रा - ५० पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसै कारणले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जीवनाशक विषादीलाई सविन्यासित विषादीबाट हुन सक्ने घातक प्रभावको आधारमा विभिन्न प्रकारको खतराको बेगला बेग्नै समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । नेपालमा प्रयोग गरिने बढी प्रचलित विषादी सविन्यासहरूलाई घातक प्रभावको आधारमा वर्गीकरण गरी समावेश गरिएको छ । सविन्यासको वर्गीकरण भने सक्रिय मिश्रित तत्वको सार (Concentration) र सविन्यासको प्रकारको आधारमा गणना गरिएको छ ।

१२.२ विषादीको दीर्घ विषालुपन (Chronic Toxicity)

त्यस्तै लामो समयसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विषादीको स-साना मात्रा सेवन हुन आएमा वा विषादीको अवशेषयुक्त उत्पादन (अन्न, फलफूल, तरकारी आदि) सेवन गर्दा त्यसबाट देखिने वा अनुभव गरिने नकारात्मक असर को माप हो । यस्ता प्रभाव साधारणतया कैयैन महिनादेखि १ वर्षसम्म वा त्यसभन्दा पनि बढी समयसम्म रहन सक्छ ।

Chronic toxicity refers to the effects of long-term or repeated lower level exposures to a toxic substance. The effects of chronic exposure do not appear immediately after first exposure and may take years to produce signs and symptoms.

दीर्घ विषालुपनको प्रभावहरू :

1. **Carcinogenicity** : ability to produce cancer or to assist carcinogenic chemicals.
2. **Mutagenicity** : ability to cause genetic changes.
3. **Teratogenicity** : ability to cause birth defects.

4. Oncogenicity : ability to induce tumor growth (not necessarily cancers)
5. Liver damage : death of liver cells, jaundice (yellowing of the skin), fibrosis and cirrhosis.
6. Reproductive disorders : such as reduced sperm count, sterility, and miscarriage.
7. Nerve damage : including accumulative effects on cholinesterase depression associated with organophosphate insecticides.
8. Allergenic sensitization : development of allergies to pesticides or chemicals used in formulation of pesticides.

The effects of chronic toxicity, as with acute toxicity, are dose-related. In other words, low-level exposure to chemicals that have potential to cause long-term effects may not cause immediate injury, but repeated exposures through careless handling or misuse can greatly increase the risk of chronic adverse effects.

दीर्घ विषालुपनाको असरहरू निम्नलिखित रूपबाट उत्पन्न हुन सक्छ ।

- विषादी भोल वा धुलो छारिएको र यससी छारिएको विषादीको प्रभाव नसिद्धिएको वा नपखालिएको फलफूल वा तरकारी खाने गरेमा ।
- रामो हावा निकासको व्यवस्था नभएको विषादी बिक्री कक्षमा लामो अवधिसम्म बसी काम गर्दा श्वास कियाबाट विषादी शरिरभित्र प्रवेश भई प्रदूषित भएमा ।
- विषादी छर्ने सिजनमा छर्ने विषादी भोल वा धुलोको सम्पर्कमा बराबर आउनाले र त्यसै गरी भोल वा धुलो विषादी छर्कदा प्रदूषित भएको पहिरन नथोई लगाई रहेमा ।
- परीक्षण गरिने जनावरहरूलाई तिनीहरूको खानामा विषादीको सानो मात्रा मिसावट गरी सेवन गराई त्यसबाट ती जनावर र त्यसका बच्चाहरूमा पर्न आउने दीर्घकालिन असर माप गरी दीर्घ विषालुपना सम्बन्धी परीक्षण गरिन्छ ।

यस प्रकारसँग विषादीको प्रभाव माप गर्दा बच्चाहरूमा हुने जन्म सम्बन्धी दोष, क्यान्सर/ट्यूमर रहेको नरहेको, प्रजननमा असर, रक्त र स्नायुमा असर आदी परीक्षण गरिएको जनावरहरको स्वास्थ्यमा देखिएको छ, छैन ती सबै समाविष्ट हुन्छन् ।

यस प्रकार, मानिसहरू बोरोबर तर कम मात्राको विषादीको सम्पर्कमा आएमा कसरी कुन प्रकारबाट प्रभावित हुन पुढो रहेछ त्यसबारे वैज्ञानिकहरूले रामोसँग अध्ययन गरेका हुन्छन् र स्वीकार्य दैनिक विषादी मात्रा (Acceptable Daily Intake) निर्धारण गरिएको हुन्छ । कुनै वयस्क व्यक्तिलाई नोक्सानी नहुने गरी दैनिक खुवाउन सकिने विषादीको मात्रालाई दैनिक स्वीकार्य तह विषादी मात्रा (ADI) भनिन्छ वा एक प्रौढको दैनिक सम्पर्कमा रहने विषादिको त्यो हद जस्ते उसको जीवनमा कुनै नाफा नोक्सानी देखाउदैन ।

यस दैनिक सेवन गर्न सकिने स्वीकार योग्य परिमाणलाई उपयोग गरी प्रत्येक बालीमा विषादीको अधिकतम अवशेष सीमा (Maximum Residual Limit) करि रहनुपर्ने हो सो निर्धारण गर्न सकिन्छ । विषादीको यहि अधिकतम मात्रा नै बाली काट्ने समयमा उपयोगका लागि स्वीकृत गरिन्छ वा कुनै विषादीको अवशेषको हद जुन कुनै बाली उपयोगको लागि भित्राउन स्वीकार्य हुन्छ ।

विषादीको अवशेषलाई यस अधिकतम अवशेष सीमा (Maximum Residue Limit) भन्दा मुनी राख्नका लागि पर्खने अवधि वा प्रतिक्षा अवधि वा स्माद भुक्तान हुने अवधि (Withholding Periods/Waiting Period) कायम गरिन्छ, जसबाट बाली काट्न भन्दा पहिले करि समय सम्म उपचार गरीएको बालीलाई त्यसै छाडन पर्ने हो सो बताइन्छ ।

१३. विष लागेका लक्षणहरू र प्राथमिक उपचार

मानिसलाई विष लाग्ने खतरा विषादीको विषालुपनसँग मात्र सम्बन्धीत नभै कुन हदसम्म हामी विषादीको सिधा सम्पर्कमा रहन्त्यै त्यसमा भर पर्दछ । साथै विष लाग्ने खतरा विषादीको किसिम वा सविन्यास र विषादीको रासायनिक प्रकृतिमा पनि उत्तिकै निर्भर रहन्छ । जो व्यक्ति लगातार विषादको सम्पर्कमा रहन्छ, अर्थात विषादी उच्चोग, पसल वा भण्डारमा नियमित काम गर्ने व्यक्तिहरू मा विषादीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढि रहन्छ ।

- खतरा विषालु सामाग्रीमा रहेको विषलुपनामा मात्र निर्भर हुँदैन ।
- विषादी सँगको सम्पर्कको हद ।
- विषादीको किसिम अथवा सविन्यास ।
- विषादीको रासायनिक प्रकृति ।

तसर्थ विषादीको सम्पर्कमा आउने जो कोहिले पनि विष लागदाको अवस्थामा हुने लक्षणहरू र प्राथमिक उपचारका उपायहरूका

बारेमा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ भने विषादीसंग लगातार सिधा सम्पर्कमा रहने कृषक, विषादी पसल तथा उच्चोगमा काम गर्ने कर्मचारी/कामदारहरूले सो सम्बन्धमा विषेष जानकारी राख्नु अनिवार्य हुन्छ ।

१३.१ अर्गानोक्लोरिन कम्पाउण्डको कार्य प्रकृति (Mode of Action)

यस परिवार अन्तर्गतका विषादीहरूले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई नै सिधै असर गर्दछन् । यी विषादी बोसोमा जम्न सक्छन्त र धेरै लामो समय सम्म शरिरमा जमी रहन सक्छ । छाती/स्तनको बोसोमा जब यी विषादी जमेर टाँसिन्छन् तब यी धेरै लामो समय सम्म त्यही रही रहन्छन् । विषादीको अवशेष मापन विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । आमाको दूधवाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । यहि लामो समयसम्म वातावरणमा प्रभावशाली रहने र जनावरको बोशोमा संचय हुने जस्ता नकारात्मक गुणको कारण यो समूहका सबैजसो विषादीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रतिबन्धित भई सकेका छन् । यी विषादीहरूको असर करिब एक घण्टा पछि देखिन थाल्दछ र कडा असर ४८ घण्टासम्म रहीरहन्छ ।

इन्डोसल्फान जस्ता अर्गानोक्लोरिन विषादी छालाको माध्यमबाट पनि सोसिएर शरिरभित्र पस्दछन् ।

- यी विषादीहरू प्रायः जसो सम्पर्क र आन्तरिक प्रकृतिका हुन्छन् ।
- यो समूहका विषादीहरू सँगको लगातार सम्पर्क वा एकै पटकमा ठुलो मात्रासँगको सम्पर्कको कारण जनावरको बोसोमा जम्मा हुने सम्भावना रहन्छ ।
- यी विषादीहरूले साइटोकोम अक्सिडेज नामक एन्जायम (रगतमा हुने महत्वपूर्ण तत्व जसले रगतमा अक्सिजन पुऱ्याउने काम गर्दछ) बने किया रोकदछन् फलस्वरूप फोक्सोमा हावाको आवागमनलाई अबरोध पुऱ्याउँछन् र स्नायु प्रणालीलाई असन्तुलित बनाइ पुरै शरिरलाई निस्कृय बनाइदिन्छन् ।
- एक पटकको (एकल) ठुलो मात्रासँगको सम्पर्कले एकै पटकमा कलेजो र मृगौला खराब हुन सक्छ ।
- अटिडुन, डाइअलिडुन, डि.डि.टि., वि.एच.सि., क्लोरोडेन, लिन्डेन, इन्डोसल्फान आदी पर्दछन् र यी सबै हाल नेपालमा प्रतिबन्धित भइसकेका छन् ।

१३.२ अर्गानोफस्फेटस कम्पाउण्डको कार्य प्रकृति (Mode of Action)

यसले मस्तिष्क को मुख्य स्नायु प्रणालीमा असर पुऱ्याउनुका साथै मेरुदण्ड र मस्तिष्कको वाहिरी भागमा रहेको नसाहरूलाई पनि असर पार्दछ । अर्गानोफोस्फेट ग्रुपका विषादीहरू ऐसिटाइल कोलिनइस्ट्रेज (ACHE) नामक इन्जायमसँग attached हुन्छन् र उक्त इन्जायम लाई शरिरमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानबाट रोकिन्छ फलस्वरूप स्नायु प्रणालीले शरिरको माशोपेसीलाई आवश्यक पर्ने सूचना राम्ररी प्रवाह गर्न सक्दैन र विभिन्न विषाक्तताका लक्षण र चिन्हहरू देख्न र अनुभव गर्न सकिन्छ । साधारणातया स्वभाविक रूपमा शरिरका मांसपेसी, विभिन्न ग्रन्थीहरू आ-आफ्नो स्तरबाट आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन् तर जब ACHE नामक इन्जाइमको सँगै विद्युतीय प्रवाह रोकिन्छ तत् पश्चातः क्रमशः अन्य खराब असरहरू शुरु हुन थाल्दछ । अतः जब यस परिवार अन्तर्गतका विषादी छर्केने या प्रयोग गर्ने कृषकलाई विष लागेको खण्डमा ३० मिनेट पछि असर देख्ना पर्न शुरु हुन थाल्दछ र २४ घण्टा सम्म सो असर रहीरहन्छ ।

- धेरैजसो सम्पर्क र केही दैहिक प्रकृतिका
- बहुआयामीक (Broad Spectrum) गुण भएको
- प्रयोगकर्ताको लागि बढी धातक तर वातावरणमा कम प्रभावशाली
- जनावरको बोसोमा संचय नहुने
- डाइक्लोरोभस, क्लोरोपाइरीफस, मालाथीयन,
- थोरै मात्रा तर लगातार सम्पर्कबाट पनि असर हुनसक्ने
- भण्डारणमा विषादा एक्कासी धेरै पोखिदा वा स्प्रे टैकमा खन्याउंदा पोखिएमा पनि विष लाग्न सक्ने

१३.३ कार्बामेट कम्पाउण्डको कार्य प्रकृति (Mode of Action)

- कार्बामेट, अर्गानोफस्फेट जस्तो बहुआयामीक (Broad Spectrom) हुन्छ ।
- अर्गानोक्लोरिन्स जस्तो लामो समयसम्म प्रभावशाली रहदैन ।
- केही खाँदा लाग्ने र केही दैहिक (Stomach and Systemic) प्रकृतिका छन् ।
- कार्बारिल, कार्बोफ्यूरान, कार्बोसल्फान आदि ।

- यिनिहरूको कार्य प्रकृति पनि अर्गेनोफोस्फेटको जस्तै कोलिनस्टरेज नामक एन्जायमलाई शरिरको जैविक क्रियामा उपलब्ध हुन नदिनु हो
- अर्गेनोफोस्फेटको भन्दा छिटो असर हराउने हुन्छ

१३.४ सिन्थेटिक पाइरेश्रोआइड्स् कम्पाउण्डको कार्य प्रकृति (Mode of Action)

- अरुको तुलनामा पछि प्रचलनमा आएको हो ।
- प्रभाव अवधिको दृष्टिले अर्गानो क्लोरीन्स र अर्गानोफस्फेटको विचमा पर्दछन् ।
- मानिसहरूको लागि कम घातक र माटोमा धेरै समयसम्म अवशेष नरहने प्रकृतिका हुन्छन् ।
- परमेश्वीन, साइपरमेश्वीन, फैन्भलरेट, डेल्टामेश्विन आदि ।
- यस समूहका विषादी प्रयोग गर्दा एउटै खालको विषादी एकै ठाउँमा पटक पटक प्रयोग गर्दा कीरामा प्रतिरोधात्मक गुण विकसित हुन्छ ।
- फराकिलो दायरा (Broad Spectrum) भएकाले (एक भन्दा धेरै किराहरू मार्न सकिने र सम्पर्क तथा आन्तरिक प्रकृतिका) ।
- फराकिलो दायरा भएकाले प्राकृतिक शत्रुहरूलाई हानीकारक हुन्छन् ।
- यसको कार्यगत शैली अर्गानोक्लोरिनको जस्तै हुन्छ ।

१३.५ धातुजन्य फस्फाइड को कार्य प्रकृति (Mode of Action)

- हावामा फैलिएर हावामा रहेको चिस्यानको सम्पर्कमा आएपछि फस्फीन भन्ने ग्यास उत्पन्न गर्दछ ।
- Nerve poison हो र श्वासप्रश्वास प्रकृयामा सिधा असर गर्दछ ।
- प्रज्वलनशिल ग्यास हो जुन अत्यधिक विषालु हुन्छ ।
- एलमुनियम फस्फाइड र जींक फस्फाइड (मुसा नियन्त्रण गर्न) प्रचलित धातु जन्य फस्फाइडहरू हुन् र सिधै स्वास प्रस्वासमा बाधा पुर्याई नोक्सान गर्दछन् ।

१३.६ पाराक्वाट र डाईक्वाटको कार्य प्रकृति (Mode of Action)

यो भारपातनाशक विषादी अति कडा विषालु रसायन हो । विशेष गरी छालाको भित्री तहमा नाक, मुख र आँखामा यसले धेरै खराब असर गर्दछ । आँखा पोल्ने, छाला चिलाउनुका साथै स्वास प्रस्वास प्रणालीमा असर गर्दछ । पाराक्वाट र डाईक्वाट नामक भारपातनाशक विषादी जब रगतमा पुगदछ यो सिधै फोक्सोमा जान्छ तसर्थ खाएमा वा पिएमा यो ज्यादै घातक हुन्छ । यो विषादी खाएमा या पिएमा निम्नलिखित लक्षणहरू देखिन्छन् । छाला चिलाउने, स्वास प्रस्वास नलिको माथिल्लो भागमा असर गरी रक्त संचार प्रणालीमा छिर्छ छालामा भएका स-साना व्यालवाट पसर या खाँदा, मृगौला र फोक्सो काम नलाग्ने बनाई दिन्छ ।

विषादीबाट मानव स्वास्थ्यमा असर :

अत्यकालिन (तत्कालमा देखिने असर)

१. रिगटा लाग्नु
२. पक्षपात आक्रमण/मुर्छा पर्नु
३. थाकेको महसुस हुनु
४. होस हराउनु
५. टाउको दुख्नु
६. वान्ता हुनु
७. स्वाँ स्वाँ हुनु
८. खोकी लाग्नु
९. छाती दुख्नु / गहौ हुनु
१०. माशपेशी थाक्नु/कम्पन हुनु
११. वाक वाकी लाग्नु

१२. पेट बटारिनु
१३. दिशा पखाला लाग्नु
१४. छाला लाटो हनु
१५. छाला फुट्नु/चिलाउनु/फोका आउनु
१६. छाला रातो हनु/सेतो हनु
१७. लडखडाएर हिड्नु
१८. अनिन्द्रा

१९. आँखी भाँ फरफराउनु
२०. आँखा रातो हनु, पोल्नु, आँशु वहनु, धमिलो देख्नु
२१. नाक पोल्नु, पातलो सिगान वर्गिरहनु
२२. बढी च्याल चुहिनु

दीर्घकालिन (पछि देखिने असर) :


- क्यान्सर/ट्युमर
- स्वास प्रस्वास सम्बन्धी रोगहरू
- स्नायूजन्य र व्यावहारजन्य असरहरू शरीरीक विकासमा असर र जन्मजात अपाङ्गता (Birth Defects) प्रतिरोधी क्षमतामा असर
- व्यारालाइसिस (पक्षघात)
- बंशानुगत परिवर्तन (Mutation)
- कलेजो खराबी (Liver Damage)
- प्रजनन क्षमतामा कमि वा बाँझोपन/ नपुंशकता (Reproductive Disorder)
- मानविक असंतुलन (Nerve damage)
- एलर्जी

वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव :

१. ओजोन तहमा छिद्र
२. रलोवल Warming
३. जैविक विविधतामा ह्वास
४. माटो प्रदुषण (प्रयोग गरेको विषादी मध्ये ८०% विषादी माटोमा टुडिन्छ)
५. वायु प्रदुषण
६. जल प्रदुषण
७. खाद्यान्त, तरकारी, फलफुल, मासु तथा दुध पदार्थमा वृद्धि
८. शत्रुजीवमा विष पचाउने क्षमतामा वृद्धि
९. महत्व हिन शत्रुजीव महत्वपूर्ण शत्रुजीवमा रूपान्तरित हनु (Pest Resurgence)
१०. कृषि उत्पादनको उत्पादन लागत बढ्नु (Increase cost of Production)।
११. Bio-accumulation & Bio-magnification of persistent pesticides
१२. कीराहरूको पुनरुत्थान हनु (Pest out break)
१३. अलक्षित जीवहरू (शिकारी कीरा, परजीवी कीरा, लाभदायक सूक्ष्म जीवहरूलाई) तथा मानव एवं घरपालुवा जनावरको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव ।
१४. स्वास्थ्योपचार लागत बढ्नु
१५. समयको बर्बादी

विषादीबाट बच्ने उपायहरू:

१. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र नियमावली, २०५० (पहिलो संशोधन २०६४ समेत) ले व्यवस्था गरे



- अनुसार मात्र विषादीको आयात, उत्पादन, किनबेच र प्रयोग गरौं ।
२. प्रतिबन्धित विषादीको बारे जानकारी लिएँ ।
 ३. बाली नालीमा विषादीको प्रयोग गर्दा अनिवार्य कृषि प्राविधिकहरूको सल्लाह लिने गरौं ।
 ४. धेरै खतरनाक (IB) अन्तर्गत पर्ने पंजिकृत/सूचीकृत विषादी सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र बाली संरक्षण अधिकृतको सिफारिशमा मात्र खरिद/बिक्री गरौं ।
 ५. रोग/कीरा व्यवस्थापनमा सम्भव भए सम्म एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइ.पि.एम) लगायत अन्य वैकल्पिक बाली संरक्षण विधिहरूको प्रयोग गरौं ।
 ६. विषादीको प्रयोग गर्ने परेमा कम विषालु तर प्रभावकारी विषादीको मात्र प्रयोग गरौं र विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित पहिरनहरूको अनिवार्य प्रयोग गरौं ।
 ७. विषादीको प्रयोग गर्दा प्रयोग कर्ताको सानो गल्तिले ठुलो दुर्घटना र हानी नोक्सानी हुन सक्ने भएकोले विषादीको लेबल (सूचक पत्र) मा लेखिएका निर्देशनहरू राम्ररी पढौं र पालना गरौं ।
 ८. चार “क” लाई सदा याद राख्यौं ।
विषादी “कुन” प्रयोग गर्ने
विषादीलाई “कहाँ” उपयोग गर्ने
विषादीलाई “कसरी” उपयोग गर्ने
विषादीलाई “कहिले” उपयोग गर्ने
 ९. अनावश्यक रूपमा विषादी प्रयोग नगरौं ।
 १०. सम्भावित खतरावाट सावधान होउ ।
 ११. विषादी प्रयोग गर्ने वित्तिकै बालीनाली (तरकारी तथा फलफूल) को बेच विखन तथा उपभोग नगरौं ।
 १२. इथियन र क्वीनालफोस विषादी चिया बालीमा प्रयोग नगरौं ।
 १३. विषादीको दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफन्तहरूको विनास ननिम्त्याओौं । सिफारिश गरिएको विषादी, सिफारिश मात्रामा, अति आवश्यक परेको बेलामा मात्र सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने सद्देश फैलाओौं ।
 १४. विषादीको विषालुपन र स्वभाव थाहा पाउन जनचेतना जागरण अभियान कार्यक्रममा सहभागि बनौं ।
 १५. “उपचार भन्दा रोकथाम राम्रो”उद्गारलाई आत्मसात गरौं ।
 १६. पर्खनुपर्ने समय र अवशेषको सहन सीमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको श्रेणी विभाजन, विषालुपना र विषादीको लेबलमा सावधानीका लागि रहने रङ्ग (रातो, पहेलो, निलो, हरियो) आदिको जानकारी राख्यौं ।
 १७. प्रतिबन्धित र पंजिकरण नगरिएका विषादीको जानकारी राख्ने र जनचेतना जागरण अभियानमा सहभागी बनौं ।
 १८. विषादी छर्कदा अत्यावश्यक सुरक्षा पहिरन तथा सावधानी व्यवस्थाको पालना गर्ने ।
 १९. विषादीलाई केटाकेटिको पहुँच भन्दा टाढा राख्यौं ।
 २०. कम विषालु तर प्रभावकारी विषादीको छनौट गर्ने गरौं ।
 २१. वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ र नियमावली २०५० बारे पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्ने र आचार सहिताका विशेषताहरूको जानकारी राख्ने ।
 २२. सबै किसिमका विषादीहरू विष हुन, ती औषधि होइनन् भन्ने उद्गार कहिल्यै पनि विर्सनु हुँदैन ।

विष लागेका लक्षणहरू

प्रायजसों सबै विषादीको सेवनबाट सामान्यतया एउटै प्रकारका लक्षणहरू देखापर्दछन् जस्तै : मानसिक विकार, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, पसिना आउने, जाडो हुने, झाडा लाग्ने र वान्ता हुने आदि हुन्छ । अत्यधिक विष सेवन भएको खण्डमा मांशपेशीहरू थर्कनु, भिषण कम्पन र अचेतन हुने अवस्थाहरू समेत देखापर्दछन् र अन्तमा स्वास किया बन्द पनि हुन जान्छ । धातुजन्य फर्पोइड सेवन भएको खण्डमा छारीभित्र दुखेर आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्ने र हिङ्गन गाहो हुने, शरीरमा कम्पन हुने र अचेत हुने जस्ता बेलै लक्षणहरू देखा पर्दछन् । विषादी कुनै माध्यमबाट शरिरभित्र गएमा त्यसको प्राथामिक उपचाररोगीलाई डाक्टरकहाँ वा अस्पतालमा लिएर जाँदा विषादीको भाँडो र पर्चालाई संगै लग्नु पर्दछ । जसबाट डाक्टरलाई उपचार गर्न बढी जानकारी प्राप्त हुन सकोस् । त्यस पर्चाको लेबलमा विष लागेमा के कस्ता प्राथामिक उपचार गर्ने र के औषधि खुवाउने (Antitode) भनी लेखिएको हुन्छ ।

- जानजानी विष सेवन गरेको छ भने विषादीको भाँडो साथै तुरुन्त डाक्टरकहाँ लगि सम्पूर्ण विवरण बताउनु पर्छ तर दुर्घटना

भएको हो भने, सर्वप्रथम प्रदुषित लुगाहरू हटाउनु पर्छ र साबुन तथा चिसो पानीले शरिर राम्ररी धुनु पर्छ सकेसम्म छिटो अस्पताल पुऱ्याउने र सम्पूर्ण विवरणहरू भन्ने साथै सङ्गा गरिएको विषादीको समूह समेत भन्ने रोगिलाई निहुराएर राख्नुपर्छ ताकी बान्ता नरोकियोस् ।

- दूध वा तेल पदार्थ सेवन गर्न नदिने
- विरामीलाई हावाको राम्रो आवागमन भएको ठाउँमा राख्ने
- आवस्यकता परेमा कृत्रिम स्वास प्रस्वास दिने
- रोगीलाई सामान्य अवस्थामा नआएसम्म अलग राख्ने आराम गर्न दिने
- ओर्गानोफस्फेट र कार्बमेट यौगिकहरू जस्तै मेटासिड, मेटासिस्टक्स, तुभान आदिले कोलिनेष्टर रोकदछन्, जसले गर्दा स्नायु प्रणालीमा विकार उत्पन्न हुनजान्छ । टाउको दुखो, रिंगटा लाग्ने र वाकवाकी हुने र त्यसपश्चात जाडो भई पसिना आउने, भाडा लाग्ने र वान्ता हुने लक्षणहरू देखार्पद्धन् । मासपेशीहरू थर्कन्तु, भीषण कम्पन हुनु र अचेत नहुने अवस्थाहरू समेत हुन सक्छ ।

प्राथमिक उपचार:

- क) रोगीलाई आधा भुकेको रूपमा टाउको तल पर्ने गरी राख्नु पर्दछ ।
- ख) बान्ता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- ग) राम्ररी हावा आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
- घ) छिटो अस्पताल लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- ड) कार्बमेट विषादीकोलागि एट्रोपिन सल्फेटको २ मिली ग्राम इन्ट्रामेनस सुई दिनुपर्छ ।

Test Dosage of Atropine

Adults: 1 mg

Children under 12 years: 0.01 mg/kg dose मा दिने ।

- च) एट्रोपिन को विकल्पमा Glycopyrrolate ampole of 7.5 mg of glycopyrrolate were added to 200 mL of saline मा दिवा उस्तै नतिजा पाइएको छ ।
- छ) ओर्गानोफस्फेट विषादीको लागि Atropine sulfate in combination with 2-PAM (protopam chloride) दिने
- ज) रगत जमाउने खाले मुसाको विषकोलागि Vitamin K1 खुवाउने

१४. बाली बिरुद्वामा जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोग

जीवनाशक विषादी सम्बन्धी सुरक्षा एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । यसको समुचित रूपमा उपयोग नगरिएमा यसले उपयोगकर्ताहरूलाई मात्र होइन अरु मानिसहरू, घर पालुवा पशुधनहरू, वन्यजन्तुहरू र लाभकारी कीराहरूलाई समेत हानी पुऱ्याउन सक्छ र साथै वातावरणलाई पनि नोक्सान गर्दछ ।

१४.१ सामान्य सिद्धान्तहरू

जीवनाशक विषादी मिश्रण र उपयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने ४ सामान्य सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन् :

१४.१.१ अनावश्यक रूपमा जीवनाशक विषादी उपयोग नगर्ने/नगराउने ।

धेरैजसो अवस्थामा जीवनाशक विषादीहरूको प्रयोग नगरेर पनि समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने कठिपय वैकल्पिक उपायहरू हुन सक्छन् । वैकल्पिक रूपमा र एकीकृत शान्तु जीव व्यवस्थापन (आई.पि.एम.) कार्यक्रमको component को रूपमा जीवनाशक विषादीको उपयोगलाई गाँस्नुहोस् । उदाहरणको रूपमा, प्राकृतिक परजीवीहरू अथवा जीव भक्षी कीराहरूको उपयोग, प्रतिरोधी जातको उपयोग, उचीत सिंचाई तथा निकासको व्यवस्था, बालीचक, गोडमेल र भारपात उखेल्नु एवं फोहरमैला हटाउनु आदि ।

१४.१.२ सम्भावित खतराबाट सावधान हुनुहोस्/सधै होसियार पूर्वक विषादीको काम गर्नुहोस् ।

प्रत्येक जीवनाशक विषादीका खतराहरू बारे राम्रो जानकारी राख्ने तथा यस सम्बन्धी पूर्व सावधानीवारे थाहा पाएर जीवनाशक विषादी उपयोग गर्ने र गराउने गर्दा सम्भावित दुघटनालाई रोक्न सकिन्छ र वातावरणलाई दूषित हुने कामलाई एकदम कम गराउन सकिन्छ ।

१४.१.३ प्रयोग पूर्व विषादीको लेबलको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने र दिइएको निर्देशिकाको राम्रोसँग पालना गर्ने गराउने ।

जीवनाशक विषादीको लेबलहरू खासगरी यी विषादीहरू सुरक्षापूर्वक उपयोग गर्न उपयोगकर्तालाई आवश्यक मूलभूत जानकारी दिनका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएका हुन्छन् । यी लेबलमा यस्ता विषादीबाट हुन सक्ने सम्भाविते दुर्घटनालाई रोकनका लागि यसको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराका साथै यसलाई सुरक्षापूर्वक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि बताउँछन् । केही स-साना विषादीका बट्टामा लेबलको रूपमा पर्चाहरू हुन्छन् जसमा त्यो विषादी सुरक्षापूर्वक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विस्तारमा दिइएको हुन्छ ।

१४.१.४ केटाकेटीहरूलाई विषादीबाट टाढा राख्नुहोस् ।

कीटनाशक विषादीहरू भण्डारण गर्ने अथवा मिश्रण गर्ने ठाउँमा केटाकेटीहरूलाई खेल मनाही गर्नुहोस् । उनीहरूलाई स्प्रेयर वा डस्टरबाट टाढै राख्नुहोस् । खेतमा झोल र धुलो विषादी छर्कने बेलामा र त्यसको भोलिपल्टसम्म केटाकेटीहरूलाई जान नदिनुहोस् । केटाकेटीहरू कीटनाशक विषादीहरू प्रतिवयस्क मानिसहरू भन्दा सामान्यतया बढि संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरूलाई यसको सम्भावित खतरा थाहा नभएको हुनाले उनीहरूलाई सबै प्रकारका जीवनाशक विषादीबाट टाढै राख्नु पर्दछ ।

१४.२ कीटनाशक विषादी उपयोग गर्नु अगाडि

१४.२.१ विषादी प्रयोग गर्ने उपकरणहरू सहि अवस्थामा राख्ने ।

स्प्रेयर/डस्टर जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिने गरी राम्रो अवस्थामा राख्नुपर्छ । नोजल बन्द हुनु र होजपाईप चुहुनु भनेको यसका समस्या हुन्, जसले गर्दा प्रदूषण ल्याउन सक्छ । होजपाईप चुहुने भएमा विषादी उपयोग गर्ने व्यक्ति माथि पोखिन सक्छ र स्प्रेयरको वाहिरी भाग पनि प्रदूषित हुन पुग्छ । सबै उपकरणहरूलाई दुई पटक जाँच गर्नु पर्छ, काम शुरु गर्नु भन्दा पहिले र दिनभरीको काम सकेर त्यसलाई सफा गरिसकेपछि चुहेका र विग्रेका चीजहरूलाई तुरुतै मर्मत सम्भार गर्नु पर्दछ । यसलाई भोली गरुन्ना भनेर राख्नु हुन्न । त्यसो गरेमा विर्सिन सक्छ ।

१४.२.२ सुरक्षितरूपमा तालाबन्द गरेर राख्ने ।

कीटनाशक विषादीहरूलाई खानेकुरा र जनावरको दाना वा चाराबाट अलगगै र लेबल लागेको भाँडामा तालाबन्द गरी राख्नुपर्दछ । यसबाट कीटनाशक विषादी राखिएको भाँडा वा शिशीसँग केटाकेटीहरूले चल्न सक्ने छैनन् र खानेकुरा तथा जनावरको चारामा विषादीको दुषित प्रभाव पर्न सक्ने छैन ।

१४.२.३ विषादी प्रयोग गर्दा सहि मात्रा र समयमा प्रयोग गर्ने ।

आवश्यकताभन्दा बढी कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्नु अनावश्यक रूपमा खर्चिलो र नोक्सानदायक हुन सक्ने हुन्छ भने आवश्यकताभन्दा निकै कम परिमाणमा विषादी प्रयोगमा ल्याइएमा त्यसबाट सन्तोषजनक रूपमा शत्रुजीव नियन्त्रण हुन सक्दैन । साथै सिफारिस गरिए भन्दा कम मात्रामा विषादी प्रयोग गरेमा शत्रुजीव नियन्त्रण हुन नसकी शत्रुजीवहरूमा विषादी पचाउने क्षमताको विकास हुन्छ ।

१४.२.४ विषादी छनोट गर्दा सकेसम्म कम घातक विषादी छनोट गरिनुपर्छ ।

कुनै खास कीरा नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रकारका विषादीहरू उपलब्ध हुने अवस्था भएमा सबभन्दा कम खतरा भएको विषादी छनोट गरिनुपर्छ । यस्तो छनोट गरिएको विषादीको खर्च/लागत अलिकति बढी पर्न आएमा पनि पछि विष सम्बन्धी समस्याबाट आफु र अरु व्यक्तिहरू ग्रस्त हुन सक्ने समेत विचार गरी माथि उल्लेखित न्यूनतम खतरामूलक विषादी छनोट गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

१४.३ मिश्रण र विषादी छर्दा

१४.३.१ विषादीको काम गर्दा सुरक्षित पहिरनको प्रयोग गर्ने ।

विषादीको प्रयोग गर्दा सुरक्षात्मक पहिरन लगाउनु पर्छ । जीवनाशक विषादीको विषाक्तताबाट बच्ने यो तै सबै भन्दा राम्रो उपाय हो । छालालाई अधिकतम ढाकेर राखिएमा, जीवनाशक प्रदूषणलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

जीवनाशक विषादी प्रयोग गरिदा बाक्लो पोशाक लगाएमा यस्ता विषादी छालाबाट प्रवेश गर्ने कम सम्भावना रहन्छ ।

जीवनाशक विषादीलाई जहिले पनि चलाउँदा, मिश्रण गर्दा वा प्रयोग गर्दा लगाइने सुरक्षात्मक पोशाक कम्तिमा निम्न बमोजिम हुनुपर्छ :

बाक्लो बस्तुबाट तथार गरिएको पुरा बाहुलाको कमीज र लामो पतलुन, जुत्ता वा बुट । अग्लो रुखहरूमा स्प्रे गर्दा चौडा किनारा भएको टोप लगाउनु पर्दछ ।

अभ बढी खतरनाक कीटनाशक विषादीहरू चलाउँदा वा प्रयोग गरिदा अभ लामो पहिरन वा अगाडि पछाडी धुँडासम्म ढाकिने एप्रोन लगाउनु पर्छ । यस प्रकारको एप्रोन बनाउन रासायनिक मल राखिने बोरा वा प्लाष्टिकलाई टाउकोको निम्ति ठाउँ राख्न बीचमा काटी बनाईनु पर्छ । यस्ता एप्रोन एक पटक मात्र उपयोग गरिनु पर्छ र त्यस पश्चात नष्ट गरी दिनु पर्छ ।

जीवनाशक विषादीलाई मिसाउँदा वा घोल नपारिएको अवस्थामा चलाउनु पर्दा पि.भि.सी. को पंजा लगाउनु पर्छ । यस्तो गर्नु प्रदूषित हातबाट पर्न सक्ने प्रभाव रोक्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पाउडर सविन्यास र धुलोलाई प्रयोग गर्दा हलुको खालको धुलो छेक्ने मास्क वा नाक र मुखमाथी कपडा बाँधन सिफारिश गरिएको छ । धुलोका कणहरू श्वास क्रियाबाट शरिरमा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति आउन नदिन उपरोक्त विधि सहायक हुन्छ ।

बढी विषालु प्रकृतिका कीटनाशक विषादीहरू चलाउँदा र प्रयोग गर्दा खासगरी ठुलो क्षेत्रफलमा स्प्रे गर्दा, रासायनिक फिल्टर सहितको कृतिम श्वास उपकरण उपलब्ध भएसम्म उपयोग गरिनुपर्छ ।

१४.३.२ जीवनाशक विषादी चलाउँदा खान, पिउन वा धुमपान गर्न हुँदैन ।

सबै प्रकारको सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएता पनि पञ्जा, हात र पहिरनबाट जीवनाशक विषादी शरिर भित्र प्रवेश गर्न सम्भावना प्रवल रहन्छ । यस प्रकारको प्रदुषण, खाद्य, पेय पदार्थ र सिगरेटेमा सजिलोसँग हस्तान्तरित हनु सक्ने हुन्छ ।

विषादी फैलावटबाट जोगिनु पर्छ । जीवनाशक विषादीलाई खोल्दा स्प्रे टैकमा मिसाउँदा फिरिई त्यसबाट खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना सबभन्दा बढी रहन्छ । कागजी पदार्थमा राखिएको विषादीलाई च्यालु साटो चक्कुले सावधानी साथ काटेर खोल्नु पर्छ । सुरक्षा पहिरन वा खुला छाला खासगरी मुख र आँखामा छिटा पर्न सक्ने भएकोले स्प्रे टैकलाई भुईमा राखी विस्तारै भर्नुपर्दछ । विषादी मिश्रण गर्दा पाउडर, धुलो अथवा पोखिएको कुरा हावाले अर्को दिशातर्फ लाने गरी उभिनु पर्दछ ।

विषादी पोखिएमा तत्कालै त्यसलाई सफा गरिनु पर्छ । छाला वा लगाएको पहिरन प्रदूषित हुन गएमा त्यस्ता प्रदूषित पोशाकलाई हटाई दिनुपर्छ र सावुन पानीले छाला तत्कालै धुनुपर्छ ।

१४.३.३ विषादी प्रयोग गर्दा हावाको बहावलाई छ्याल गर्ने ।

गैर लक्षित क्षेत्रमा विषादी प्रसारित हुनबाट बचावट गर्नुपर्छ । तोकिएको बाली र क्षेत्रलाई मात्र उपचार गर्ने बन्दोवस्त मिलाउनु पर्छ । हावाको बहावबाट हुन सक्ने प्रदुषणलाई निम्न प्रकारले घटाउन सकिन्छ । लामो नोजलहरू र कम स्प्रेयिङ्ग द्वावलाई उपयोग गरेमा झोलको बाक्लो धारा उत्पन्न हुन आउँछ । मधुरो मिश्रित धाराको तुलनामा यस्तो बाक्लो धाराको बहाव गैर लक्षित ठाउँमा हुने सम्भावना कम रहन्छ । हावाको बहाव कम रहेको समयमा स्प्रेयिङ्ग गर्ने वा धुलो छर्किनु पर्दछ । यसबाट अन्यबाली र घरहरूमा प्रदुषण हुने सम्भावना कम रहन्छ । जीवनाशक विषादी छर्ने सबभन्दा उपयुक्त समय बिहानी सबैरे वा साँझमा हुन्छ । यस समय तापकम न्युन र हावाको बहाव शुन्य रहन्छ ।

१४.३.४ बन्द भएको नोजललाई कहित्यै मुखले खोल्नु हुन्न

नोजल कडासँग लाग्न गएमा त्यसलाई अलग छुट्याउनु र सफा गर्नुपर्छ । जीवनाशक विषादी भरेको अवस्थामा यो क्रिया पनि खतरापूर्ण हुन्छ । नोजल र फिल्टरलाई सफा गर्दा दाँत माज्ने पुरानो ब्रस वा बाँसको पातलो चिरान गरिएको टुक्रालाई प्रयोग गर्नुपर्छ । कहिले पनि मुखले फुकेर वा चुसेर सफा गर्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।

१४.४ जीवनाशक विषादी प्रयोग पश्चात

१४.४.१ विषादीको भाँडोलाई सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्ने ।

विषादी प्रयोग पश्चात खाली वा रितो भाँडा वा कागजी पदार्थलाई नष्ट गर्नुपर्छ । केटाकेटी, जनावरहरू र वातावरणको लागि जीवनाशक विषादीको रितो भाँडो वा कागजी पदार्थ निकै खतरनाक हुनसक्छ, किनभने यिनीहरूमा केही परिमाणमा विष रहिरहेको हुन्छ । पानीको खाल्डो, खोला वा घरहरूबाट टाढा जीवनाशक विषादीको भाँडालाई जलाएर वा गाडेर नष्ट गर्नु भन्दा पहिले सुरक्षित विधिबाट यो कार्य दुङ्याउन तीन पटक पखाल्ने वा खोकल्ने (Triple Rinsing) प्रविधि अपनाउनु पर्छ । पिउने पानी वा खाद्य पदार्थ संचय गर्न जीवनाशक विषादीको रितो भाँडो प्रयोग गरिनु हुन्न ।

ट्रिपल रिंजिंग (Triple Rinsing) मा निम्नलिखित क्रिया समाविष्ट रहन्छ :

- विषादीको भाँडोबाट विषको अन्तिम थोपासम्म पनि स्प्रे टैकमा नै राख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।
- त्यसपछि विषादीको भाँडो (Container) को एक चौथाई भाग पानीले भर्ने र त्यसपछि विर्को लगाई हल्लाउने जसबाट त्यसको भित्री भाग पानीबाट धोइन्छ ।
- यस प्रकार धोइएको पानीलाई स्प्रे टैकमा नै खन्याउने ।
- यो कार्यविधि दुई पटक दोहन्याउने ।

यस क्रियाबाट भाँडो (Container) मा रहेको सबै विष निर्मूल हुन्छ र भाँडो (Container) लाई सुरक्षित ढंगबाट गाड्न वा जलाउन सकिन्छ ।

स्प्रेयर र धूलो छर्ने उपकरण उपयोग गरेपछि सफा गर्नुपर्दछ । काम गरेको प्रत्येक दिनको आखिरमा उपकरणलाई सफा पानीले दुई पटक सफा गरिनुपर्दछ जसबाट जीवनाशक विषादीको प्रभाव रोक्न सकियोस् । स्प्रे नोजल र फिल्टरलाई अलगराई बेगला बेगलै सफा गरी धुनुपर्दछ । स्प्रेयरमा फिंजावट र चुहावटको कारणबाट विषादी हुन सक्ने भएकोले स्प्रेयरको बाहिरी भाग समेत धुनु पर्दछ । पानीको भाग र नाप्ने उपकरण र बाल्टीन पनि धोइनु पर्दछ । यस प्रकार धुने कार्य गरिंदा, ध्यान दिनुपर्ने जरुरी के छ भने, धोएको पानी खोला वा सिंचाईको लागि पानी रहेको थलोमा नपुगोस् । यसबाट केटाकेटी, गाई भैसी र अन्य पाल्तु जनावरहरूलाई प्रदूषित हुनबाट बचावट गर्न सकिन्छ ।

१४.४.२ म्याद नाघेका विषादीको उपयुक्त विसर्जन

विश्वमा विषादीको खपत करिव २० लाख मे टन हुने र त्यसमा ४५५ यूरोप, २५५यू एस, २५५, भारतले ३.७५५, र वाँकी अन्य देशले गर्दछन् । जस्मा ४७.५५ भारतनाशक, २९.५५ कीटनाशक, १७.५५ दुसीनाशक र ५.५५ अन्य पर्दछन् । विश्वमा करिव २६ मिलियन मानिसहरूमा बर्णनी विषादीको असर पर्ने र जस्मा करिव २.२ मिलियन मर्ने गरेका पाइन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा म्याद नाघेका करिव ५ लाख मे. टन विषादी रहेको अनुमान छ (FAO website) । म्याद नाघेका विषादीको विसर्जन गर्न ३००० देखि ५०००अमेरिकी डलर प्रति मे. टन लाग्दछ । (FAO,1995)

म्याद नाघेका विषादी (Obsolete pesticide) :

विषादी जुन उद्देश्यकोलागी बनेको हो सो प्रयोजनको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने र नष्ट गर्ने प्रकृयामा वा अन्य उपयोगी पदार्थ बनाइन्छ । प्रतिबन्धित विषादीलाई नै obsolete pesticide भनिन्छ, जुन प्रयोग गर्नु गैर कानूनी हुन्छ । भौतिक र रसायनिक रूपले तिनीहरू नष्ट भएका हुन्छन् । यिनीहरू भोल, धूलो, दानादार वा दूधिलो सारमा हुन्छन् । विषादीका खाली भाँडा, विषादीयूक्त माटो र गाडिएका विषादी यसमा पर्दछन् । यस्ता विषादीको विसर्जन तोकीएको मापदण्डको आधारमा गरिन्छ । विषादीको कुनै पनि भाँडा, बट्टा वा प्याकेट आगोमा जलाउनु हुँदैन त्यसले वातावरण प्रदूषण हुन जान्छ ।

चीर स्थायी खतरनाक विषादी (Persistent Organic Pollutants/POPs) कुनै विषादी वातावरणमा लामो अवधिसम्म विखण्डन नभइ त्यसको असर रहिरहने चरित्रका हुन्छन् । त्यस्ता विषादीलाई चीर स्थायी खतरनाक विषादी (Persistent Organic Pollutants/POPs) भनिन्छ । यिनीहरू विषादी र औद्योगिक रसायनहरू छन् । Stockholm Convention ले यस्ता विषादीको व्यवस्थापन सम्बन्धीका कार्य गर्दछ । चीर स्थायी खतरनाक विषादी अन्तरगत पहिला १२ वटा र नयाँ १६ गरी जम्मा २८ वटा छन् । यस्ता विषादी धैरै देशमा प्रतिबन्धित छन् ।

तिनका चरित्रहरू :

- पानीमा कम धूले तर पानी मन पराउने (Lypophilic)
- वातावरणमा लामो अवधिसम्म विखण्डन नभइ वातावरणमा रहने
- वोसोमा जम्मा भइ खाद्य चक्रमा प्रवेश गर्ने
- लामो दूरी पार गर्न सक्ने
- समुन्द्री जीवमा असर देखिने
- अर्के दुषित वस्तुमा परिवर्तन हुने र वातावरणमा प्रभाव पार्ने
- विषादी अन्तरगत पहिला १२ वटा र नयाँ १६ गरी जम्मा २८ वटा विषादीहरू छन् । जस्मा Organochlorine pesticides aldrin, endrin, clordane, DDT, heptachlor, mirex, toxaphene and hexachlorobenzene र औद्योगिक

रसायनहरूमा PCBs, HCBs and unintended byproducts (dibenzodioxins, dibenzofurans), and other chemicals पर्दछन् ।

म्याद नाघेका विषादीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य न त कम खर्चिलो न प्रतिधिक हिसाबले सरल छ । नष्ट गर्ने वस्तुको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने तरिका फरक हुन्छ । वातावरणीय हिसाबले धेरै तापक्रम हुने चिम्नी (Incineration) मा विसर्जन गर्ने बढी प्रयोग भएको तरिका हो तर सुरक्षित भने होइन । विकासोन्मुख देशमा विषादी र खतरनाक फोहरको विसर्जन गर्ने संरचना प्राय हुँदैन । पहिला म्याद सकिएको पहिला नै FAO, UNEP, UNIDO जस्ता संस्थाले चिम्नीमा विसर्जन गर्ने (Incineration) बाहेक अन्य कुन तरिकाले विसर्जन गर्दा बढी सुरक्षित हुन्छ भनी खोजी गरिरहेका छन् । विश्वमा चौर स्थायी विषादी (POPs) र खतरनाक फोहरहरूको परिमाण बढ्दो छ । नेपालमा जम्मा भएको ७५.५ मे टन म्याद नाघेका र चौर स्थायी विषादी (POPs) सन् २००७ मा जर्मन सरकारको सहयोगमा जर्मनमा लगी विसर्जन गरियो । सकेसम्म उपयुक्त प्राकिङ्ग गरी भण्डारण र लेवलिङ्ग गर्ने र उत्पादन कम्पनीलाई फिर्ता गराउन प्रयास गर्नु पर्दछ ।

१५. पर्खने समय अवधि र विषको अवशेष

पर्खने समय अवधि विषादी छरेपछि, कतिदिनसम्ममा विषादीको अधिकतम अवशेष मात्रा बाँकी रहन्छ, त्यही अवधिलाई बाली टिप्पन पर्खने समय अवधि (waiting period) भनिन्छ । कुनै वयस्क व्यक्तिलाई नोक्सानी नहुने गरी दैनिक खुवाउन सकिने विषादीको मात्रालाई स्वीकार्य दैनिक विषादी मात्रा भनिन्छ । बालीमा रहने यही स्वीकार्य दैनिक मात्रालाई अधिकतम अवशेष सीमा भनिन्छ ।

विषको अवशेष

विषादीहरूले तत्काल गर्ने हानी त आफ्नो ठाउँमा छैदैछ, कतिपय विषादीहरूले प्रयोग गरेको धेरै पछिसम्म पनि असर गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई विषको अवशेषबाट हुने असर भनिन्छ अवशेष भनेको बाँकी रहेको भाग हो । केही विषादीहरूको विषालुपना प्रयोग गरेको केही समयपछि, पूरै हराएर जान्छ र त्यो निश्चित समयपछि हराएर जान्छ । तर डी.डी.टी., बी.एच.सी. आदिको विषालुपना माटो, बाली, जनावर आदिमा लामो समयसम्म रहिरहन्छ । त्यसरी नपर्चिकन रहेको विषालुपनाले पछिसम्म पनि मानिस र वातावरणलाई असर गरिरहेका हुन्छ । मात्राका हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल धेरै विषादी प्रयोग हुने देश होइन । तर विषादी प्रयोग गर्ने हाम्रो तरीका भने खतरनाक छ । वैज्ञानिकहरू भन्न्हन् नेपालजस्ता जथाभावी विषादीको प्रयोग गरिने देशहरूमा ज्याँदै धेरै मानिसको शरिरमा विषादीको अवशेष पाइन्छ । विषको यस्तो अवशेष पानीबाट माटामा र माछाबाट मानिसमा सरेको हुन सक्छ वा विषादी छर्केको घाँस, दाना खाएका जनावरको मासु वा दूधबाट सरेको हुन केही विषादीहरूको पर्खनुपर्ने समय यस प्रकार छ ।

केही विषादीहरूको पर्खनुपर्ने समय र मारक मात्रा यस प्रकार छन्

क्र. सं.	विषादीको सामान्य नाम	मारक मात्रा	विषादीको किसिम	WHO Classification	पर्खनु पर्ने अवधि (Waiting Period)
१	एवामेटिन	११	किटनाशक		१ ४ दिन
२	एसिफेट	१४५	किटनाशक	III	१ ५ दिन
३	एसिटामिप्रिड	३३०	किटनाशक	II	१ ५ दिन
४	अल्फसाईपरमेथिन	७९	किटनाशक	II	१ ४ दिन
५	अल्फामेथिन	>२०००	किटनाशक	II	७ दिन
६	एल्मुनियम फोस्फाईड	११.५	किटनाशक	NC	
७	वेटा साइफ्लुन	११	किटनाशक	Ib	४ दिन
८	बाइफ्लिथिन	५५	किटनाशक	II	६ दिन
९	ब्रिओफेजिन	३३००	किटनाशक	III	५ दिन
११	कार्टाप हाइड्रोक्लोराईड	३२५	किटनाशक	II	२१ दिन
१२	क्लोरफ्लुजुरान	८५००	किटनाशक	IGR	७ दिन
१३	क्लोरानट्राइलिपोर	>५०००	किटनाशक	U	७ दिन

क्र. सं.	विषादीको सामान्य नाम	मारक मात्रा	विषादीको किसिम	WHO Classification	पर्खनु पर्ने अवधि (Waiting Period)
१४	क्लोरपाइरिफोस	१३५	किटनाशक	II	२८ - ३५ दिन
१५	साईफ्लुथ्रिन	१५	किटनाशक	Ib	७ दिन
१६	साईपरमेथ्रिन	२५०	किटनाशक	II	७ दिन
१७	साइरोमेजिन	३३००	किटनाशक	III	७ दिन
१८	डेल्टामेथ्रिन	१३५	किटनाशक	II	७ दिन
१९	डाईफ्लुबेन्जुरोन	४६४०	किटनाशक	III	७ दिन
२०	डाईमेथोएट	१५०	किटनाशक	II	१५ दिन
२१	डाइनोटफुरन	२०००	किटनाशक	II	३८ दिन
२२	इमामेक्टिन बेन्जोएट	>९२.६	किटनाशक	II	१० दिन
२३	इथिएन	२०८	किटनाशक	II	१४ दिन
२४	फेनभेलारेट	४५०	किटनाशक	II	७ दिन
२५	फेनपाइरोक्सिमेट				३ - ७ दिन
२६	फिप्रोनिल	९२	किटनाशक	II	३२ दिन
२७	फ्लुबेन्ड्यामाइड	>२०००	किटनाशक	II	३० दिन
२८	इमिडाक्लोरप्रिड	४५०	किटनाशक	II	४० दिन
२९	इण्डोअकजाकार्ब	>१७३०	किटनाशक	II	१४ दिन
३०	इटेफेनप्रोक्स		किटनाशक		१५ दिन
३१	ल्याम्डासाइहालोथ्रिन	५६	किटनाशक	II	१४ दिन
३२	लुफेनुरोन	>२०००	किटनाशक	III	१४ दिन
३३	मालाथिएन	२१००	किटनाशक	III	१४ दिन
३४	निटेनपाइराम	१५७५	किटनाशक	III	१६ दिन
३५	तोभालुरोन	>५०००	किटनाशक	U	५ दिन
३६	फेनथोयट	४००	किटनाशक	II	५ दिन
३७	प्रोफेनफोस	३५८	किटनाशक	II	१४ दिन
३८	प्रोपोक्जर	९५	किटनाशक	II	३० दिन
३९	क्विनालफस	६२	किटनाशक	II	४० दिन
४०	स्पाइरोमेसिफेन	>२०००	किटनाशक	II	७ दिन
४१	टेमेफस	४०००	किटनाशक	III	३० दिन
४२	थायोमेथोक्साज	१५६३	किटनाशक	III	१४-२१ दिन
४३	फेनपाइरोक्जिमेट	२४५	सुलसुलेनाशक	II	५ दिन
४४	हेक्जथियाजोक्स	>५०००	सुलसुलेनाशक	U	२० दिन
४५	प्रोपरजाइट	२२००	सुलसुलेनाशक	III	१४ दिन
४६	क्याप्टान	९०००	दुसीनाशक	U	३० दिन
४७	कार्बेंडाजिम	१००००	दुसीनाशक	U	१४ दिन
४८	कार्बोक्सिन	३८२०	दुसीनाशक	III	२१ दिन
४९	क्लोरोथालोनिल	>१००००	दुसीनाशक	U	१४ दिन
५०	कपर हाइड्रोक्लोराइड		दुसीनाशक	II	१४ दिन
५१	कपर हाइड्रोक्साइड	१०००	दुसीनाशक	III	१४ दिन
५२	कपर अक्सिक्लोराइड	१४४०	दुसीनाशक	III	२१ दिन

क्र. सं.	विषादीको सामान्य नाम	मारक मात्रा	विषादीको किसिम	WHO Classification	पर्खनु पर्ने अवधि (Waiting Period)
५३	साइमोक्सानिल	११९६	दुसीनाशक	II	१ ४ दिन
५४	डाइफिनाकोजाजोल	१४५३	दुसीनाशक	II	३४ दिन
५५	डिनोक्याव	९८०	दुसीनाशक	II	२१ दिन
५६	फिनामिडन	२०२८	दुसीनाशक		९० दिन
५७	फ्लुसलफामिड	>५०००	दुसीनाशक	U	२८ दिन
५८	हेक्जाकोनाजोल	२१८०	दुसीनाशक	III	४० दिन
५९	इप्रोभेलिकार्व	>५०००	दुसीनाशक	U	३० -९० दिन
६०	इप्रोवेनफस	६००	दुसीनाशक	II	१ ४ दिन
६१	कासुगामाईसिन	>१००००	दुसीनाशक	U	३० दिन
६२	किरोक्सिम मिथाइल	>२०००	दुसीनाशक	U	१ ४ दिन
६३	मैन्कोजेब	>८०००	दुसीनाशक	U	१४-२८ दिन
६४	मेटालाक्सिल	६७०	दुसीनाशक	II	४९ दिन
६५	मेटिराम	>१००००	दुसीनाशक	U	६ दिन
६६	पेन्सिकोन	>५०००	दुसीनाशक	U	७९ दिन
६७	प्रोविकोनाजोल	१५२०	दुसीनाशक	II	१५-३० दिन
६८	प्रोपिनेव	८५००	दुसीनाशक	U	३० दिन
६९	सल्फर	>३०००	दुसीनाशक	III	१ ४ दिन
७०	थाइफोनेट मिथाइल	>६०००	दुसीनाशक	U	१ ४ दिन
७१	थिराम	५६०	दुसीनाशक	II	१ ४-३० दिन
७२	ट्राइसाइक्लाजोल	३०५	दुसीनाशक	II	३० दिन
७३	भेलिडामाईसिन	>१००००	दुसीनाशक	U	२१ दिन
७४	जिनेव	>५०००	दुसीनाशक	U	१० दिन
७५	ब्रोमाडियोलोन		मुसानाशक	Ia	
७६	जिंक फोर्स्फाइड	४५	मुसानाशक	Ib	
७७	मेटलडिहाइड	३३७	मालस्कीसाईड	II	
७८	एजाडिरेक्टिन	>३०००	जैविक विषादी	III	३ दिन
७९	युभेरिया बेसिआना		जैविक विषादी	U	७ दिन
८०	मेटाराईजिएम एनिसोपीलीआई		जैविक विषादी	U	३ दिन
८१	सिउडोमोनास फ्लुरोसेन्स	>२०००	जैविक विषादी	U	३ दिन
८२	ट्राईकोडर्मा भिरिडी	>१०००	जैविक विषादी	U	७ दिन
८३	भट्रिसिलिएम लेकानी		जैविक विषादी	U	७ दिन
८४	२,४डि सोडियम साल्ट	३७५	भारपातनाशक	II	७ दिन
८४	२,४डि इथाइल इस्टर		भारपातनाशक	II	२१ दिन
८५	एमोनियम साल्ट अफ ग्लाइफोसेट	४३२०	भारपातनाशक	III	५६ दिन
८६	एट्राजिन	२०००	भारपातनाशक	III	६० दिन
८७	बिसपर्विक सोडियम	३६३५	भारपातनाशक	III	
८८	व्युटाक्लोर	३३००	भारपातनाशक	III	९० दिन
८९	क्यालडिनाफोप्रोपार्जिल	१८२९	भारपातनाशक	U	
९०	ग्लाइफोसेट	४२३०	भारपातनाशक	III	९० दिन

क्र. सं.	विषादीको सामान्य नाम	मारक मात्रा	विषादीको किसिम	WHO Classification	पर्खनु पर्ने अवधि (Waiting Period)
११	मेट्रिव्युजिम	३२२	भारपातनाशक	II	७ दिन
१२	मेटसल्फुरोन मिथाईल	>५०००	भारपातनाशक	U	१४ दिन
१३	अक्सिडार्जिल	८०२	भारपातनाशक	U	९७ दिन
१४	अक्सिफ्लोरफेन	>५०००	भारपातनाशक	U	१५ दिन
१५	पाराक्वाट डाइक्लोराइ	१५०	भारपातनाशक	II	९० दिन
१६	चेन्डिमिथालिन	१०५०	भारपातनाशक	II	७५ दिन
१७	प्रेटिलाक्लोर	६१००	भारपातनाशक	U	७५ दिन
१८	प्रोपाक्विजाफोप	>५०००	भारपातनाशक	U	२१ दिन
१९	पाइराजोसल्फुरान इथाईल	>५०००	भारपातनाशक	U	७ दिन
१००	सल्फोसल्फुरोन मिथाईल	२०००	भारपातनाशक	U	६० दिन

विषादी छरी सकेपछि पर्खनुपर्ने समय (Waiting period) विषादीको बाली, बालीको वृद्धि अवस्था, मौसम र भौगोलिक अवस्थितिमा भर पर्दछ। पर्खनुपर्ने समय अनिवार्य पालना गर्ने, गराउने र विषादीको प्रयोग गर्दा जतिसुकै कम हानीकारक छाने पनि प्रयोग गरी सकेपछि, पर्खनुपर्ने समयको ख्याल नगरी उपभोग गरिएमा त्यो भनै जोखिमपूर्ण हुन जान्छ। त्यसैले पर्खनुपर्ने समयको अनिवार्य पालना गर्नु पर्छ।

१६. मित्रजीव र विषादी

आई.पी.एम.तरीका अपनाई खेती गर्दा शत्रुजीवको प्रकोप, मौसम अवस्था, मित्रजीवको संख्या, बालीको अवस्था, बजारको स्थिति आदि परिस्थिति हेरी कहिलेकाही रासायनिक विषादीको समेत प्रयोग गरिनुपर्ने हुँदा यस बेला मित्रजीवको संरक्षणमा अति नै ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। किनकी मित्रजीवहरू ज्यादै नरम र कोमल शरीर भएका हुनाले विषादी र यसको गन्ध सहनै नसक्ने हुन्छन्। कृषकका यि मित्र कीराहरूका लागि विषादी प्रयोग घातक हुने तथा स्थानीय पर्यावरणमा विद्यमान मित्रजीवहरूको नाश भै शत्रुजीवहरूको सन्तुलन खल्वलिन जान्छ। फलस्वरूप ठुलो मात्रामा रोग कीराको प्रकोपले महामारी लिने खतरा रहन्छ। मित्र जीवलाई कृत्रिम रूपमा कृत्रिम वातावरणमा पालेर खेतमा परजीवीकरणका लागि छाडिने प्रचलनमा त विषादीको मिल्दोपना खेतबारी जस्ता धेरै तत्वमा मिल्दोपना र अमिल्दोपनाको अति नै ख्याल गरिनु पर्ने हुन्छ।


खास गरी परजीवी र मित्रजीवहरू कुन विषादी सङ्गसङ्गै बाँच्न सक्छन अथवा विषादीका कारण कमभन्दा कम मित्रजीवहरूलाई क्षमता पुऱ्य, भन्ने कुरा मित्रजीवको विषादी सहनसक्ने क्षमता, मित्रजीवको प्रकार (शिकारी वा परजीवी कुन हो कुन प्रजातिको, सो को जीवनचक्र वृद्धि अवस्था (Lifestages and sensitivity) र सवेदनशीलता, प्रयोगको दर र समय, कसरी असर गर्दै (Mode of action) अनि विषादी कस्तो हो कीटनाशक हो वा सुलसुलेनाशक हो भन्ने कुरा विचार गरिनु पर्दछ। विषादीले मित्रजीवलाई धेरै किसिमले असर पुऱ्याउन सक्छ, जस्तै जीवन अवधि (Survival longevity), होस्ट स्वीकार्यत (Host acceptance) भाले पोथी अनुपात (Sex ratio) अण्डा उत्पादन क्षमता (Reproduction (fecundity) चरणमाजाने वानी व्यवहार (Foraging behavior) अण्डाबाट फूल कोरलिने प्रतिशत (Percentemergence) र वृद्धि अवस्थापिच्छेको अवधि (Development time) आदि। प्रत्यक्ष मारि नहाले पनि विषादीले ज्यकत र भित्रपट्टीको मित्रजीव को वृद्धि विकास ढीला भै बेमेल हुने, ढीला कोरलिने, मित्रजीवको आयु छाटो भैदिने जस्ता असरहरू पुऱ्याउन सक्छन तर धेरैजसो जैविक र धरेलु विषादी सुरक्षित छन्।

१७. विषादी दुरुपयोगका कारणहरू र न्यूनिकरणका उपायहरू

संसारमा भएका विभिन्न किसिमका जीवजन्तुहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत कीराहरूले ओगटेका छन् तर कीरा तथा रोगहरूका धेरै कम प्रजातिहरू मात्र बालीनालीको लागि हानीकारक छन् र बाँकी सबै बालीनाली तथा समस्त मानव जातिका लागि लाभदायक छन्। अर्कोतिर खाद्य श्रृङ्खलामा एउटा जीव अर्कोसँग निर्भर रहन्छ। त्यसैले खाद्य श्रृङ्खलाका कुनै एउटा जीव या जन्तुमा दुष्प्रभाव पन्यो भने स्वतः सम्पूर्ण श्रृङ्खला खल्वलिन्छ, त्यसको असर अन्ततः मानिसमा पर्न जान्छ। त्यसैले बालीनालीमा रोग तथा कीरा देखिँदैमा विषादीको प्रयोग गर्नु किमार्थ पनि बुद्धिमानी हुँदैन। बालीनालीमा पनि निश्चित हदसम्म रोगकीरा

सहन गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ र त्यो हदभित्रै विषादी प्रयोग गरियो भने आर्थिक नोक्सानीको साथसाथै प्राकृतिक शत्रुहरू र तिनीहरूको आहारा विनास हुन्छन् र भन डरलागदा शत्रुहरूको विकास हुन्छ र अन्त्यमा सम्पूर्ण कृषि पर्यावरणमा नराम्भो प्रभाव पर्दछ । त्यसैले शत्रुजीवहरूको आर्थिक हानी पुऱ्याउनसक्ने संख्या देखापन्न थालेपछि मात्र नियन्त्रणका उपायहरू सोच्नु पर्दछ ।

त्यसकारण नियन्त्रण (व्यवस्थापन) भन्नाले पूर्णरूपमा सखाप पार्नु नभई खाद्य श्रृङ्खला (Food web), कृषि पर्यावरण (Agroecosystem) र संपूर्ण वातावरण (Whole Environment) मा असन्तुलन नहुने गरी एक भन्दा बढी बाली शत्रु नियन्त्रणका उपायहरू अबलम्बन गरी शत्रुजीवको संख्यालाई आर्थिक हानी को तह (Economic threshold level) भन्दा तल (General Equilibrium Level मा) राख्ने पद्धति हो जसले गर्दा रासायनिक विषादीको प्रयोगमा क्रमश कमी आउँदछ र रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोगले हुनसक्ने दुष्प्रभावबाट बच्न सकिन्छ । Natural Ecosystem मा बोट बिरुवा र जीव जन्तु कसरी एक आपसमा आश्रित हुन्छन् भन्ने कुरा तलको खाद्य जालोबाट स्पष्टसंग बुझ्न सकिन्छ ।



Food Chain (खाद्यलहरौ)
(Just one path of energy)

Food Web (खाद्य श्रृङ्खला)
(Everything connected)

Source : http://www.bigelow.org/edhab/filtering_algae.html

बाली नालीमा लाग्ने विभिन्न शत्रुजीव नियन्त्रणको लागि प्रयोग हुने रासायनिक विषादीहरू मानिस र पशु, पन्चीको लागि समेत घातक हुने र हावापानी, माटो लगायत समग्र पर्यावरणलाई नै प्रदुषीत गर्न सक्ने भएकोले त्यस्ता विषादीहरू प्रयोग गर्दा गर्दा निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । असावधानी पूर्वक प्रयोग गर्दा प्रयोग कर्ता र उपज उपभोग कर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव त पर्द्दै नै साथै त्यस्ता वस्तुहरूको अवशेषयुक्त उपजहरू उपभोग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समेत मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्द्दै र त्यसको असर हामीले महशुस समेत गर्न थालिसकेको छौ ।

त्यस्ता घातक वस्तुहरू र त्यस्ता वस्तुहरूको अवशेषयुक्त खाद्यान्त उपभोगबाट पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन प्रभावहरू र त्यसबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा सचेत हुन र अरुलाई समेत सचेत गराउन सम्पूर्ण कृषक महानुभावहरू, उपभोक्ता वर्गहरू, रासायनिक विषादीको कारोबारमा सलग्न व्यापारी वर्गहरू तथा सम्पूर्ण शिक्षित, वौद्धिक, राजनीतिक वर्ग तथा आम जन समुदायमाझ यो चेतनामूलक सन्देश प्रस्तुत गरिएको छ ।

विषादी दुरुपयोगका कारणहरू :

- अनावश्यक रूपमा विषादीको प्रयोग ।
- विषादीको गलत छनौट ।
- अत्यन्त खतरनाक (Extremly hazardous) र चौडा दायरा (Broad spectrum) भएका विषादीको प्रयोग ।
- माछा मार्नको लागि घातक विषादीको प्रयोग ।
- सिफारिस मात्रा र पटक भन्दा बढी विषादी प्रयोग ।
- खाद्यान्न तथा तरकारीको भण्डारणमा विषादीको प्रयोग ।
- फलफूल तथा तरकारीलाई चम्किलो र ताजा देखाउन विषादी वा रसायनको भोलमा ढुबाउने प्रचलन (जस्तै भण्टा, परबल, रामतोरिया, च्याउ आदि)
- विषादी प्रयोग गरी सकेपछि खानयोग्य हुने बेलासम्मको पर्खनु पर्ने समय (Waiting period) को पालना नहुनु ।
- विषादीका खाली प्याकेट तथा डिब्बाहरू सार्वजनिक ठाउं र खोलानालामा जथाभावी फूयाक्नु ।
- विषादी प्रयोग गर्दा वा विषादी उत्पादन, पारिवहन र बैचविखन गर्दा सुरक्षात्मक परिहरनको प्रयोग नगर्नु नगराउनु ।
- विषादी चलाइ सकेपछि लामो समयसम्म प्रदुषित कपडामै रहनु, धुमपान गर्नु र खाने कुरा खानु ।
- सामाजिक दायित्व विनाको व्यापार गर्ने केहि विषादी व्यापारीहरूको मनसाय ।
- विषादीलाई औषधिको उपमा दिनु ।
- विषादी प्रयोग कर्ताहरूसँग विषादीको सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानको अभाव वा हेलचेकयाई असुरक्षित भण्डारण
- गुणस्तरहिन /स्याद नाघेका विषादीको प्रयोग
- शुरूमै कडा विषादीको प्रयोग
- स्याद नाघेका विषादीहरू नष्ट गर्ने गलत तरिका
- खुल्ला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कठिनाई ।
- जनचेतनाको कमि (खास गरी उपभोक्ता माझ विषादीको नकारात्मक प्रभाव बारे चेतनाको कमी) ।
- मिसावट गरिएका र निम्नस्तरका विषादीको वाहूल्यता ।
- स्याद नाघेका विषादी जम्मा हुँदै जानु ।
- रासायनिक विषादीको विकल्प दिन नसक्नु र भएको पनि त्यति प्रभावकारी नहुनु । जैविक विषादीको बजार व्यवस्थापनमा कठिनाई ।
- अत्यन्त न्यून मात्रामा मात्र सेक्स फेरोमेन, फुड ल्युर, बनस्पतिजन्य र सुझम जीवजन्य विषादीको आयात हुने गरेको अवस्था ।
- IPM तथा organic उत्पादनको प्रमाणीकरणमा कठिनाई हुनु ।
- कमजोर अनुगमन र कानूनी प्रावधान ।
- कमजोर अन्तर निकाय /मन्त्रालय समन्वय र सहकार्य ।
- विषादी ऐन र नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउन नसकिनु ।
- विषादीको गुणस्तर तथा अवशेष विश्लेषणको लागि स्तरीय प्रयोगशाला तथा Chemist /Toxicologist को अभाव ।
- विषादी सम्बन्धी ज्ञान र तालिमको कमी

१८. एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आइ.पि.एम)

एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन (Integrated Pest Management)

एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन बाली बिरुवाका शत्रुहरू (रोग, कीरा, भारपात, चरा, मुसा आदि) लाई आर्थिक रूपले न्यायोचीत, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले दिगो तथा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बाली संरक्षण गर्ने एक विधि हो । यसमा एकभन्दा बढी व्यवस्थापनका विधिहरूको एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा रासायनिक विषादीहरूको प्रयोगमा कमी हुन आउँछ । एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनका मुख्य सिद्धान्तहरू:

- (१) स्वस्थ बाली उत्पादन,
- (२) खेतबारीको नियमित अवलोकन,
- (३) मित्र जीवहरूको संरक्षण
- (४) कृषकहरूलाई स्वयं दक्ष बनाओ ।

आई.पि.एम को इतिहास

बढ़दो जनसंख्याको लागि खाद्य आपूर्ति गर्न बढी उत्पादनको आवश्यकता अनुसार कृषिमा हरितकान्ति भएको थियो । बढी उत्पादनशील नयाँ जातको विकास सँगै सिंचाई, मलखाद, विषादी तथा विभिन्न प्रविधि प्रयोगको विकास सँग सँगै गरियो । यसै सन्दर्भमा रोग कीरा नियन्त्रणको लागि अन्याधुन्य अनियन्त्रित विषादीको प्रयोगबाट विभिन्न समस्या जन्मन थाल्यो । विषादीको मात्रा बढावा नयाँ रोग, कीराको व्यापक संकरणले गर्दा उत्पादनमा ठुलो त्रास आउनुका साथै विषादीहरूबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पनि नकारात्मक असर परेको महशुष गरियो । यसै परिवेशमा इण्डोनेशियामा धानबालीमा फड्के कीराको प्रकोपबाट भएको क्षतिलाई मध्य नजर गरी एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन (छोटकरीमा आई.पि.एम) प्रविधिलाई कृषक वीच सिकाउन ई.सं. १९८९ मा आई.पि.एम. कृषक पाठशालाको शुरुवात भएको थियो । यसको प्रभाव राम्रो देखिएकोले अन्तराष्ट्रिय संस्था एफ.ए.ओ. मार्फत एशियाका अन्य देशमा विस्तार गर्दै लगियो । नेपालमा पनि पूर्वी चितवनमा वि.सं. २०५३ को चैते धान (सिएच-४५) मा खैरो फड्के कीराको व्यापक प्रकोप देखियो । एफ.ए.ओ. को विशेषज्ञले अवलोकन गरी दिइएको प्रतिवेदन र अन्य एशियाली मूलुकहरूमा कृषक पाठशालाको प्रभावकारीता राम्रो रहेकाले यसलाई अझ व्यापक गर्ने क्रममा वि.सं. २०५४ देखि एफएओको आर्थिक एव प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा कृषि विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालयको अगुवाइमा धानमा कृषक पाठशालाको शुरुवात भयो ।

एकीकृत बाली शत्रु व्यवस्थापनका विधिहरू:

१. रोग कीरा अवरोधक जातको प्रयोग (Resistant Varieties) : रोग कीराले नोक्सानी नहुने वा कम हुने जातको प्रयोग गर्ने ।
२. कृषि कर्ममा आधारित तरिका (Cultural Method) : बाली चक्र, बीउ छर्ने वा रोपाइ गर्ने समयको हेरफेर, खेतको सरसफाई, उचित खनजोत, बाली कटानीपछि अवशेष नष्ट गर्ने ।
३. भौतिक तथा यान्त्रिक तरिका (Physical and Mechanical) : हातले टिप्ने, अवरोध राख्ने, पासो थाप्ने, अनाज सुकाउने आदि ।
४. जैविक तरिका (Biological Control Method) : परजीवी एवं शिकारी कीराका साथै विभिन्न जीवाणुजस्तै व्याकटेरिया (विटी.), फंगस, भाइरस (एन.पि.भि.) रनिमाटोडको प्रयोग ।
५. आकर्षक रासायनिक पदार्थको प्रयोग (Chemical Atractants) : विभिन्न आकर्षक रासायनिक पदार्थ जस्तै: मिथाइल यूजिनल, क्यूलियर र विभिन्न फेरोमेन जस्तै: हेलीलुर स्पोरडोरलुर आदिको प्रयोग ।
६. घरेलु व्यवस्थापनका विधिहरू ।
७. हर्मोनको प्रयोग: विभिन्न हर्मोन जस्तै आप्लोरको प्रयोग ।
८. विषादीको प्रयोग (Chemical Control Method) : अन्य विधिहरूले नियन्त्रण नभएमा उपयुक्त विषादीको सावधानी पूर्वक प्रयोग गर्ने ।

नेपालमा कृषकहरूले अपनाईसकेका केही आई.पि.एम. प्रविधिहरू:

- नीम, टिमुर, बोझो, तितेपाती, ज्वानु, तोरीको तेल प्रयोग गरी अन्न भण्डारणमा रोग कीरा नियन्त्रण ।
- काठको धूलो, गहुँत, साबुनपानी, सूर्तिको झोल प्रयोग गरी तरकारी बालीको कीरा नियन्त्रण ।
- सुन्तला जात फलफुल र लहरे तरकारीको औंसा कीरा नियन्त्रणको लागि फेरोमेन ट्रायाप, खेतबारीको सरसफाई ।
- स्थानीय वनस्पतिबाट तयार गरिने झोलमल, गाईको गहुँत, मोही आदिको प्रयोग ।
- केहीमात्रामा विभिन्न पासोहरूको प्रयोग ।
- केही मात्रामा ढुसीजन्य, व्याकटेरीया, भाइरस तथा निमाटोड जन्य जैविक विषादीको प्रयोग ।
- मित्र जीवहरूको संरक्षण ।

१९. जैविक विषादी

कुनैपनि हानिकारक कीराहरूलाई न्यून गर्न वा मार्नका लागि कुनै पनि सुक्ष्म जिवित व्याकरेरिया, दुसी, भाइरस तथा नेमाटोडजन्य उपयोगी जीवहरूद्वारा तैयार गरिएको पदार्थलाई जैविक विषादी भनिन्छ । यिनीहरू उपयोगी जीवहरू हुन, जुन हानीकारक कीराहरू मार्न प्रयोग गरिन्छ । जैविक विषादीले शत्रुजीवलाई पूर्णरूपले नमार्ने हुँदा शत्रुजीवको संख्यामा वृद्धि हुन नदिई नियन्त्रित गरी राख्दछ । यिनीहरूको प्रभाव वातावरणमा रसायनिक विषादी जस्तो लामो समयसम्म रहेदैन । यिनीहरू वातावरण, मानव स्वास्थ्य लगायत अन्य अलक्षित जीवको लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छन् । यिनीहरूको प्रयोगबाट शत्रुजीवले विषादी पचाउन सक्ते क्षमता (Pest resistance) तथा शत्रुजीवको संख्यामा पुनः वृद्धि हुन सक्ते (Pest resurgence) को सम्भावना निकै कम रहन्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जैविक विषादीका गुण भएका श्रोतहरूबाट विषादी बनाउन सकिन्छ ।

जैविक विषादीका गुणहरू

- जैविक विषादीले शत्रुजीवलाई पूर्णरूपले नमार्ने हुँदा शत्रुजीवको संख्यामा वृद्धि हुन नदिई नियन्त्रित गरी राख्दछ ।
- यी विषादीहरूको दायरा साँगुरो हुन्छ ।
- यिनीहरूको प्रभाव वातावरणमा रसायनिक विषादी जस्तो लामो समयसम्म रहेदैन ।
- यिनीहरू वातावरण, मानव स्वास्थ्य लगायत अन्य अलक्षित जीवको लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छन् ।
- यिनीहरूको प्रयोगबाट शत्रुजीवले विषादी पचाउन सक्ते क्षमता (Pest resistance) तथा शत्रुजीवको संख्यामा पुनः वृद्धि हुन सक्ते (Pest resurgence) को सम्भावना निकै कम रहन्छ ।
- स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जैविक विषादीका गुण भएका श्रोतहरूबाट विषादी बनाउन सकिन्छ ।

जैविक विषादीको महत्व

- रासायनिक विषादीले जस्तो यिनले वातावरण, मानव शरिर र फाईदाजनक परजीवी कीराहरूलाई असर गर्दैनन । प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि असर गर्दैनन ।
- यी विषादीहरूको दायरा साँगुरो हुन्छ । यिनको असर कीरा अनुसार हुन्छ । तसर्थ लक्ष्य गरिएको कीरामा मात्र यिनको प्रभाव रहन्छ ।
- थोरै मात्राको प्रयोग गरिएता पनि कीरामा बढी असर गर्न सक्छन ।
- यिनको प्रभाव कालान्तरसम्म रहन सक्छ र रसायनिक विषादी जस्तै पटक पटक प्रयोग गरिरहन पर्दैन ।
- जैविक विषादीको प्रयोग गरिएको बालीमा अवशेषको समस्या हुँदैन ।

जैविक विषादीका प्रयोगहरू

- कीरा नियन्त्रमा (प्रायः सबै शुक्ष्म जीवहरू)
- झारपात नियन्त्रमा (मुख्य रूपमा दुसीजन्य विषादी)
- बिरुवामा लाग्ने निमाटोड नियन्त्रण
- बाली रोग नियन्त्रण (मुख्य दुसीजन्य)

नेपालमा पञ्जीकरण भएका जैविक विषादीहरू

१. साधारण नाम: व्युभेरीया बसीयाना (Beauveria bassiana)
व्यापारीक नाम: गारनेट, वावा, वायोपाउडर, दामन जास्पर, रेसर, विवोर, माकोजल
२. साधारण नाम: मेटारिजीयम एनीसोपली (Metarrhizium anisopliae)
व्यापारिक नाम: -OD/fN8, पेसर, कालीचक्र
३. साधारण नाम: एन.पि.भी (Nuclear Polyhedrosis Virus)
व्यापारिक नाम: हेलीसाइड, स्पोडोसाइड

४. साधारण नाम: सिउडोमोनस फ्लोरोसेन्स (Pseudomonas fluorescens) व्यापारिक नाम: वायोक्युर- वि, फसल रक्षा, स्पर्श, भुपरीस, मोर्चा, सुमोना
५. साधारण नाम: ट्राइकोड्रमा (Trichoderma viride, Trichoderma harzianum)
- व्यापारिक नाम: निपरोट, वायोक्युर- एफ, निसर्ग, संजीवनी क्यारियर, निकोड्रमा, आस्टान टि.भी भोपरीसट्रीको
६. साधारण नाम: भर्टीसिलियम लेकानी (Verticillium lecanii) व्यापारिक नाम: मिअलिकील, ट्रिडेन, भेर्टीजाइन केही प्रचलित जैविक तथा वानस्पतिक विषादी

क्र.सं.	नाम	प्रयोग
१	एजार्डिरेक्टीन (नीममा आधारित)	विभिन्न कीराहरूको लागि
२	व्युभेरिया बेसियाना (दुसी जन्य)	पुतलीका लार्भा, साना चुस्ने कीरा
३	मेटाराइजियम एनीसोप्लेइ (दुसीजन्य)	खपटे र पुतलीका लार्भाहरू (माटोमा वस्ने जस्तै खुम्रे)
४	भर्टीसिलियम लेकानी (दुसीजन्य)	सेतो फिंगा, लाही, लिफमाइनर
५	बेसिलस थरनजेनेसिस कुस्टाकी (व्याक्टेरियाजन्य)	विभिन्न पुतली समुहका लार्भाहरू
६	न्युक्लियर पोलीहेड्रोसिस भाइरस	विभिन्न पुतली समुहका लार्भाहरू
	क) हेती ख) स्पोडो	क) गोलभेडाको फल खाने गबारो (Helicoverpa armigera) ख) सूर्तिको पात खाने लार्भा (Spodoptera litura)
७	इन्टोमोप्याथोजनीक निमाटोड	माटोमा वस्ने विभिन्न कीराहरू जस्तै खुम्रे
८	ट्राइकोडर्मा भिरिङी र हजानियम	दुसीजन्य रोग विशेष गरी माटोमा रहने
९	स्युडोमोनास फ्लुरेसेन्स	केराको पनामा वील्ट, ड्याम्पीड अफ, धानको सीथ ल्वाइट, उखुकाके रेड रट, चना र गोलभेडाको ओइलाउने रोग

जैविक विषादीका अवगुणहरू र चुनौतिहरू

- साँगुरो दायरा हुन्छन् ।
- विस्तारै काम गर्द्धन वा असर देखिन्छ ।
- सुर्यको किरण, तापकम्मा हुने घट्बढ तथा अन्य वातावरणका तत्वहरूले सजिलै नस्ट हुन्छन् ।
- तुलनात्मक रूपमा रासायनिक विषादी भन्ना महँगो हुन्छन् तसर्थ रासायनिकसित प्रतिस्पर्धा गर्न गान्छो हुन्छ ।
- प्रयोग गर्नको लागि प्रयाप्त ज्ञान हुनु पर्छ वा यो एउटा ज्ञानमा आधारित प्रविधि हो ।
- विभिन्न जैविक तथा अजैविक तत्वको कारणले गर्दा यिनीहरूको प्रभावकारिता एकनासको हुँदैन, घट्बढ भईरहन्छ ।

मुख्य प्राविधिक समस्या

- खेतबारीमा प्रयोग गर्ने तरिका
- छर्ने र प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय र ठाउँ (कतिखेर र कीराको कुन अवस्था र विरुवाको कुन भागमा) प्रयोग गर्ने मात्रा र दर, तरिका आदि
- छरी सकेपछिको आयु र प्रभावकारिता
- वातावरणीय तत्वको असर
- विरुवाको असर
- लछित रोग र कीराको असर
- अन्य, जस्तै अन्य प्राणीहरू, रासायनिक विषादीहरू, कृषि कर्महरू ।
- जैविक विषादीको प्रभावकारिता बढाउने केहि उपायहरू
- लक्षित कीराको बारेमा सकेसम्म धेरै जानकरी लिने । जस्तै जीवनचक्र, आनीबानी आदि

- ठिक समय (कीराको अवस्था) र ठाउँमा प्रयोग गर्ने वा समय र ठाउँको सहि छनौट गर्ने
- वातावरणमा नष्ट भएर गए पनि पुग्ने गरी पर्याप्त वा सहि दर/मात्रा प्रयोग गर्ने
- उपयुक्त सबिन्यासको छनौट गर्ने जस्तै, तेल मा आधारित सबिन्यास तथा additives हरूको प्रयोगबाट प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ
- रोग कीराको प्रकोप हेरी छक्ने अन्तराल घटाउने
- पानि परेको बेलामा नछक्ने वा stickers को प्रयोग गर्ने
- उच्च गुणस्तरको जैविक विषादी प्रयोग गर्ने
- जैविक विषादीलाई सिधा घाम नपर्ने चिसो तर सुख्खा ठाउँमा भण्डारण गर्ने, यसको जैविक गुणमा कमि आउन नदिन फ्रिजमा ५-७ °C तापकममा भण्डारण गर्ने
- जैविक विषादीलाई आइ.पी.एम. को एउटा भागको रूपमा प्रयोग गर्ने
- जैविक विषादीले बिस्तारै काम गर्ने भएकोले अनुगमन गरेर केहि अगाडी प्रयोग गर्ने
- रोग कीराको स्थिति हेरेर सुरुको केहि हप्ता १-२ पटक धेरै मात्रा/दरमा छर्ने, पछि बिस्तारै छर्ने अन्तर बढाउने र मात्रादर घटाउने
- लेबल राम्रो सित पढ्ने र त्यसमा लेखिएको कुरा राम्रो सित पालना गर्ने

केही प्रचलित ल्यूर र पासोहरू

क्र.सं.	ल्यूरहरूको नाम	प्रयोग हुने पासोको नाम	कीरा	बाली
१	मिथाइल युजिनल	स्टेनर ट्राप	फल कुहाउने औसा	सुन्तलाजात आप फलफूल
२	क्युलियर	स्टेनर ट्राप	फल कुहाउने औसा	काको फर्सी समुहका बाली
३	व्याक्टोसेरा कम्पोजिटि	फनेल ट्राप	फल कुहाउने औसा	माथिका दुवै बाली
४	हेली ल्युर	फनेल ट्राप	गोलभेडाको फलको गबारो	गोलभेडा, चना, रहर
५	स्पोडो ल्युर	फनेल ट्राप	सूर्तिको पातखाने लार्भा	सूर्ति, काउली वर्ग, आलु गोलभेडा
६	डि.वि.एमप्रोटुला ल्युर	डेल्टा ट्राप	इट बुटेपुतली	काउली बन्दा समुहका
७	त्युसिनोडस ल्युर	फनेल ट्राप	फल र डाठामा लाग्ने गबारो	भाण्टा
८	पि.टि.एम १,२ ल्युर	पिट फल ट्राप	जोताहा पुतली	आलु
९	सिप्रो ल्युर	फनेल ट्राप	पहेलो गबारो	धान
१०	पेक्टिनो ल्युर	फनेल ट्राप	दानामा लाग्ने गुलावी गबारो	कपास
११	सिप्रो ल्युर	फनेल ट्राप	पहेलो गबारा	धान
१२	इरमिट र इरमिन ल्यूर		दानामा लाग्ने छिर्के गबारो	कपास
१३		लाइट ट्राप	रातीमा उड्ने कीराहरू	
१४		एलो स्टीकी ट्राप	साना उड्ने कीराहरू जस्तै लाही, सेतो फिंगा, लिफमाइनर	

२०. आचार संहिताको कानूनी अवस्था र मान्यता

आचार संहिताका विषेशताहरूलाई कानूनी मान्यता हुँदैन। आचार संहितामा रहेका प्रावधानहरू कानूनी हैसियतले लागु हुँदैनन्। यसका विषेशताहरूले ऐन र नियमावलीहरूलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दैनन् तर आचार संहिताले जीवनाशक विषादीको सुरक्षायुक्त उपयोग, जीवनाशक विषादीका लेबलहरू (सुचक पत्र) ढुवानी, भण्डारण, सुरक्षाको सावधानी सम्बन्धी प्राथमिक उपचार, सुरक्षित पहिरन, विषादी खुदा बिक्रेता र आयातकर्ताहरूको कार्यहरू आदिको जानकारी उपलब्ध गराउँदछ। आचार संहिताले जीवनाशक विषादी ऐन नियमावलीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सहजता उपलब्ध गराउँदछ। आचार संहिता ऐन नियम लागु गर्न सहयोगसिद्ध पनि मनिन्छ।

विषादी खुद्रा विक्रेताले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताहरू

- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, नियमावली, निर्देशिका र यस सँग सम्बन्धित आचार संहिताको पालना गर्नु ।
- नेपाल सरकारको ऐन, नियम, नीति, निर्देशन र समय समयमा आउने परिपत्र सबैको पालना गरी विषादी व्यवसाय संचालन गर्ने ।
- तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र विषादीको बिक्री वितरण गर्ने ।
- पञ्जीकरण नभएका विषादी बिक्री वितरण गर्न नहुने ।
- सकेसम्म मारक मात्रा बढी भएका विषादीमात्र बिक्री वितरण गर्ने ।
- पर्खनु पर्ने समयको बारेमा कृषकहरूलाई जानकारी गराउने ।
- First in first out सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने ।
- कृषकको बालीको समस्या पहिचान अनुरूपमात्र सहि विषादी बिक्री वितरण गर्नु ।
- विषादी बिक्री वितरणमा आफु सुरक्षित रहेर कारोबार गर्नु ।
- विषादीको अभिलेख राखी बिक्री गर्ने ।
- प्रतिवन्धित विषादीको जानकारी हुनु पर्ने ।
- घातक विषादीहरू (IB) सम्बन्धित जिल्लाका बाली संरक्षण अधिकृत (विषादी निरीक्षक) को सिफारिशमा मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्ने ।
- सफा र स्पष्ट देखिने गरी विषादीहरू व्यवस्थित तरीकाले मिलाएर पसलमा राख्ने ।
- विषादीको सुरक्षित भण्डारण गर्ने ।
- विषादी बेचविखनमा Aggressive Role खेल्न नहुने ।
- गुणस्तरहिन (Sub- standard/ Adulterated) विषादी बिक्री गर्न नहुने ।
- विषादी वाहेक अन्य विकल्प छैन भन्ने भुटो, भ्रामक, असत्य, धोखापूर्ण र मित्या कुरा गरी सामाजिक अपराध गर्नु हुँदैन ।
- विषादी निरीक्षकलाई आवश्यक सूचना एवम् तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु ।
- विषादी बिक्री वितरण गर्दा केटाकेटी र बालबालिका, बुढाबुढी र वृद्ध वृद्धाहरू, मनस्थिति बिग्रेका र मानसिक रोगी व्यक्तिलाई बिक्री वितरण नगर्नु ।
- प्रयोजन के हो बुझेर मात्र प्रयोग विधि र तरिका खुलाई विषादी दिनु ।
- विषादी पसलमा हुन सक्ने आकस्मिक दुर्घटनालाई छ्याल गरी जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक सामग्री (साबुन, पानी, बालुवा, सावेल, कुचोको व्यवस्था गर्ने ।

आयातकर्ताको लागि

- राष्ट्रिय नीति नियम अनुरूप कार्य गर्नु गराउनु ।
- जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ र नियमावली २०५० (पहिलो शंसोधन २०६४) को पालना गर्नु गराउनु ।
- विषादीको राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा र ऐन नियम बमोजिम आयात गर्नु ।
- विषादी बिक्री वितरण गर्दा खुद्रा विक्रेतालाई दिदा ऐन, नियम बमोजिम कार्य नगरेको, अभिलेख नराखेको र ईजाजत पत्र नभएका खुद्रा विक्रेतालाई बिक्री वितरण नगर्नु ।
- विषादीको महत्व आवश्यकता र औचित्यको वोध हुनु पर्ने ।
- पञ्जीकृत नभएका विषादीहरू आयात गर्न नहुने ।
- विषादीबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको जानकारी ।
- सुरक्षित नया विषादीहरू आयात गर्दा सर्वप्रथम पञ्जीकरण गराई प्रमाणपत्र लिनु पर्ने ।
- प्रतिष्ठित कम्पनीबाट विषादी आयात गर्नमा प्राथमिकता ।
- कम विषालु तर प्रभावकारी विषादीको आयातमा जोड र सुरक्षित विषादीहरूलाई प्राथमिकता दिनु ।
- गुणस्तरहिन विषादी आयात गर्न नहुने ।

- विदेशी विषादीहरूको पर्चा पम्लेटहरू नेपाली भाषामा तयार गर्नु पर्ने ।
- वनस्पतिजन्य विषादी आयातमा जोड र यी विषादीहरू बिक्री वितरण प्रोत्साहन गर्ने र यसवारे व्यापक जनचेतना उजागर गर्न सहयोग पुऱ्याउने ।
- प्रतिबन्धित विषादीको पूर्ण जानकारी र प्रतिबन्धित विषादीहरू आयात नगर्ने ।
- विषादी पञ्जीकरण प्रमाणपत्र कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्ने ।
- दण्ड सजायको जानकारी ।
- विषादी पैठारी गर्न इजाजत प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायले एक आर्थिक वर्षमा गरेको विषादी, त्यसको परिमाण र मुल्य समेत उल्लेख गरी समितिले तोकिदिएको ढाँचामा प्रत्येक अर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र वा समितिले माग गरेमा सो भन्दा अगावै कार्यालय समक्ष विवरण पेश गर्नु पर्ने छ ।
- विषादी प्रयोग गर्दा आवश्यक सुरक्षाका सामाग्रीलाई प्राथमिकता दिने ।
- स्याद सकिएका विषादीहरूलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नु र सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता पठाउनका लागि पहल गर्नु गराउनु ।
- तुनै विषादी अपभ्रावकारी वा गणस्तरहिन पाएको खण्डमा त्यस्ता उत्पादकको विषादी आयात नगर्नु र सबैतर जानकारी दिनु ।
- विषादी बिक्री वितरणमा आफु पनि सुरक्षित रहनु र सुरक्षित भण्डारण, बिक्री वितरण र ओसार पसार गराउनु ।
- सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धयतात्क भूमिका निर्वाह गरी विषादी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु
- आम उपभोक्तामा विषादी सम्बन्धी जनचेतना जगाउनु, सुरक्षित, समयोचित र न्यायोचित प्रयोग बारेमा चेतना अभिवृद्धि गराउनु ।
- ऐन नियममा भएका कमि कमजोरी बारेमा राय सुझाप दिनु र परिपालनमा कठिनाई भएमा कारण र तथ्य सहित जानकारी गराउनु ।

विषादी व्यवसायी संघको कार्य

- जिल्लाभरिको आयातकर्ता र खुद्रा तथा थोक बिक्रेताको अभिलेख राख्ने ।
- विषादी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।
- जिल्लाभरिको विषादीको खरिद बिक्रीको अभिलेख राख्ने ।
- व्यवसायी र कृषि ज्ञान केन्द्र विचमा विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्ने ।
- विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजतपत्र पसलमा भएको नभएको सम्बन्धमा कडाइका साथ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।
- सुचिकृत विषादीहरू मात्र खरिद/बिक्री गर्ने गराउने ।
- जैविक विषादी उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रलाई विषादी उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने
- गैहू सरकारी संस्था तथा सरकारी निकायमा समन्वय गरी विषादी सम्बन्धी जानकारीमूलक तालिमको संचालन गर्ने । व्यवसायीको हक्क हितको लागि काम गर्ने ।
- आवश्यकतानुसार तालिम तथा गोष्ठिको माग गर्ने ।
- विषादी खुद्राबिक्रेताको अनुगमन र तथ्यांक संकलन गर्ने ।
- विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू उजागर गर्ने ।
- स्याद नाघेका र प्रतिबन्धित विषादीहरूको कारोबार नगर्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नियमित रूपले संचालन गर्ने ।
- विषादी सम्बन्धी ऐन नियम र विषादी व्यवस्थापन जनचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- जीवनाशक विषादी ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार जिल्लास्तरीय विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने र विषादी समिति, उप समिति र विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाको नीति निर्देशनहरू कार्यान्वयन गराउने काममा समन्वय गर्ने ।
- सम्पूर्ण विषादी व्यवसायीहरू र प्रयोगकर्तालाई जीवनाशक विषादी ऐन नियमको पालना गर्ने तर्फ उन्मुख गराउने ।
- प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यविधि (नागरिक वडापत्र) को जानकारी राख्ने ।

विषादी खुद्रा विक्रेता अनुगमन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

- ईजाजतपत्र र नवीकरण ।
- प्रमाणपत्र र तालिम प्राप्त व्यक्ति नै पसलमा बसेको छ वा छैन ।
- विषादी सम्बन्धी जानकारीका विषयहरू पसलमा छ वा छैन प्रतिवन्धित विषादीको सूची, खतरा संकेत, प्रमाणपत्र सबैले देख्ने गरी राख्ने, पर्खनुपर्ने अवधि ।
- भण्डारण कक्ष, विषादी राखेको अवस्था, पसलको अवस्था, आवश्यक सुरक्षात्मक सामाग्रीहरू बारेमा ।
- अन्य व्यवस्थापन, साबुन पानी, वालुवा लगाएका सामाग्रीहरू ।
- पञ्जीकृत विषादी वाहेक अन्य विषादी पनि राखेको छ कि ।

२१. बाली उपचार शिविर

वास्तवमा भन्नुपर्दा मानिस तथा जनावरहरूको रोग एवं समस्याहरूको उपचारको लागि हरेक देशहरूमा अस्पताल तथा किलनिकहरू स्थापना भएको पाइन्छ तर बाली विरुवामा लाने रोग, कीरा र अन्य समस्याहरूको समाधानका लागि त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको पाईदैन । खासमा भन्नुपर्दा बाली विरुवामा रोग, कीरा र अन्य समस्याहरूको कारणहरूले गर्दा बाली उत्पादनमा वर्षेनि १५-२०% सम्म हास भएको पाईदैन । कृषि कार्यालय, तहाँ कार्यरत अधिकृत वा जे.टी./जे.टी.ए. हरूको पहुँचबाट टाढा रहेका कृषकहरूले बाली विरुवाहरूका समस्याहरूको सहि उपचार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् र एग्रोभेट वा छिमेकीको सल्लाह बमोजिम आफ्नो बाली उपचार गर्ने गरेको यथार्थता छ ।

तसर्थ बाली उपचार शिविर एउटा यस्तो थलो हो जहाँ कृषकहरूले आफ्नो बालीमा लागेका रोग, कीरा तथा अन्य समस्याको समस्याग्रस्त बोट विरुवाका नमूना शिविरमा ल्याई बाली उपचार विशेषज्ञहरूबाट समस्या पहिचान तथा समाधानका उपायहरू बारे निशुल्क सल्लाह प्राप्त गर्दछन् । विशेषगरी धेरै जना कृषकहरूको पायकर्पन ठाँउ वा घरदैलोमा नै बाली उपचार विशेषज्ञहरू (Plant Doctor) गएर बाली विरुवाका रोग, कीरा र अन्य समस्याहरूको पहिचान तथा निदान गर्ने भएकाले यसवाट कृषकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गर्दछन् । एउटा परिक्षण तथा सत्य तथ्यमा आधारित गुणस्तरिय एवं भरपर्दो बाली उपचार पद्धतिको आवश्यकता टड्कारो छ जसको समाधान भनेको बाली उपचार शिविर (Plant Clinic) नै हो ।

कृषकको बालीमा रोग, कीरा तथा अन्य समस्याहरूको सहि पहिचान गरी समयमै उपयोगी व्यवस्थापनका उपायहरू दिलाउनु नै यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । जसले गर्दा जथाभावि रसायनिक विषादीको प्रयोगलाई कम गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै बाली विरुवाहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

बाली उपचार शिविरको शुरुवात संयुक्त अधिराज्यबाट सन् २००२ मा भएको हो । बोलिभिया भने पहिलो देश हो जसले यसको प्रारम्भ गर्यो । अहिले आएर बाली उपचार शिविर धेरै देशहरूमा नियमित तथा पाइलट शिविरहरूको रूपमा संचालन भई रहेका छन् ।

बाली उपचार शिविर २ तरिकाबाट संचालन गर्न सकिन्छ :

- १) घुम्ती बाली उपचार शिविर
- २) नियमित बाली उपचार शिविर

यी दुवै शिविरको कार्यविधीमा खासै भिन्नता छैन ।

घुम्ती बाली उपचार शिविर जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बालीनालीमा देखिएका या देखिनसक्ने समस्याको आधारमा घुम्ति रूपमा संचालन गर्ने गरिन्छ भने

नियमित बाली उपचार शिविर निश्चित स्थानमा नियमित रूपमा आवश्यकता अनुसार एक हस्ता वा १५ दिन वा महिनाको १ पटक वा खास बालीहरूको समस्यायुक्त समयमा संचालन गरिन्छ ।

बाली उपचार शिविर संचालन गर्नको लागि नेपाल कृषि सेवा वा अन्य कृषि सङ्ग संबन्धित निकायमा कार्यरत कम्तिमा रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहको पदाधिकारी जसले बाली उपचार शिविर संचालन सम्बन्धी एक हस्त तालिम लिएको व्यक्तिलाई बाली उपचार शिविर विशेषज्ञ भनिन्छ भने कृषि क्षेत्रमा कार्यरत अन्य मध्यम स्तरका प्राविधिकहरूले पनि यस प्रकारको तालिम हासिल गरी बाली उपचार शिविर संचालन गर्न सक्ने छन् ।

२२. बाली उपचार शिविर (Plant Clinic) सम्बन्धी कार्यविधि:

- १) जिल्लाका अन्न, फलफूल, तरकारी र अन्यबालीहरुको पेकेट क्षेत्र लाई समेट्ने गरी समस्या देखिएका क्षेत्र तथा रसायनिक विषादीको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी थेरै भन्दा थेरै कृषकलाई सहभागी बनाउन पाएक पर्ने ठाउँमा बाली उपचार शिविर संचालन गर्नुपर्दछ ।
- २) बाली उपचार शिविर संचालन हुने मिति, स्थान र समयको बारेमा कृषकलाई उपयुक्त माध्यमबाट समय मै जानकारी दिनु पर्नेछ ।
- ३) कृषकले ल्याएको बालीको नम्ना र कृषकसँग लिइएको जानकारीका आधारमा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरु कृषकले बुझ्ने गरी लिखित रूपमा कृषकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उक्त दिन बाली नम्नाको समस्या पहिचान हुन नसकेमा यथासक्य छिटो उपयुक्त निकायमा नमूना पठाई समस्याको पहिचान गराई सम्बन्धित कृषकलाई बाली व्यवस्थापनका उपायहरु सम्बन्धमा यथासक्य छिटो जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- ४) बाली उपचार शिविर संचालन अवधि १ दिनको हुने छ ।
- ५) बाली उपचार मा सहभागी हुने कषकहरूल दैनिक भ्रमण भत्ता, होटल बास खर्च र खाजा खर्च पाउने छैन् साथै यस कार्यक्रममा कृषकबाट शुल्क लिने व्यवस्था हुने छैन ।
- ६) बाली उपचार शिविर बाली उपचार विशेषज्ञ (प्लाण्ट क्लिनिक विशेषज्ञ) वा तालिम प्राप्त प्राविधिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित जिल्लामा बाली उपचार विशेषज्ञ (प्लाण्ट क्लिनिक विशेषज्ञ) नभएमा नजिकका कृषि कार्यालय, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, अनसन्धान केन्द्र, अध्ययन संस्थान वा प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम प्राप्त बाली उपचार विशेषज्ञ (प्लाण्ट क्लिनिक विशेषज्ञ) को सहयोग लिई संचालन गर्न सकिने छ ।
- ७) जिल्लामा अन्य संघ/संस्था/निकायबाट यस प्रकारको बाली उपचार शिविर संचालन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र सँगको समन्वयमा संचालन गर्नु पर्ने छ ।
- ८) बाली उपचार शिविर हुने मिति, समय र स्थान बारे सम्बन्धित प्रादेशिक बाली संरक्षण प्रयोगशाला र बाली संरक्षण निर्देशनालयलाई जानकारी गराएको खण्डमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न सजिलो हुने छ ।
- ९) बाली उपचार शिविर संचालन गरिएका जिल्लाबाट वार्षिक रूपमा शिविर संचालन स्थान, नमूना संकलन गरिएको क्षेत्र, बाली क्षेत्र, देखिएको समस्याहरु र प्रदान गरिएका सुझावहरु उल्लेखित प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रादेशिक बाली संरक्षण प्रयोगशाला हुदै केन्द्रिय निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।

यस बाली उपचार शिविर कार्यक्रम सञ्चालनबाट देहाय बमोजिमका फाईदा हुन्छन्

- १) कृषकका बालीमा देखिएका रोग, कीरा तथा अन्य समस्याको सहि पहिचान गर्ने तुरन्त बालीमा हुने क्षति कम गर्न व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्ने ।
- २) समस्याको सही पहिचान भई सुधारका लागि कृषक स्वयं सक्षम हुने ।
- ३) रासायनिक विषादीको जथाभावि प्रयोगलाई व्यवस्थित गरी बाली उत्पादन लागत घटाउन सकिने ।
- ४) बातावरण संरक्षण तथा मानव स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यस कार्यक्रम प्रभावकारी सिद्ध हुने ।

२३. नेपालमा पञ्जिकृत विषादीहरूको सूची

Insecticide

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
1	Abamectin	30	Fipronil
2	Acephate	31	Flonicamid
3	Acetamiprid	32	Flubendiamide
4	Alphacypermethrin	33	Flumethrin
5	Alphamethrin	34	Fluralaner
6	Aluminium Phosphide	35	Imidacloprid
7	Amitraz	36	Indoxacarb
8	Azamethiphos	37	Lambda cyhalothrin

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
9	Beta-Cyfluthrin	38	Lufenuron
10	Bifenthrin	39	Malathion
11	Buprofezin	40	Nitenpyram
12	Cartap Hydrochloride	41	Novaluron
13	Chlorantraniliprole	42	Permethrin
14	Chlorfenapyr	43	Phenthroate
15	Chlorfluazuron	44	Profenofos
16	Chlorpyrifos	45	Propoxur
17	Cyfluthrin	46	Pymetrozin
18	Cypermethrin	47	Quinalphos
19	Cyromazine	48	Spinosad
20	Dazomet	49	Spinotoram
21	Deltamethrin	50	Spiromesifen
22	Diafenthiduron	51	Spirotetramat
23	Diflubenzuron	52	Temephos
24	Dimethoate	53	Thiacloprid
25	Dinotefuran	54	Thiamethoxam
26	Emamectin benzoate	55	Thiodicarb
27	Ethion	56	Piperonyl Butoxide
28	Etofenprox		
29	Fenvalerate		

Acaricide

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
1	Bifenazate	4	Hexythiazox
2	Fenazaquin	5	Propargite
3	Fenpyroximate		

Nematicide

S.N.	Common Name
1	Fosthiazate

Fungicide

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
1	Ametoctradin	23	Iprovalicarb
2	Azoxystrobin	24	Kasugamycin
3	Captan	25	Kresoxim Methyl
4	Carbendazim	26	Mancozeb
5	Carboxin	27	Metalaxyl
6	Chlorothalonil	28	Metiram

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
7	Copper hydrochloride	29	Meptyldinocap
8	Copper hydroxide	30	Pencycuron
9	Copper oxychloride	31	Propiconazole
10	Cymoxanil	32	Propineb
11	Difenoconazole	33	Sulphur
12	Dimethomorph	34	Tebuconazole
13	Dinocap	35	Thiadiazole - Copper
14	Famoxadone	36	Thifluzamide
15	Fenamidone	37	Thiophanate Methyl
16	Fluazinam	38	Thiram
17	Flusilazole	39	Tricyclazole
18	Flusulphamide	40	Trifloxystrobin
19	Fungous Proteoglycan	41	Validamycin
20	Hexaconazole	42	Zineb
21	Hymexazol		
22	Iprobenfos		

Bactericide

S.N.	Common Name
1	Streptomycin sulphate + Tetracyclin Hydrochloride

Herbicide

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
1	2,4- D Sodium salt	16	Oxadiargyl
2	2,4-D Ethyal Ester	17	Oxyfluorfen
3	Acetochlor	18	Paraquat
4	Ammoium salt of Glyphosate	19	Paraquat dichloride
5	Atrazine	20	Pendimethalin
6	Bensulforun Methyl	21	Penoxsulam
7	Bispyibac sodium	22	Piroxofop- Propanyl
8	Butachlor	23	Pretilachlor
9	Chlorimuron	24	Propaquizafop
10	Clodinafop propargyl	25	Pyrazosulfuron ethyl
11	Glufosinate	26	Quizalofop-ethyl
12	Glyphosate	27	Quizalofop-P-Tefuryl
13	Mesotrione	28	Simetryn
14	Metribuzin	29	Sulfosulfuron Methyl
15	Metsulfuron Methyl	30	Tembotrine

Rodenticide

S.N.	Common Name
1	Bromadiolone
2	Zinc Phosphide

Molluscicide

S.N.	Common Name
1	Metaldehyde

Biopesticide

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
1	Azadirachtin	8	Nuclear Polyhedrosis Virus
2	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D 203	9	<i>Paecilomyces lilacinus</i>
3	<i>Bacillus subtilis</i>	10	<i>Paecilomyces</i> SPP (Nematicide)
4	<i>Bacillus thuringiensis</i>	11	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
5	<i>Beauveria bassiana</i>	12	<i>Trichoderma harzianum</i>
6	<i>Heterorhabditis Indica</i>	13	<i>Trichoderma viride</i>
7	<i>Metarhizium anisopliae</i>	14	<i>Verticillium lecanii</i>

Herbal

S.N.	Common Name	S.N.	Common Name
1	Chitosan	7	Botanical Extract for nematodes
2	30 Ayurvedic Ingredients	8	Botanical Extract for virus
3	Antibacterial & Antifungal Natural Extract	9	Herbal Extract Pest Management
4	Bio - Bactericide & Bio- - Fungicides	10	Multiplex Bio Strake -100%ml
5	Bio - Bactericide & Bio- - Fungicides - 100%	11	Virus Management , Neem leaf Extract
6	Botanical Extract		

२४. विषादी पसलमा भ्रमण गरी प्रयोगात्मक अभ्यास निरीक्षण र छलफलमा ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू

पसलको नाम

ठेगाना

व्यक्तिको योग्यता

तालिम प्राप्त व्यक्तिको नाम

सम्पर्क नं.

१. विषादी पसलमा वस्ते व्यक्तिले तालिम लिए नलिएको ?
२. इजाजत पत्र लिए वा नलिएको ?
३. इजाजत पत्रको म्याद छ, वा नवीकरण गर्नुपर्ने ?
४. सूचीकृत विषादीको लिष्ट राखेको छ, वा छैन ?
५. के के विषादी सूचीकृत छ, भन्ने कसरी जानकारी पाउनुहुन्छ ?
६. के के विषादी प्रतिबन्धित छ, भन्ने कसरी जानकारी पाउनुहुन्छ ?
७. कुनै सूचीकृत नभएका वा प्रतिबन्धित विषादी पसलमा बिक्रीमा छ, कि ?
८. रातो लेभल भएका कुन कुन विषादीहरू छन् ?
९. हरियो लेभल भएका कुन कुन विषादीहरू छन् ?
१०. कुनै जैविक विषादीहरू बिक्री गर्नुहुन्छ ? छन भने के के ?
११. बिक्रीमा वस्ते व्यक्तिले व्यक्तिगत सुरक्षणाका पाहरन लगाउने गरेको छ ?
१२. पहिरन लगाउने गरेको छैन भने किन लगाउने गरेको ?

- १३ व्यक्तिगत सुरक्षणका पहिरन बिक्रीमा छ वा छैन ? १४ पसलमा पानी, साबुन, वेल्चा, काठ वा बालुवा वा माटो, आगो निभाउने उपकरण राखिएको छ ?
- १५ किन नराखिएको ? थाहा नभएर वा अन्य केहि कारण छ ?
- १६ कुनै कारणले विषादी पोखिएमा चुहिएमा वा लिकेज भएमा के गर्नुहुन्छ ?
- १७ म्याद नाघेका विषादी के गर्नुहुन्छ ?
- १८ किसानलाई विषादी प्रयोग भै सके पछि बट्टा वा कार्टुन वा पाउजलाई के गर्न भर्नुहुन्छ ?
- १९ किसानलाई विषादी छर्दा व्यक्तिगत सुरक्षणका पहिरन लगाउन भन्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
- २० पहिला आएको विषादी पहिला बिक्री गर्न वा म्याद कम भएका विषादी पहिला बिक्री गर्नुहुन्छ ?
- २१ विषादी आएको बिक्री भएको रेकर्ड राख्नु हुन्छ ?
- २२ विषादी छर्दा बिहान बेलुका छर्ने र एकै नछर्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
- २३ कुनै कारणले विष लागेमा के गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
- २४ तपाइंको पसलमा फेरोमेन पासो, लाइट ट्राप, भारपात गोड्ने मेशिन राख्नु भएको छ ?
- २५ तपाइंको पसलमा समान किन्ने पुरुष वा महिला को आउनुहुन्छ ? कस्तो विषादी बढी बिक्री हुन्छ ?
- २६ पसलमा बिक्रीमा वसेको अनुभवबाट तपाईंको स्वास्थ्यमा कुनै खराबी आएको महशुस भएको छ ?
- २७ व्यक्तिगत सुरक्षणका पहिरन नलगाएको कारणले हो कि भन्ने महशुस गर्नुभएको छ ? अब लगाउनुहुन्छ ?
- २८ विषादी बाहेक अरु के के बिक्री गर्नु भएको छ ? भेटेनरीका औषधि, बीउ, मलखाद, थोपा सिचाई पनि छ ?
- कक्षामा छलफलका विषयहरू**
- निरीक्षण बाट के के सिक्नु भयो ? पसलका राम्रा पक्षहरू के के थिए ? सुधार्नु पर्ने पक्षहरू के के देख्नुभयो ?
 - विषादी निरीक्षक वा सरकारी कार्यालयको राम्रा पक्षहरू र सुधार्नु पर्ने पक्षहरू के के देख्नुभयो ?
 - कार्यालय बीच (भन्सार र विषादी कार्यालय) आवश्यक समन्वय र सहयोग के कस्तो भएको महसुस गर्नु भयो ? के के भैदिएको भए अभ राम्रो हुने देख्नु भयो ?

२५. बालीमा लाग्ने रोग तथा कीराहरू

रोग (Disease) भनेको के हो ?

- बिरुवाले दुखेको वा असजिलो भएको कुरा न त तिनले व्यक्त गर्न सक्छन् न त कुनै स्रोतबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले रोग लागेको छ भन्ने कुरा यकिन गर्न गाहो हुन्छ। बिरुवा रोगी हो वा होइन सो जान्न तिनले गर्ने सामान्य प्रकृया, लक्षण (आन्तरिक वा बाह्य), चिन्ह वा प्रयोगशाला परिक्षणशालाबाट थाहा पाउन सकिन्छ। रोग बिरुवामा हुने कुनै खराबी हो त्यसैले साधारण बनावट भन्दा फरक (जस्तै जरा, उचाई, गाँज, पात, फूल वा फल), साधारण कार्य नगर्ने (जस्तै नबढने वा मर्ने) र आर्थिक मूल्य (जस्तै उत्पादन घट्ने, कम गुणस्तरको) कम पाइने बनाउँदछ।
- बिरुवामा रोग लागेको छ वा छैन सो जान्न त्यसमा आक्रमण गर्ने जीवाणु वा खाद्य पदार्थको कमिको कारणले भएको हो भन्ने जान्न त्यसका बाह्य चिन्ह र अवस्था अनुसारको लक्षणहरूको आधारले छुट्ट्याउन सकिन्छ। रोग जीवाणु, वातावरण र बिरुवाको अन्तर सम्बन्धको परिणाम हो।
- रोगको प्रकार दशौं हजार प्रकारका रोगहरूले खेती गरिएका वा जड्गली बिरुवामा आक्रमण गर्दछन्। औषतमा प्रत्येक बाली बिरुवामा १०० वा सोभन्दा बढी रोगले आक्रमण गर्न सक्दछन्। केही रोगले एउटा मात्र प्रजातिको बिरुवामा आक्रमण गर्दछन् भने केहीले धेरैमा गर्दछन्। बिरुवामा लाग्ने रोगलाई तिनीहरूमा देखिने लक्षणको आधारमा (जरा सडाउने, ओइलाउने, पातमा चिन्ह, डुब्बा, सिन्दूरे, कालोपोके), बिरुवाको भागमा (जरा, डाँठ, पात, फल), अथवा बिरुवाको प्रकार (खेतमा लगाउने बाली, खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, खेल मैदानमा लगाउने दुबोमा लाग्ने रोग) भनी बाँडन सकिन्छ।
- रोगहरूलाई बिरुवामा आक्रमण गर्न जीवाणुको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै दुसी, व्याक्टेरिया, मोलिक्यूट्स, परजीवी बिरुवा, भाइरस र नेमाटोडबाट हुने रोग। यिनै जीवाणुको कारणले रोगको विकास हुने, फैलन र व्यवस्थापन गर्न अपनाउने उपायहरू के के हुन्छन् भन्ने सुझाव दिन सकिन्छ। यसैको आधारमा बिरुवामा आक्रमण गर्ने रोगहरूलाई तपसिल अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बिरुवामा रोग ल्याउने कारक तत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलदछन् र यिनीहरूलाई मुख्यतः २ समुहमा बाँडन सकिन्छ।

१. जीवित तत्व वा जीवाणुबाट हुने रोगहरू (Living or biotic factors) : रोगकाजीवाणु विरुवा भित्र पस्न सक्ने, वृद्धि हुने र विभिन्न भागमा फैलने वा अन्य विरुवामा सर्व क्षमताका हुन्छन् ।
- (क) दुसीबाटहुने रोगहरू
 - (ख) व्याक्टेरिया र मोलिक्यूट्सबाटहुने रोगहरू
 - (ग) परजीवी विरुवा र ग्रीन अलीबाटहुने रोगहरू
 - (घ) भाइरस र भिन्नाइड्सबाटहुने रोगहरू
 - (छ) नेमाटोडबाटहुने रोगहरू
२. निर्जिव तत्व (Non-living or abiotic factors) : हावापानी, सूर्यको प्रकाश, तापक्रम, हावा, चिस्यान, वर्षा, रसायनिक पदार्थ, खाद्यतत्वको कमिको कारणले नसर्वे रोग देखिने हुन्छ ।
- (क) कम वा बढी तापक्रमबाट हुने रोगहरू : बढी तापक्रममा व्याक्टेरिया रोगहरू चाडै बढ्दछन् । दुसी रोगहरू फरक फरक तापक्रममा घट्ने वा बढ्ने हुन्छन् ।
 - (ख) कम वा बढी चिस्यानबाट हुने रोगहरू : बढी चिस्यानमा धेरैजसो दुसी रोगका जीवाणुले आक्रमण गर्न सक्ने, व्याक्टेरियाको प्रकोप बढ्ने र नेमाटोड पनि फैलने हुन्छन् ।
 - (ग) कम वा बढीसूर्यको प्रकाशबाटहुने रोगहरू
 - (घ) अविसज्जनको कमीलेहुने रोगहरू
 - (छ) प्रदूषित हावालेहुने रोगहरू : कडा हावाले दुसीका कण वा बीज, भाइरसका सार्वे कीरा फैलन, हाँगा भाँचिएका, विरुवा उखेल्दा वा गोडमेल गर्दा चोटपटक लागेका ठाउँबाट व्याक्टेरिया पस्न सक्दछन् । मन्द हावामा कीराहरूको हिडुलमा महत पुगदछ ।
 - (च) खाद्यतत्वको कमीले हुने रोगहरू
 - (छ) खनिजतत्वको विषाक्तले हुने रोगहरू
 - (ज) माटोको पी.एच. को कारणले हुने रोगहरू
 - (झ) विषादीको विषाक्तले हुने रोगहरू
 - (ञ) अनुपयुक्त तरिकाले गरिएको कृषि कर्महरूले उत्पन्न हुने रोगहरू
 - (ञ) दुसी, व्याक्टेरिया र मोलिक्यूट्स, भाइरस र नेमाटोडलाई भनिन्छ ?

दुसी (Fungus)

दुसी आँखाल देख्न नसकिने बाहिरी भाग कडा र न्यूक्लियस भएका शुक्ष्म जीवहरू हुन् । साधारणतया यिनीहरू त्यान्द्राहरू आकारका, हाँगादार, बीज उत्पादन गर्ने, हरितकण नभएका हुन्छन् । १०००० भन्दा बढी प्रजातिका दुसीहरू सडेगलेका पदार्थमा पाइन्छन् । करिब ५० प्रजातिहरूले मानिसमा रोग ल्याउने र सोभन्दा बढीले जनावरका छाला र हात खुट्टामा आक्रमण गर्दछन् । १०००० भन्दा बढी प्रजातिका दुसीहरूले विरुवामा विभिन्न रोगहरू ल्याउँदछन् । केही न केही दुसीहरूले विरुवामा रोगहरू ल्याउँदछन् । सबै विरुवामा केही न केही दुसीहरूले आक्रमण गर्दछन् । तिनीहरू सबै परजीवी भएर एक वा अनेकौंविरुवामा आक्रमण गर्दछन् । यिनीहरू मध्ये केही जीव परजीवी भएर हुर्कने र वृद्धि हुने गर्दछन् । कुनै दुसी कहिले जीवित कहिले निर्जिवमा रहेर वृद्धि हुने र जीवन चक्र पूरा गर्ने गर्दछन् ।

लक्षणहरू

- बिरुवामा दुसीबाट हुने रोगका लक्षणहरू बाली र दुसीका प्रजाति अनुसार लक्षणहरू फरक फरक हुन्छन् ।
 - केही उठेका जस्ता धब्बाहरू देखिन्छ
 - रोगको वृद्धि सँगै धब्बाहरू जोडिन्छन् र पात डडेर जान्छ
 - पातको सतहमा आँखाले सजिले देख्न सकिने कपासका त्यान जस्ता मसिना भुवादार दुसीहरू हुन्
 - लक्षण बढ्दै गएमा डाँठहरूमा र फलमा आक्रमण गरी खैरो र कालो दागहरू बढ्दै जान्छन् र अन्त्यम छिटै पुरै बोटहरूलाई डढाएर मारिदिन्छन्
 - रोगको वृद्धि र फैलने उपयुक्त वातावरण
- क) रोगी बीउबाट : बीउ रोगी भएमा रोग लागेको क्षेत्रबाट कुनै स्वस्थ ठाउँमा फैलिदै जान्छ ।
- ख) रोगी माटोबाट

व्यवस्थापन

- बढी पानी र आद्र अवस्थामा रोग विस्तारको लागि अनुकूल हुने हुँदा सो समय छ्लि रोप्ने
- स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने
- कोर्नेन्डाजिएम २-३ ग्राम प्रति किलोग्राम बीउका दरले बीउ उपचार गरी व्याड राख्ने ।
- सिफारिस बमोजिमको मलखाद राख्ने
- घना बिरुवा नराख्ने र पातको माथि पानी नजम्ने गरी सिंचाई दिने
- खेतको सरसफाई गर्ने
- रोगी पातहरू विहानी पछ हटाएर नष्ट गर्ने
- म्याकोजेव विषादी २ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले बोट भिज्ने गरी छर्ने
- रोग धेरै बढेमा प्राविधिकको सल्लाहमा उपयुक्त विषादीको छनौट गरी प्रयोग गर्ने

व्याक्टेरिया (Bacteria)

व्याक्टेरिया र मोलिक्यूल्ट्स एक कोषिय शुक्ष्म जीव (Prokaryotes) हरू हुन् जसको वंशानुगत गुण सार्व पदार्थ (DNA) लाई फिल्मी (Cell membrane)ले ढाकेको हुँदैन । यिनीहरूको कोष DNA भएको साइटोप्लाज्मा र सानो राइबोजोम हुन्छ । यिनीहरू रड आकारका, चेप्टा, तारजस्ता बटारिएका, वा धागोजस्ता हुन्छन् ।

कठिपय व्याक्टेरिया र मोलिक्यूल्ट्सले विरुवामा रोग ल्याउँदछन् । हालसम्म करिब १६०० व्याक्टेरियाका प्रजातिहरू पत्ता लागेका छन् । यिनीहरू छोटो समयमा नै उपयुक्त तापक्रम र वातावरणमा असंख्य संख्यामा वृद्धि गर्ने हुन्छन् । आद्रता र गर्मी हुने उण्ण प्रदेशमा हेरेक टाउँका विभिन्न विरुवामा यिनले आक्रमण गर्न सक्ने तर उपयुक्त तापक्रम र वातावरण भएमा जुनसुकै ठाउँमा पनि आक्रमण गर्न सक्ने हुन्छन् । विरुवामा आक्रमण गर्ने व्याक्टेरियालाई विशेषत Agrobacterium, Clavibacter (Corynebacterium), Erwinia, Pseudomonas, Ralstonia, Streptomyces, Xanthomonas, Xylella प्रजातिमा बाँडिएको छ ।

विरुवामा व्याक्टेरियाबाट हुने रोगका लक्षणहरू

- शुरुको अवस्थामा विरुवा आंशिक रूपमा ओइलाउँदछ । यस्ता विरुवाहरू घाम लागेको बेलामा ओइलाउने र घाम अस्ताए पछि स्वस्थ जस्ता देखिन्छन् ।
- विस्तारै सम्पूर्ण बोट नै स्थायी रूपमा ओइलाएर जान्छ ।
- यो रोगको सजिलो पहिचानको लागि अन्दाजी ४-५ ईन्च लामो ढाँठको टुक्रा (जमीनको संगैको भाग) या आलुको टुक्रालाई सफा पानी भएको काँचको गिलासको सतहमा झुण्ड्याएर राखेमा केही समयमा नै दूध जस्तो सेतो लाइन बनेर गिलासको पिंध तर्फ झरेको देखिन्छ ।

रोगको वृद्धि र फैलने उपयुक्त वातावरण

- क) रोगी बीउबाट : बीउ रोगी भएमा रोग लागेको क्षेत्रबाट कुनैस्वस्थ ठाउँमा फैलिदै जान्छ ।
- ख) रोगी माटोबाट : रोगी बीउबाट यस रोगको जीवाणुहरू माटोमा प्रवेश गर्दछन् । जीवाणु माटोमा बाँच सक्ने अवधि तापक्रम, आद्रता, लगाइने बाली एवं माटोको भौतिक तथा रसायनिक गुणमा निर्भर गर्दछ । रोगी माटाले रोग फैलाउने प्रमुख भूमिका खेल्दछ ।
- ग) कृषि औजार : हलो, कोदालो, कुटो आदि र गाईबस्तुको खट्टामा तथा मान्छेको गोडामा रोगी जमीनको माटो टाँसिएर जाँदा अन्य स्वस्थ ठाउँमा पनि रोग फैलिन सक्दछ ।
- घ) सिंचाईको पानी : रोगी खेतबारीमा सिंचाई गर्ने क्रममा पानी अन्यत्र बगेर जाँदा पानीको माध्यमबाट पनि यो रोग अन्य स्वस्थ आलु खेतमा फैलिने सम्भावना हुन्छ ।

व्यवस्थापन

- स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने :
- आगो बाल्ने : यो रोग लागेको जमिनमा बाली टिपिसकेपछि करिब ५०-६० से.मी. को फरकमा २० से.मी. गहिराइका क्लेसो बनाई त्यसमा सुकेका भारपात, पराल वा पतिङ्गरहरू जम्मा गरेर आगो बालेमा उच्च तापक्रमले गर्दा रोगका जीवाणुहरू मर्न गई यस रोगको धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ ।

- बाली चक्र अपनाउने : प्रत्येक वर्ष एके ठाउँमा लगातार एउटै बाली मात्र नलगाइ एक वर्ष बिराएर लगाउने र बाली चक्रमा धान, मकै, कोदो, गहुँ, तोरी जस्ता बालीहरू समावेस गर्ने । सिंगो बीउ आलुको प्रयोग गर्ने : बीउ आलु लगाउँदा नकाटी लगाउनु पर्छ जस्ते गर्दा एउटा दानाबाट अर्कोमा रोग सर्न पाउँदैन ।
- सिंचाइ गर्दा ध्यान पुऱ्याउने: सिंचाइ गर्दा रोग ग्रस्त खेतबाट अन्य स्वस्थ खेतबारीमा पार्नी जान दिनु हुँदैन ।
- रोग अवरोधक जातको छनौट गर्ने
- सामुहिक रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- बीउको उपचार : ०.०२ प्रतिशत स्टेप्टोसाइक्लिनको भोलमा ३० मिनेट सम्म डुबाई उपचार गरी लगाउनाले केहि मात्रामा रोग कम गराउनमा मद्दत गर्दछ ।
- जैविक नियन्त्रण : स्युडोमोनास शाकाणूकै अन्य प्रजातिहरू (Species) जस्तै Pseudomonas cepacia, P. fluroescence, Psudomonas.gladioli / Bacillus

भाइरस (Virus)

एक प्रोटीन (Nucleo protein) हो जो जीवीत जीवको कौषमा रहेर रोग ल्याउन सक्छ । तिनमा न्यूक्लिक एसिड र प्रोटीन हुन्छ । न्यूक्लिक एसिडलाई प्रोटीनले बाहिरबाट घेरेर सुरक्षित राख्दछ । यी ज्यादै शुक्रम हुनाले साधारण शुक्रमर्दशन यन्त्रले देख्न सकिन्न । यिनीहरू विभिन्न आकारका विशेषगरी रड आकारका, पॉलिहेड्रल (Polyhedral) वा यी दुई भन्दा फरक बनावटका पनि हुन्छन् । प्रत्येक DNA वा RNA कुनै एक मात्र हुन्छन् । बिरुवामा आक्रमण गर्ने भाइरसमा यीमध्ये एक प्रोटीन हुन्छ । केहि भाइरस कहिलेकाही यी भन्दा फरक प्रोटीन भएका हुन्छन् ।

हालसम्म करिब २००० प्रकारका भाइरसले बोट बिरुवामा आक्रमण गरेर रोग ल्याएको छ र महिनौ जस्तो नयाँ भाइरस पत्ता लगाइएको छ । आधाजसो भाइरसले बिरुवामा आक्रमण गरेको पाइएको छ । एक भाइरसले एक वा दर्जनौ प्रकारका प्रजातिका बिरुवामा आक्रमण गर्न सक्छन वा एक बिरुवामा विभिन्न भाइरसले एकै पटक पनि आक्रमण गर्न सक्छन ।

भाइरस सर्ने माध्यम तपसिलका यी माध्यमहरूबाट भाइरस रोगीबाटस्थ बिरुवामा सर्न सक्छन ।

१.	बिरुवाको वृद्धि हुने भाग प्रसारण (Vegetative propagation) बाट जस्तै ग्राफटिङ, कटिङ, बिडिङ, दाना, केसा, पोटी, डल्ला, जरा ।
२.	बिरुवाबाट निस्कने पदार्थ कुनै यन्त्र, उपकरण, हात वा कपडाबाट (Mechanical transmision through sap)
३.	बीउ (Seed)
४.	पराग (Pollen)
५.	चपाएर वा नुसेर खाने कीराहरू (Insects) जस्तै लाही, पातका फड्के, साइला, रुखका फड्के, हरियोफड्के, सेतो झिङ्गा, चुसाहा, खपटे, मिलिबग, थिप्स, फट्याङ्गा ।
६.	सुलसुले (Mites)
७.	नेमाटोड (Nematode)
८.	दुर्सी (Fungus)
९.	अमरलता वा जनै लहरो (Dodder)

तरकारी बालीमा लाग्ने भाइरस रोगहरू

लक्षण	रोकथाम
पात दोब्रिने, गुज्मुज्ज हुने, मोज्याक, पुङ्को आदि लक्षणहरू देखा पर्द्धन ।	भाइरस रोग नलाग्ने जात प्रयोग गर्ने भाइरस संक्रमित बोट हटाउने भाइरस रोग कीराबाट पनि सारिने भएको हुँदा रोगर कीटनासक विषादि १.५ मि.लि. प्रति लि पानीमा मिसाई २-३ पटक छर्नु पर्छ ।

नेमाटोड (Nematode)

नेमाटोड एनिमेलिया (Animalia) वर्गमा पर्ने जुका वा धागाजस्ता पारदर्शी शरिर भएका शुक्रम जीव हुन । यिनीहरू साधारणतया

३००-१००० माइक्रोमिटरका, केही ४ मिलीमिटर लामा, १३-१५ माइक्रोमिटर चौड़ा हुन्छन्। अनुभवीले कुनै कुनै नेमाटोडलाईत नाङ्गो आँखाले पनि देख्न सक्छन्। बिरुवामा आकमण गर्ने नेमाटोडको संख्या वृद्धि समागम भएको पोथी वा कैयौ प्रजातिमा पोथी एकलबाट मात्र पनि हुने गर्दछ। खानेकुरा प्रशस्त पाइएको अवस्थामा बंश वृद्धि हुने गर्दछ। अण्डाबाट चार जुभेनाइल (Juvenile) पार गरी माउ बन्ने यिनको जीवन चक्र ४ हप्तामा पुरा हुन्छ। तेश्रो र चौथो जुभेनाइलर पोथी माउले मात्र नोक्सानी गर्ने गर्दछन्। यिनीहरूले बिरुवाको जरा, पात, आँकुरा (Bud) वा बीउ भित्र बसेर वा माटोमा जरा बाहिर वरिपरी रहेर आकमण गर्दछन्।

बर्षेनी यिनीहरूका कारणले विश्वमा खाद्यान्न, कोसेबाली, केरा, सिमल तरुल, नरिवल, आलु, प्याज, चुकन्दर, तरुलमा करिब ११ % तरकारी, फलफूल र नखाने बालीमा १४% जति नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

फैलने वातावरण

बिरुवामा नोक्सानी गर्ने सबैजसो नेमाटोड माटोमा नै बस्दछन्। माटोको तापक्रम, चिस्यान र हावाले तिनीहरूलाई हिडडुल गर्न र बाँच्न असर पार्दछ। नेमाटोड जमिनको सतहदेखि १५-३० से.मी. सम्मको गहिराइमा बढी पाइन्छन्। नेमाटोड पानीको सहायता र आफै बलबुताले माटोमा यत्रतत्र हिड्दछन् र फैलन्छन्। यिनीहरू एक सिजनमा केही मिटर टाढासम्म मात्र फैलन सक्छन्। माटोका कण, कृषि उपकरण, सिचाई, आकाश वा निकासको पानी, बाढी, नर्सरीका बिरुवा, जनावरको खुट्टा, चरा, कीरा, हावाले उडाएको धूलोबाट एक ठाउँबाट टाढा टाढासम्म जान सक्छन्। केही नेमाटोड वर्षाको पानीको छिटा वा माथिबाट पानी राख्दा जमिनमाथिको भागमा आकमण गर्न सक्छन् र माथि भनिएको भन्दा फरक रूपले फैलन सक्छन्। केही प्रजाति धान र सल्लाको पात (*Aphelenocoides besssi & Bursaphalenchus*) वा गहुँको दानामा (*Anguina tritici*) आफ्नै बलले पुर्दछन्।

जरामा गाठो हुने (Root knot nematode) लक्षण:

बिरुवा पुड्को, ओइलाए जस्तो देखिन्छ। जरामा विभिन्न आकारका गाँठाहरू पाइन्छन्।



रोकथाम:


- सयपत्रीसँग बाली चक्र अपनाउने सयपत्रीसँग अन्तरबाली लगाउने
- रोप्नुअघि माटोमा तोरीको वा नीमको पीना दुई टन/हे को दरले प्रयोग गर्ने
- नेमागोन धुवाउने, विष माटोमा प्रयोग गर्ने।

बालीमा लाग्ने रोगका केही उदाहरणहरू

क्र.सं.	रोगको नाम	जिवाणु	लक्षण
१.	धानको मरुवा रोग	दुसी	पातमा आँख्लामा र अन्य भागमा लाम्चो दाग वा थोप्ला देखिन्छन्। आँख्ला आकमण भएमा सजिलै भाँचिन्छ।
२.	फेद कुहिने रोग	दुसी	खेतमा रोगी बिरुवा अग्लो नहुने, पहेलिने र अन्तमा फेद कुहिएर मर्दछन् तल्लो आँख्लाहरूबाट जरा निस्कन्छन्।
३.	आलु/टमाटरको पछौटे डढुवा रोग	दुसी	शुरुशुरुमा तल्लो पातका किनारमा वा टुप्पापा ससना पानीलको थोपाले कपडा भिजे जस्तो दाग देखा पर्दछन् जुन हल्का हरियो रंग हुन्छ र केही दिन भित्रै यी दागहरू खैरो वा हल्का कालो रंगमा बदलिएर जान्नन।
४.	ओइले वा खैरो पिपचक्के रोग (आलु, गोलभेडा, खुर्सानी, भण्टा आदि)	व्याक्टेरिया	यो रोग लागेपछि शुरुको अवस्थामा बिरुवा आशिक रूपमा ओइलाउँदछ। यस्ता बिरुवाहरू घाम लागेको बेलामा ओइलाउने र घाम अस्ताए पछि स्वस्थ जस्ता देखिन्छन्। विस्तारै सम्पूर्ण बोट नै स्थायी रूपमा ओइलाएर जान्छ।
५.	जरामा गाठापेन्नरोग (Root knot (Meloidogyne spp))	नेमाटोड	रोगी बिरुवा हुन्छ, बोट पहेलिन्छ, जरामा गाँठोरगिखा हुन्छ
६.	टमाटर मोजाइक भाइरस	भाइरस	पात दोब्रिने, गुज्मुज्ज हुने, मोज्याक, पुड्को आदि लक्षणहरू देखा पर्दछन्।

खाद्य तत्वको कमिले बोट विरुद्धामा देखिने लक्षण आधारमा कुन खाद्य तत्वको कमि हो सो पहिचान तालिका

क्र.स.	खाद्य तत्व	लक्षण	चित्र
१.	नाइट्रोजन- Nitrogen	तल्ला पातहरु पहिलिने र छिट्टै पात झर्ने र मथिल्ला पातहरु सामान्यत हरिया नै रहन्छन् जबसम्म अति प्रभावित हुँदैनन् ।	
२.	फस्फेट- Phosphorous	मथिल्ला पातहरु गाढा हरियो तथा बैजनी रङ्गको, तल्ला पातहरु गाढा हरियो र चामक विहिन तथा नीलो हरियो धब्बाहरु देखिन्छ । पातका नसा गाढा हरियो रहन्छ ।	 Purpleling in maize leaf
३.	पोटासियम- Potassium	मथिल्ला पातहरु सामान्यत स्वस्थकर जस्तै देखिने तर तल्ला पातहरुको रङ्गहरु हल्ला फिका रङ्ग तथा पातको किनार पहेलो तथा डडेकोजस्ता विरुद्धामा टुप्पो पहेलो हुने ।	 Maize showing signs of potassium deficiency.
४.	म्याग्नेसियम- Magnesium	लक्षण मथिल्ला पातहरुमा देखिदैन तल्ला पातहरुमा देखिन्छ । तल्ला पातहरु हल्का कास्य रङ्ग (Broozing)मा परिणत हुने, पातका मुख्य नसाको नजिक हरियो रहन्छ भने अन्तर नसाको क्षेत्र पहेलो वा असामान्य रहन्छ तथा पात अनियमित (necrosis) हुने र झर्ने ।	
५.	म्याङ्गानिज- Manganese	मथिल्ला पातहरु पहेलिन्छ तर पातका नसा हरिया रहन्छन् भने नसाको विचमा सेतो धब्बाहरु देखिन्छ ।	
६.	फलाम-Iron	लक्षण मथिल्ला पातहरुमा देखिन्छ । पातको आधार(leaf base) मा पहेलो देखिन्छ र बाँकी भागमा भने हरियो देखिन्छ । म्याङ्गानिज कमिका झौपातका नसा हरिया रहन्छन् तर यसमा म्याङ्गानिज कमिमा भन्दा अझ स्पष्ट फरक देखिन्छ भने अन्तर नसाको क्षेत्र स्पष्ट रूपमा पहेलो पृष्ठभुमिमा हरियो जालो झै देखिन्छ ।	<p style="text-align: center;">Fe-deficiency symptoms (younger leaves of lemon)</p> 

क्र.सं.	खाद्य तत्व	लक्षण	चित्र
७.	जस्तो-Zinc	मध्यम स्तरले परिपक्व पातमा लक्षण देखिन्छ र प्राय विरुवाको शुरुको बृद्धि अवस्थामा लक्षण देखिन्छ। पातका नसा स्पष्ट हरिया रहन्छन भने अन्तर नसाको क्षेत्र पहेलो वा फिक्का डडेको जस्तो देखिन्छ। पातको किनारा कहिले काही खुम्चिएको वा तरङ्गित जस्तो देखिने ।	 Khaira disease in rice(धानको खैरे रोग)
८.	गन्धक-Sulphur	मथिल्ला र तल्ला पातहरूलाई प्रभाव पार्दछ। यदाकदा कलिला पातहरूमा पनि बढी नोकसानी देखिन्छ। विरुवाको टुप्पो पहेलो हुने। अन्तर नसाको क्षेत्र पहेलो हुने।	
९.	क्यालसियम- Calcium	मथिल्ला पातहरू प्राय राम्रो सँग फक्न सक्दैन। विरुवाको टुप्पो कालो र पुडको हुनु। खास गरेर टमाटरमा फल कुहिने समस्या (Blossom End Rot) देखिने ।	 Blossom End Rot in tomato
१०.	बोरोन-Boron	काउलीको काण्ड खोको हुने तथा कुहिने खासगरी ब्रासिका परिवारका ।	 Hollow stem in cauliflower
११.	तामा-Copper	मथिल्ला पातहरू साना र विरुप तथा गाडा हरियो हुन सक्छन विरुवाको हाँगा ओइलाउने र टुप्पोबाट मर्ने। अन्नबालीमा मुनाहरू सेता देखिनु ।	
१२.	मलिब्डेनम- Molybdenum	पात कप जस्तो हुने वा भित्र पट्टी दोब्रीने ब्रासिकामा हीपटेल देखिने ।	 whip tail in cauliflower

२६. बालीमा लाग्ने मुख्य हानिकारक कीराहरू र तिनको व्यवस्थापन

१. माटोमा बसी हानी पुर्याउने कीराहरू

- रातो कमिला
- खुम्रे
- फेद कटुवा

क्षतिको प्रकार :

बिरुवा आईलाउने, बिरुवा ढल्ने, पात छिया छिया पर्ने (वयस्क अवस्था)

व्यवस्थापन:

काँचो गोबर प्रयोग नगर्ने

२. बोटैमा बसी क्षति गर्ने

लाही

क्षतिको प्रकार पातमा कालो दुसी पत्र, कमिला घुमिरहनु

रोकथाम

२, ७, ९, १३, थोप्ले खपटेहरू र तिनको बच्चालाई संरक्षण गर्ने

दैहिक विषादीहरू (०.०२% भोल) छर्ने

वन्दाको सेतो पुतली

क्षतिको प्रकार- पातको नसा र उपनसा मात्र बाँकी, पातमा प्वालै प्वाल ईट बुट्टे पुतली

क्षतिको प्रकार- पातमा विभिन्न आकारका प्वालहरू देखिन्छन

सूर्तिको पात खाने लार्भे

क्षतिको प्रकार : पातको सम्पूर्ण हरियो भाग खान्छ, पातको तल्लो सतहमा बसी क्षति पुर्याउछन् डल्लो परिसकेको वन्दाकोभी समेत नष्ट गर्दछन् गोलभेडाको फलमा लाग्ने गबारो

अचल अवस्था माटोमा

क्षतिको प्रकार - पात खान्छन्, फल छेडेर खान्छन् थोप्ले खपटेहरू

क्षतिको प्रकार- लाख्ने र वयस्क दुवैले पातको हरियो भाग कोत्रैर खान्छन् फल कुहाउने भीगो

अचल अवस्था माटोभिन्न

क्षतिको प्रकार - फूलबाट मसिना औसा निस्की भित्र भित्रै खान थाल्छन्, फल कुहिने

यो भीगाको भालेलाई क्यु-लुर नामक पदार्थको पासो थापी तिनको गतिविधि अध्ययन गर्ने ।

सेतो झिंगा

क्षतिको प्रकार - माउ र वच्चा दुवैले पातको तल्लो भागबाट रस चुस्दछन्, वरुवा ओइलाउने

दैहिक रासायनिक विषादी

कीराहरूको र तिनीहरूको क्षति प्रवृत्ति

चपाउने र चाटने कीराहरूको क्षति: पूरे पातमा मुख्य नसा छोडी जस्तै: पुतलीका लार्भा, फटेंग्रा पातको किनारामा निश्चित भागमात्र खाने जस्तै: घुनहरू

पातको तल र माथिको सतहको बीचमा नोक्सानी गर्ने जस्तै: घुनहरू लिफ माइनर

हागा वा फेदमा वरिपरिवाट सुरुग बनाएर नोक्सानी गर्ने जस्तै: घुनहरू घुन, खपटे

पातको सतहमा छिया छिया पार्ने र अस्तिपन्नजर जस्तो बनाउने जस्तै खपटेको लार्भा, चिप्ले तथा शखे कीरा पात बेरेर त्यस भित्र बसी नोक्सानी गर्ने जस्तै-पात बिरुवाहरू

वोका काण्ड भित्र पसी नोक्सानी गर्ने जस्तै: गबारो

जरा काट्ने जस्तै-खुम्रे, जराको घुन

चुस्ने कीराहरूको क्षति :

रस चुसी धब्बाहरू बनाउने जस्तै -लाही, पातको फड्के, पतेरो, सुलसुले

पात वटारिने कक्रिकिने : जस्तै- लाही

बोट कमजोर रोगी बनाउने : जस्तै-सिल्ला, मिलिवग, कत्त्वे

पात डाँठ विकृत बनाउने : जस्तै-लाही

गाठा बनाउने, सुन्निने : जस्तै-लाही, झिंगा, वारुला, घुन

पात डाठमा विभिन्न आकृति विकास हुने विकृत बनाउने : जस्तै-लाही

पात, हागा जलाउने : जस्तै-फड्के, सिका

जरा, डाठ, हागा रंग परिवर्तन, वृद्धि रोकिने, टुप्पावाट मर्दै जाने जस्तै: कत्त्वे मिलिवग

२७. विषादी प्रयोग पछि र म्याद नाघेका विषादीको व्यवस्थापन

विश्वमा विषादीको खपत करिब २० लाख मे टन हुने र त्यसमा ४५५ यूरोप, २५५ यू एस, २५५, भारतले ३.७५५, र बाँकी अन्य देशले गर्दछन् ।

जस्मा ४७.५५ भारतानाशक, २९.५५ कीटनाशक, १७.५५ दुसीनाशक र ५.५५ अन्य पर्दछन् ।

विश्वमा करिब २६ मिलियन मानिसहरूमा वर्षेनी विषादीको असर पर्ने र जस्मा करिब २.२ मिलियन मर्ने गरेका पाइन्छन् ।

विश्वका विभिन्न देशमा म्याद नाघेका करिब ५ लाख मे. टन विषादी रहेको अनुमान छ, (FAO website_

म्याद नाघेका विषादीको विसर्जन गर्न ३००० देखि ५००० अमेरिकी डलर प्रति मे. टन लागदछ -FAO, 1995_

FAO र अन्य संस्थाले विषादी विसर्जन सम्बन्धी तयार गरेको माप दण्ड अनुसार गर्नु पर्दछ

पसलमा विषादीको व्यवस्थापन

- विषादी बच्चाको पहुँचमा नराख्ने, सुरक्षित हुने राख्ने
- पहिला आएको र म्याद कम भएको विषादी पहिला बिक्री गर्ने गरी राख्ने
- म्याद सकिएको विषादी सुरक्षित भण्डारण गर्ने भण्डारण गरिने डममा के कति के राखिएको छ, विवरण बाहिर टाँस्ने, म्याद सकिएको विषादी उत्पादकले नै फिर्ता लैजानपहल गर्ने, पहिला म्याद सकिएको पहिला नै विसर्जन गर्ने सुरक्षित पहिरन, काठको धुलो, साबुन, पानी, बालुवा, बेल्वा र आगो निभाउने उपकरण पसलमा सधै राख्ने ।
- कारणवश विषादी पोखिएमा वा चुहिएमा काठको धुलो, बालुवा, माटो राखी सफा गर्ने र सुरक्षित विसर्जन गर्ने ।
- पोखिएको विषादी कपडाले पुछ्दा चुना र ब्लिचिङ्ग पाउडर मिसाएर पुछ्न सकिन्छ । सफा गरिसकेपछि साबुन पानीले हात राम्रोसँग धुनु पर्दछ ।



म्याद नाघेका विषादीको उपयुक्त विसर्जन कसरी गर्ने ?

- लेबल राम्री पढ्ने र त्यसमा लेखिए अनुसार भण्डारण, प्रयोग र विसर्जन गर्ने विषादीको पूर्ण विवरण सहितको रेकर्ड राख्ने ।
- विषादी सुरक्षित राखिएको विश्वास दिलाउनुहोस् ।
- आफुले खपत गराउन सक्ने वा प्रयोग गरिने परिमाणको विषादी मात्र खरिद गर्ने यो नै उत्तम उपाय हो ।
- विषादीको कुनै पनि भाँडा, बटा वा प्याकेट आयोगमा जलाउनु हुँदैन त्यसले वातावरण प्रदुषण हुन जान्छ ।
- बटाहरू कुच्च्याउने,
- धुलो विषादीलाई केहि गहिराइमा गाडेर त्यसमा चुनाराख्ने र पुरिदिने ।

तरकारी र फलफूलको विषादीको अवशेष घटाउने उपायहरू

यदी त्यो वस्तु खान योग्य छैन भने त्यो खाचान होइन "If it is not safe it is not food" CODEX Alimentarius ।
विषादीले हुने रोगहरू (उद्धारण)

विषादी	रोग ल्याउने सम्भावना
Glyphosate (State of California July of 2017)	क्यान्सर र नशा सम्बन्धी रोग
Chlorpyrifos	बच्चाको दिमाग नष्ट गराउने
विभिन्न खाले विषादीको सम्पर्कको कारणले देखिने रोगहरू	Cancer and diabetes Neurodegenerative diseases (Parkinsons, Alzheimers), and ALS birth defects and reproductive disorders, Asthma, COPD, and more

<http://www.academyofwellness.com/washing-vegetables-to-remove-pesticides.html>

२८. तरकारी र फलफूलमा रासायनिक विषादीको अवशेष कम गर्ने उपायहरू

हामीले विरुवामा छ्रेको विषादी भागबाट भित्र पर्दछ, उडेर जान्छ, पानीले पखाल्छ, विरुवाको छ्रेको एक भागबाट अर्को भागमा पुगदछ, धामले विखण्डन गर्दछ र शुक्ष्म जीवले विखण्डन गर्दछ । विषादीको रासायनिक संरचना, विषादी छ्रेने स्थान, विरुवा र विरुवाको वृद्धि अवस्था अनुसार विषादीको अवशेष रहने हुनाले विषादी छ्रेपछि खान योग्य हुनका लागि पर्खी अवधीलाई ख्यालगरेर मात्र बाली टिन्ने गर्नु पर्दछ । विषादीको अवशेष बढी भएको खानेकुरा खानाले मानिस र पशुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालिन असर देखिने साथै वातावरणमा असर पार्ने भएकाले तिनका विकल्पमा देहायका तरिकाहरू अपनाउनु सकिन्छ ।

क्र.सं.	तरिकाहरू	क्र.सं.	तरिकाहरू
१	नियम कानूनद्वारा व्यवस्थापन गर्ने: चेकपोष्टहरूबाट चेक गर्ने	२	भौतिक तरिका: विभिन्न अवरोधहरू गरेर जस्तै बार बन्देज, विरुवाको डाँठमा प्लाइक वा कपडा बेर्ने
३	स्थानिय प्राविधिको प्रयोग	४	जैविक र वानस्पतिक विषादीको प्रयोग
५	कीराको प्रजननमा अवरोध पुराउने	६	मित्रजीवको उत्पादन र छाइने
७	बाली चक्र र कुषिकर्ममा सुधार	८	जेनेटिक इञ्जिनियरिङ
९	माटोलाई निर्मलीकरण गर्ने	१०	कम्पोष्ट, हरियोर गोबर मलको प्रयोग
११	आकर्षण पासोहरू	१२	बायोचारले मलको प्रभावकारिता बढाउने
१३	प्राङ्गारिक खेती	१४	एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन तरिका
१५	असल कृषि अभ्यास		

विषादी छाला, आँखा, मुख र स्वास प्रश्नास गर्दा मानव शरिरमा प्रवेश हुन सक्ने र त्यसले तत्कालिन र दीर्घकालिन रोगहरू जस्तै दम, पेट, नशा, मुटु सम्बन्धी, स्मरणशक्ति हराउने, परुषमा नपुङ्गसता, महिलामा बाँझोपना, गर्भपतन, बच्चा विकृत भएर जन्मने आदि समस्याहरू देखिन्छन् । त्यसैले यस्ता समस्याबाट बच्न व्यक्तिगत सुरक्षणका पहिस लगाउने साथै विषादीका सम्पर्कमा रहने हरेक तहमा असर कम गर्न अन्य सावधानीहरू अपनाउनु पर्दछ ।

रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्नेपर्ने भएमा सो कम गर्न व्यवसायीहरू र उपभोक्ताहरूले देहायका तरिकाहरू अपनाउँदा विषादीबाट मानिस र पशुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी अल्पकालिन र दीर्घकालिन असर साथै वातावरणमा देखिने असर न्यून गर्न मद्दत पुर्दछ ।

आयातकर्ता: जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ र नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरूप प्रावकारी र सुरक्षित विषादी पञ्चिकरण गराई आयात र विक्री वितरण गर्ने, कुनै कारणले फुटेका, चूहिएका वा पोखेका विषादीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, म्याद भएका र म्याद नाघेका विषादीको भण्डारण तोकिएको मापदण्डमा रही गर्ने ।



संक्षेपणकर्ता : जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ र नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरूप आफुले कुन कुन विषादीहरु संक्षेपण गरी उत्पादन गर्ने हो ती विषादीहरु पञ्चिकरण गराई उत्पादन, भण्डारण, र विक्री वितरण तोकिएको मापदण्डमा रही गर्ने ।

छर्कने व्यवसायी: विषादीको लेवल पढ्ने, र सो अनुसार गर्ने, विषादी शरिरभित्र नपस्ने गरी सुरक्षित पहिरन लगाउने, विषादी छर्ने सामग्रीहरु काम गर्ने अवस्थामा छन् छैनन् जाँच गर्ने, छर्दा हावाको गति र वहावटलाई ध्यान दिई छर्ने, छर्नुपूर्व करिब ४८ घण्टा भित्रमा पानी पर्ने सम्भावना भएमा विषादी नछर्ने वा पानीले नपखाल्ने स्टिकर राखी छर्ने, स्थान, विरुवा वा बालीको स्वभाव अनुसार छर्ने, छरेको विषादी छरिसकेपछि प्रयोग गरिएका सर सामान र उपकरणहरुसही तरिकाले सफा गर्ने, तिनलाई सुकाउने र आफू नुहाउने ।

कृषक वा प्रयोगकर्ता: विषादी बाहेकका विकल्प अवलम्बन गर्न एकिकृत बाली संरक्षणका उपायहरु अपनाउने, विषादी छर्ने पर्न भए जानकार व्यक्तिको सहयोगले सुरक्षित विषादी किन्ने, विषादीको लेवल पढ्नेर सो अनुसार गर्ने, विषादी शरिरभित्र नपस्ने गरी सुरक्षित पहिरन लगाउने, पानीको मुहान र खोलामा विषादी पखालेको झोल वा खाली भाँडो नफाल्ने, विषादी छर्ने स्थानको माटोको बनावट र चरित्र राम्ररी बुझी, कुन विषादी उक्त पानीको सतहलाई असर नपार्ने हुन्छ सो छान्ने, मौरी लगायतका परागशेचन गराउने कीरालाई असर नगर्ने विषादी छर्ने, छरेको सूचना खेतमा राख्ने, विषादी छर्दा लगाएको पहिरन सफा गर्ने, आफू नुहाउने, छरेपछि खान योग्य हुनका लागि पर्खने अवधीलाई ख्याल गरेर मात्र बाली टिपी बिक्री गर्ने ।

उपभोक्ता: विषादी खानेकुरा, हावा र पानीबाट हास्त्रा सम्पर्कमा आउने भएकाले खानेकुराबाट आउने विषादीलाई त्यसको मात्रा कम गर्न देहायका उपायहरु अपनाउनु पर्दछ । विषादीको अवशेष कम गर्ने बारेमा विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले गरेका अनुसन्धानहरुले देहायका नितिजा देखाएको पाइएको छ ।

१. पानीले धुने : तरकारी र फलफूललाई भाँडोमा डुवाएर धूनु भन्दा धारा वा बरदो पानीमा ब्रसले कुनाकाप्चामा समेत राम्ररी धोएपछि त्यसमा रहेको सम्पर्क विषादी, पाइराश्वाइड विषादी ७०% कम हुने, व्याक्टेरिया र फोहर समेत जाने गर्दछ । २% खाने नून वा खाने सोडामा कागती पानीमा तरकारीलाई धोएर प्रेसर कुकरमा पकाएर खाँदा विषादीको मात्रा करिब ८०% घट्दछ । गोलभेडालाई पानीमा पखालेर वा सिधै पकाउँदा वा २% नून पानीमा पखालेर धुनुभन्दा २% नून पानीमा पखालेर पकाउँदा ९९% विषादीको अवशेष कम अर्थात अधिकतम विषादीको सीमा भन्दा तत हुने पाइन्छ (Elkins, 1980; Dhimanet al 2006; Kumari, 2008; Washim Aktar et al 2010; Saghir, et al 2012; Shashi et al 2014) । तर Methamidophos जस्ता पानीमा सजिलैसँग धुने दैहिक विषादीहरु पानीले पखाल्दा तिनको अवशेष कम हुँदैन ।



२. बाहिरी पातहरु फाल्ने र बोका ताछ्ने : बन्दा, लेट्स जस्ता तरकारीको बाहिरी पातहरु हटाई राम्ररी धुँदा वा सम्भव भएका तरकारी र फलफूलका बोका ताछ्दा त्यसमा रहेको सम्पर्क विषादी विषादीहरुको मात्रा ४५-९९% कम हुने, व्याक्टेरिया र फोहर समेत पखालिएर जान्छ । तर बोका ताछ्दा दैहिक विषादीहरुको अवशेष कम हुँदैन ।



३. धैरै परिकाहरु खाने: प्रकारका तरकारी फलफूल र खानेकुरा खानाले ती खानेकुरामा औषतमा विषादीको अवशेषको मात्रा कम हुन आउँछ ।



४. सुख्खा बनाउने : ब्रसले सफागरी धोएपछि फलफूल र सलादको रूपमा काँचै खाने तरकारीलाई कुनै सफा कपडा वा कागजको टावलले सुख्खा हुने गरी पुछेर खानुदोस् जस्ते गर्दा व्याक्टेरियाको समेत प्रकोप कम हुन्छ । पानीमा मिसाएका खाने सोडामा स्याउलाई १२ मिनेटजति डुवाएर पुछेमा त्यसमा विषादीको अवशेष ९६% घट्दछ ।



५. पकाएर खाने : बोका ताछ्ने र पकाउँदा अर्गानोफस्फेट विषादीहरुको मात्रा ३५-६०% र अर्गानोक्लोरिनको मात्रा २०-२५% कम हुने गर्दछ । ३० मिनेट उमाल्दा दैहिक विषादी ८०-९०% कम हुने गर्दछ । तरकारीलाई सुख्खा हुने गरी वा बफाएर पकाउँदा विषादीको अवशेष कम भएको पाइएको छ । ओभन वा फुड डायरमा भन्दा सूर्यको प्रकाशमा सुकाएको फलफूलमा विषादीका अवशेष २० देखि ३०% कम हुने गर्दछ (Tijana and Rada, 2016) । अर्गानोफस्फोरस सम्हका विषादीहरु भएको तरकारी वा खाद्यान्न पकाउँदा तिनमा विषादीको अवशेष कम हुने गर्दछ (Nagayama, 1990) ।



६. फ्रिजमा राख्ने : तरकारी र फलफूललाई फ्रिजमा १० डि. से.मा ३-४ दिन राख्दा विषादीहरूको मात्रा २४-९४% कम हुने गर्दछ ।



७. निर्मलीकरण : दूध वा खानेकुरा निर्मलीकरणकोलागि तताउँदा र चिसोमा राख्दा धेरैजसो विषादीको अवशेष कम हुने गर्दछ ।



८. प्रसोधन गर्ने: दानादार खाद्यान्नको जब मीलबाट बोक्रा फलिन्छ तब विषादीको अवशेष १७-२८ % कम हुने गर्दछ भने पीठो बनाउँदा ६०% कम हुने गर्दछ । दाना भन्दा पिठो बनाएर पिन्दा विषादीको अवशेष कम हुने गर्दछ । खाद्यान्नमा भएको विषादीको अवशेष कम गर्न पानीले धुने, बोक्रा ताछने, रिएजेण्ट (खाने साडा, एसिड फेन्टान) रसायनिक पदार्थ (hypoalhlorous solution and ozone) मा डुबाउँने र पकाउने गर्दा विषादीको अवशेष घट्दछ (Rico et al, 2012; Ji et al 2012) ।



९. जुस बनाउँदा: स्याउको जुस निकाल्दा बोक्रा फालिने र रसलाई फिल्टर गरिने कारणले फेनिट्राथियन विषादी ९०% कम हुने गर्दछ ।




१०. चिया कफि बनाउँदा: चिया वा कफिको विरुवामा छुरको विषादी चिया प्रसोधन गर्दा सुख्खा हुने, धुम्ने र भैं विभिन्न चरण पार भैं कपमा बनेर आउँदासम्म विषादीको समुह अनुसार ४५-६४% कम हुने गर्दछ भने कफीमा डाइक्लोरभस ८२-८८% कम हुने गर्दछ ।



११. अमिल्याउने : फलफलको रक्सी बनाउँदा अर्गानोफस्फेट विषादीको अवशेष ८३% कम हुने गर्दछ भने बन्दाको किम्ची बनाउँदा ८६% कम हुने गर्दछ ।



१२. शुक्ख जीवाणुको प्रकोप कम गर्ने: धेरै प्रकारका तरकारी र फलफूल माटोमा लगाउने र माटो, पानी, मलका सम्पर्कबाट साथै भण्डारण तयार गर्दा वा खाद्य चक्रको कुनै पानि तहमा ती शुक्ख जीवाणुको प्रवेश हुन सक्ने भएकाले तिनको स्वभाव हेरी अक्सिजनको मात्रा घटाउने, पकाउने, अल्ट्रा भ्वाइलेट लाइट दिनेवा अन्य उपाय अपनाउनु पर्दछ । पोटासियम पर म्याग्नेटले तरकारी धुँदा कतिपय शुक्खजीवहरू र विषादीहरूको अवशेष कम हुने गर्दछ (Klinhom et al, 2008) ।



१३. निष्कर्ष र सुझाव : कृषि बालीहरू उत्पादन गर्दा र भण्डारणमा देखिने रोग कीरा नियन्त्रण गर्न सम्भव भएसम्म रासायनिक विषादीहरूको विकल्प खोज्ने, आवश्यक पर्ने नै भएमा सुरक्षित र प्रभावकारी विषादी सुरक्षित तरिकाले छैन, पखने अवधिपछि मात्र टिप्पे, विषादीको सम्पर्कमा हुने विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले विषादीको सम्पर्कमा रहँदा शरिरभित्र नपर्ने सुरक्षित पहिरन लगाउने, घर र भान्सामा आएको फलफूल र तरकारीलाई माथि भनिएका विषादीको अवशेष कम गराउने उपायहरू अपनाउन सकिएमा मानिस पशुपन्छी वा समुदायमा विषादीबाट हुने तत्काल र दीर्घकालिन असर न्यून गर्न सकिन्छ ।

केही उपयोगी प्रश्नहरू

१. विषादी मानिसको शरिरमा कसरि पस्न सक्छ र पस्नबाट बच्न के के उपायहरू गर्नुपर्दछ ?
२. विषादीहरूको अवशेष कम गर्ने कुनै चार के के तरिका अपनाउन सकिन्छ तिनका बारेमा छोटकरीमा लेखुहोस् ?

सन्दर्भ सामाची:

१. जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८
२. जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०
३. विषादी खुद्रा बिक्रेता इजाजतपत्र, सुरक्षित बिक्री वितरण, भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्यविधि, २०७९
४. कृषि डायरी २०७५, कृषि सञ्चार तथा सूचना केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर
५. वार्षिक पुस्तिका २०७४, पञ्जकृत विषदीहरूको सूची र प्रयोग विधि, विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, हरिहरभवन, ललितपुर
६. विषादीका विविध पक्षहरू २०७४, विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, हरिहरभवन, ललितपुर
७. <http://www.academyofwellness.com/washing-vegetables-to-remove-pesticides.html>
८. Montana Private Pesticide Certification Manual,2008 MSU Pesticide Safety Education Program (<http://www.pesticides.montana.edu>)
९. FAO,2016. The International Code of Conduct on Pesticide Management,Italy, Rome
१०. FAO,2016. Pesticides - Average use per area of cropland <http://www.fao.org/faostat/en/#data/EP/visualize>
११. Atlantic Canada Pesticide Applicator Training manual Series 2005. Cooperatively developed by the Atlantic Working Group for Pest Management Education and Training Standards at www.gov.ns.ca/enla/pests/applicatortraining.asp
१२. Standard Practices for Pesticides Applicators,Lower Mainland,British Colombia
१३. Janet Fults,2017. How to Comply with the 2015 Revised Worker Protection Standard for Agricultural Pesticides: What Owners and Employers Need to Know. The Regents of the University of California, Davis campus,USA
१४. Jennifer Weber,2016. US Environmental Protection Agency to University of California, Davis Extension, in cooperation with Oregon State University USA

जीवनाशक विषदीहरूको प्रयोग विधि

कीटनाशक (Insecticide)

क) समूह : अर्गानोफोस्फेट

१. सामान्य नाम : एसिफेट

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क तथा दैहिक, मारक मात्रा-५० : १४५ mg, घातकता स्तर II)

व्यापारिक नाम :

धनराज ७५% एस.पी.

फेटल ७५% एस.पी.

लेन्सर ७५% एस.पी.

आसाटप ७५% एस.पी.

लुसिड ७५% एस.पी.

अलटप ७५% एस.पी.

असासल ७५% एस.पी.

रसटाप ७५% एस.पी.

अलटप ७५% एस.पी.

जड ७५% एस.पी.

किफेट ७५% एस.पी.

मोलफेट ७५% एस.पी.

यस ७५% एस.पी.

लोड ७५% एस.पी.

नागाईल ७५% एस.पी.

रसायनफेट ७५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
कपास	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२९२	३९०	५००-१०००	१५	१.२-२.५
	कपासको फलको गबारो	<i>Pecionophora gossyiella,</i> <i>Earias vitella</i>	५८४	७८०	५००-१०००	१५	०.६-१.२
	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	५८४	७८०	५००-१०००	१५	०.६-१.२
		<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२९२	३९०	५००-१०००		१.२-२.५
धान	धानको गबारोहरू	<i>Scrippophaga incertulas, S.</i> <i>innotata, Chilo partellus, C.</i> <i>suppressalis, Sesamia inferens</i>	५००- ७५०	६६६-१०००	५००-१०००	१५	०.७५-१
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	५००- ७५०	६६६-१०००	५००-१०००	१५	०.७५-१
	धानको खेरो फड्के	<i>Recilia dorsalis, NiaLparvata</i> <i>lugens, Sogatella furcifera</i>	५००- ७५०	६६६-१०००	५००-१०००	१५	०.७५-१
	धानको हरियो फड्के	<i>Nephrotettix nigropictus,</i> <i>N.Virensence</i>	५००- ७५०	६६६-१०००	५००-१०००	१५	०.७५-१

२. सामान्य नाम : क्लोरपाइरिफस २०% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : १३५ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

नागपाईरिफस २०% ई.सी.

डर्मेट २०% ई.सी.

अलवान २०% ई.सी.

ट्राईसेल २०% ई.सी.

क्लासिक २०% ई.सी.

क्राईफस २०% ई.सी.

राडार २०% ई.सी.

फाईनवान २०% ई.सी.

सिकोवान २०% ई.सी.

रसवान २०% ई.सी.

किं-क्लोरो २०% ई.सी.

लिथल २०% ई.सी.

किसान २०% ई.सी.

धनभान २०% ई.सी.

सलवान २०% ई.सी.

प्रिडेटर ५०% ई.सी.

देखीवान २०% ई.सी.

बान % ई.सी.

मोलवान २०% ई.सी.

सुर्यकोस २०% ई.सी.

टर्मिसाईल २०% ई.सी.

प्रिमेन २०% ई.सी.

प्रिजेम २०% ई.सी.

हिन्दुस्तान वरदान २०% ई.सी.

टरमाईट-एक्स २०% ई.सी.

डर्सवान २०% ई.सी.

धनुषवाण २०% ई.सी.

क्याच २०% ई.सी.

क्लियर आउट २०% ई.सी.

क्लोरो किड २०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मिलि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम वा एम.एल./ लि.
जौ	धमिरा	<i>Microtermes obesi, Odontotermes obesus</i>	३७५	३-४ मि.लि. प्रति कि.ग्रा. बीउ		२८	०.७५-१
गहुँ	धमिरा	<i>Microtermes obesus, Odontotermes obesus</i>	३७५	३-४ मि.लि. प्रति कि.ग्रा. बीउ		२८	०.७५-१
	डाँठको फड्के	<i>NiaLparvata lugens</i>	३५०-४२५	१०००-१५०० कक	५००-१०००	२८	१.५-२
धान	गुभोको औंसा	<i>Hydrelia sp.</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	०.८-२.५
	दुडग्रे कीरा	<i>Orselia oryzae</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	धानका गबारोहरू	<i>Scirpophaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	काँडे खपटे	<i>Dicladispa armigera</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	३७५	१८७५	५००-१०००	२८	१.८७-३.७५
	कोसामा लारने लार्भाहरू	<i>Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Maruca vitrata</i>	३७५	१८७५	५००-१०००	२८	१.८७-३.७५
	कालो पतेरो	<i>Lygus gemelijtus</i>	३७५	१८७५	५००-१०००	२८	१.८७-३.७५
	फेद कट्टवा	<i>Agrotis ipsilon</i>	५००	२५००	५००-१०००	२८	२.५-५
चना	धमिरा	<i>Microtermes obesi, Odontotermes obesus</i>		३-४ मि.लि. प्रति कि.ग्रा. बीउ			१.८७-३.७५
मुड	झुसिलकीरा	<i>Spilarctia obligua, S. casitgeneta</i>	३००-५००	१५००-२५००	५००-१०००	२८	२.५-३
बदाम	लाही	<i>Aphis craccivora</i>	२००	१०००	५००-१०००	२८	१-२
	जरा खाने कीरा	<i>Holotrichia Consanguinea</i>	२२५	११२५	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
उखु	कालो पतेरो	<i>Cavelerus excavates</i>	१५०	७५०	५००-१०००	२८	.७५-१.५
	अर्लि शुट बोरर	<i>Chilo infuscatellus</i>	२५०-३००	१२५०-१५००	५००-१०००	२८	१.५-२.५
	स्टक बोरार	<i>C. auricilius</i>	२५०-३००	१२५०-१५००	५००-१०००	२८	१.५-२.५
	पाईरिला	<i>Pyrilla Perpusilla</i>	३००	१५००	५००-१०००	२८	१.५-३
	धमिराहरू	<i>Odontotermes obesus, Microtermes anandi</i>	१२५०	६.२५ लि.	१०००	२८	६.२५
कपास	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	सेतो झिडा	<i>Bemisia tabaci</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	खैरो घुन	<i>Myllabris undecimpustulatus</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	कपासको फलको गबारोहरू	<i>Earis vittella, E. insulana, Pectinophora gossypiella, Helicoverpa armigera</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
	फेद कट्टवा	<i>Arotis Sp.</i>	७५०	३७५०	५००-१०००	२८	३.७५-७.५

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मिलि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम वा एम.एल./ लि.
तोरी	तोरीको लाही	<i>Lipaphis erysimi</i>	१००	५००	५००-१०००	२८	.५-१
भट्टा	डाँठ र फलमा लाग्ने गबारो	<i>Leucinodes orbonalis</i>	२००	१०००	५००-१०००	२८	१-२
काउली/बन्दा	ईटबुट्टे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	४००	२०००	५००-१०००	२८	२-४
प्याज	जरा खाने कीरा		१०००	५००	५००-१०००	२८	१-२
आलु	थोप्ले खपटेहरू	<i>Epilachna vigintiocto</i>	५००	२५००	५००-१०००	२८	२.५-५
	पात खाने लाभा	<i>Spodoptera litura, Thysanoplusia orichalcea</i>	२५०	१२५०	५००-१०००	२८	१.२५-२.५
सुन्तला जात बाली	सुन्तला जात बालीको कालो लाही	<i>Toxoptera aurantii</i>	३००-४००	१५००-२०००	५००-१०००	२८	२-३
धान	धानका गबारोहरू	<i>Scirpophaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens</i>	१०००	१००००	५००-१०००	३०	१०-२०
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	१०००	१० कि.ग्रा.	५००-१०००	३०	१०-२०
	दुङ्गे किरा	<i>Orseolia oryzae</i>	१०००	१० कि.ग्रा.	५००-१०००	३०	१०-२०

३. सामान्य नाम : क्लोरपाईरिफस ४% जि.आर. र १.५% डि.पी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क तथा आन्तरिक, मारक मात्रा-५० : १३५ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

कि-क्लोरो ४% जि.आर.

मोलबान १.५% डि.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु के.जी.	पानी लि.	पर्खने दिन	के.जी./ हे.
जौ	धमिरा	<i>Microtermes obesi, Odontotermes obesus</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
गहूँ	धमिरा	<i>Microtermes obesi, Odontotermes obesus</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
धान	गुभोको औंसा	<i>Hydrelia sp.</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	दुङ्गे कीरा	<i>Orselia oryzae</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	धानका गबारोहरू	<i>Scirpophaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	काँढ खपटे	<i>Dicladispa armigera</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	कोसामा लाग्ने लाभाहरू	<i>Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Maruca vitrata</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	कालो पतेरो	<i>Lygus gemelijtus</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु के.जी.	पानी लि.	पर्खने दिन	के.जी./ हे.
चना	फेद कटुवा	<i>Agrotis ipsilon</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	धमिरा	<i>Microtermes obesi, Odontotermes obesus</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
बदाम	जरा खाने कीरा	<i>Holotrichia Consanguinea</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
उखु	कालो पतेरो	<i>Cavelerus excavates</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	अर्लि शुट बोरर	<i>Chilo infuscatus</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	स्टक बोरर	<i>C. auricilius</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	पाइरिला	<i>Pyrilla Perpusilla</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.
	धमिराहरू	<i>Odontotermes obesus, Microtermes anandi</i>	१५-४०	१२-१५ के.जी.		३५	१२-१५ के.जी.

४. सामान्य नाम : डाईमेथोथेट

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा-५० : ११५, घातकता स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

किं-रोगर ३०% ई.सी.

रोगर ३०% ई.सी.

रोगर प्लस ३०% ई.सी.

रोगर रिच ३०% ई.सी.

रोगोरिन ३०% ई.सी.

रोगोहिट ३०% ई.सी.

देखीगन ३०% ई.सी.

सुर्यरोगर ३०% ई.सी.

रोगोरस ३०% ई.सी.

तेजा ३०% ई.सी.

३०% ई.सी.

टेरा ९०९३०% ई.सी.

टाफगोर ४०% ई.सी.

रोगो गोल्ड ४०% ई.सी.

महागोर ३०% ई.सी.

ग्रिनगोर ३०% ई.सी.

अनुगोर ३०% ई.सी.

अल रोगर ३०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा. मि. लि.	तयारी वस्तु मि. लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
मकै	मकैको गबारो	<i>Chilo partellus</i>	२००	६००	५००-१०००	१५	१.२-१.६
जुनेलो	जुनेलोको दुड्गे कीरा	<i>Contarinia sorghicola</i>	५००	१६५०	५००-१०००	१४	१.६५-२.३
रहर	कोशाका गबारोहरू	<i>Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Marruca vitrat Melanagromyza Obtusa</i>	३७५	१२३७	५००-१०००	१४	१.२३-२.४७
कपास	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	२५०	६६०	५००-१०००	१४	१.५-१.३२
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.५-१.३२
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.५-१.३२
	<i>Thrips tabaci</i>		२००	६६०	५००-१०००	१४	१.५-१.३२
	थ्रिप्स	<i>Thrips tabaci</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.५-१.३२
अण्डर	खेरो घुन	<i>Myllabris undecimpustulatus</i>	३००	९९०	५००-१०००	१४	१.०१-१.९८
	फड्के कीरा	<i>Empoasca flavescens, E. devastans, E. notata, E. kerri, E. parathea</i>	२५०	८२५	५००-१०००	१४	१.२५-१.६५
	सुलसुले	<i>Olyonychus coffeae</i>	२५०	८२५	५००-१०००	१४	१.२५-१.६५
	पात खाने लार्भा	<i>Achaea janata</i>	३५०	१२५५	५००-१०००	१४	१.२५-२.५
बदाम	पात खन्ने कीरा	<i>Stomapteryx subsecivella</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.३२-१.५

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि. लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
तोरी	तोरीको लाही	<i>Lipaphis erysimi</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.३२-१.५
	तोरीको करौते कीरा	<i>Athalia lugens proxima</i>		६६०	५००-१०००	१४	१.३२-१.५
सूर्यमूखी	लाहीहरू	<i>Aphis craccivora, aphis gossypii</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.३२-१.५
राम तोरिया	कपासको फड्के	<i>Aphis gossypii</i>	७००	२३१०	५००-१०००	१४	२.३-४.६२
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	६००	१९८०	५००-१०००	१४	१.९८-३.९६
भण्टा	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	६००	१९८०	५००-१०००	१४	१.९८-३.९६
	डाँठ र फलमा लाग्ने गबारो	<i>Luecinodes orbonalis</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	१.३-१.५
काउली बन्दा	बन्दाको लाही	<i>Brevicoryne brassicae</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	०.६६-१.३२
	पेन्डे बग	<i>Bagrada cruciferarum</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	०.६६-१.३२
	तोरीको लाही	<i>Lipaphis erysimi</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	०.६६-१.३२
आलु	विभिन्न लाहीहरू	<i>Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae, Brevicoryne brassicae, Myzus persicae, Aulacorthum solani, Rhopalosiphum sp, Aphis craccivora, Aphis spiraecola, Aphis gossypii, Brachycaudus helichrysi, Lipaphis erysimi</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	०.६६-१.३२
प्याज	थ्रिप्स	<i>Thrips tabaci</i>	२००	६६०	५००-१०००	१४	०.६६-१.३२
गोलभेंडा	सेतो भिंडा	<i>Bemisia tabaci</i>	३००	१९०	५००-१०००	१४	०.९९-१.९
स्याउ	स्याउको डाँठमा लाग्ने गबारो	<i>Zeuzera sp</i>	०.०३%	१४८५-१९८०	५००-१०००	१४	१.९-२.९
केरा	केराको लाही	<i>Pentalonia nigronervosa</i>	०.०३%	१४८५-१९८०	५००-१०००	१४	१.९-२.९
	लेसविड बग	<i>Stephanitis typicus</i>	०.०३%	१४८५-१९८०	५००-१०००	१४	१.९-२.९
सुन्तला जात बाली	सुन्तला जात बालीको कालो लाही	<i>Toxoptera aurantii</i>	०.०३%	१४८५-१९८०	५००-१०००	१४	१.९-२.९
आँप	मिलि बग	<i>Drosicha mangiferae, Rastrococcus iceryoides</i>	०.०३%	१४८५-१९८०	५००-१०००	१४	१.९-२.९
	आँपको फड्केहरू	<i>Amaritodus atkinsoni, Idioscopus clypealis I. Neveosparsus</i>	०.०३%	१४८५-१९८०	५००-१०००	१४	१.९-२.९

५. सामान्य नाम : इथियन

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा : २०८ mg, घातकताको स्तर :II)

व्यापारिक नाम :

फस माईट ५०% इ.सी. अलमाईट ५०% इ.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
कफि	थ्रिप्स	<i>Scirtothrips dorsalis, Haplothrips andresi, H. tenuipennis</i>	२५०	५००	५००-१०००	१४	०.५-१
	सुलसुले	<i>Oligonychus coffeae</i>	२५०	५००	५००-१०००	१४	०.५-१
	कालो लाही	<i>Toxoptera aurantii</i>	२५०	५००	५००-१०००	१४	०.५-१
	पात खाने लार्भा	<i>Andracaca</i>	२५०	५००	५००-१०००	१४	०.५-१
	हेलोपेटिस	<i>Helopetis spp.</i>	२५०	५००	५००-१०००	१४	०.५-१
सुन्तला जात बाली	पात खाने कीराहरू	<i>Throscrhiza citrii</i>	२५०	५००	५००-१०००	१४	०.५-१

६. सामान्य नाम : मालाथियन ५०% इ.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा २१०० mg, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

मालाथियन रिमेडि ५०% इ.सी. सिकोथायन ५०% इ.सी.मिलथियन ५०% इ.सी. अनु मालाथियन ५०% इ.सी.

अलमाला ५०% इ.सी. साईथियन ५०% इ.सी. ग्रिन माला ५०% इ.सी. मैथियन ५०% इ.सी. सुर्यथायन ५०% इ.सी. कि-थायन ५०% इ.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	काँडे खपटे	<i>Diciadispa armigera</i>	५७५	११५०	५००-१०००	१४	१.१५-२.३
जुनेलो	जुनेलोको ढुङ्गे कीरा	<i>Contarinia sorghicola</i>	५७५	११५०	५००-१०००	१४	१.१५-२.३
केराउ	कोशाको गबारो	<i>Lampides boeticus</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१.५-३
भटमास	पात खाने घुन	<i>Myllocerus viridanus, M. discolor, M. maculosus, Episomus lacerta, Alcidodes pictus</i>	७५०	११५०	५००-१०००	१४	१.१५-२.३
कपास	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
	कपासको थ्रिप्स	<i>Thrips tabaci</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
	सेतो झिडा	<i>Bemisia tabaci</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
अण्डर	अण्डरको फड्के	<i>Empoasca flavescens, E. devastans, E. notata, E. kerri, E. parathea</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१-३
	सेमि लुपर	<i>Achaea janata</i>	१०००	२०००	५००-१०००	१४	२-४

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
बदाम	पात खाने कीरा	<i>Stomopteryx subsecivella</i>	६२५	१२५०	५००-१०००	१४	१.२५-२.२५
तोरी	कराँते फिडा	<i>Ahalia lugens proxima</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१-३
	लाही	<i>Lipaphis erysimi, Brevicoryne brassicae</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
सूर्यमूखी	सेतो फिडा	<i>Bemisia tabaci</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
राम तोरिया	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	५००	१०००	५००-१०००	१४	१-२
	कपासको फडके	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	६५०	१२५०	५००-१०००	१४	१.२५-२.२५
बन्दा	फलको गबारो	<i>Earias vitella, E. insulana,</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१-३
काउली	ईट बुद्धे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१-३
सलगम	सूर्तिको लार्भा	<i>Spodoptera litura</i>	६००	१२००	५००-१०००	१४	१.२-२.५
गोलभेंडा	सेतो फिडा	<i>Bemisia tabaci</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१-३
स्याउ	स्याउको कत्ते कीरा	<i>Quadraspidiotus permicosus</i>	६००	१२००	५००-१०००	१४	१.२-२.४
	भुवादार लाही	<i>Erosoma lanigerum</i>	७५०	१५००	५००-१०००	१४	१-३
केराउ	लेशविड बग	<i>Stephanitis typicus</i>	१५०-२००	३००-४००	५००-१०००	१४	१.६-२.५

७. सामान्य नाम : मालाथियन ५% डि.पी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क तथा आन्तरिक, मारक मात्रा २१०० mg, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

मालाथियन रिमेडि ५% डि.पी. अलमाला ५% डि.पी. मोल रक्षा ५% डि.पी. मालाथियन ५% डि.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	के.जी./ रोपनी
धान	कँडे खपटे	<i>Dicladispa armigera</i>	१२५०	२५	-	१४	१.२५
जुनेलो	जुनेलोको ढुंगे कीरा	<i>Contarinia sorghicola</i>	१०००	२०	-	१४	१
कोशे बाली	कोशाको गबारो	<i>Elastis atomosa, Maruca vitrata, Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Melanagromyza obtusa</i>	१५००	३०	-	१४	१.५

८. सामान्य नाम : किवनाल्फस

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा : ६२ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

फ्लास २५% ई.सी. सु-कुइन २५% ई.सी. कि-क्वीनाल २५% ई.सी. नागिन २५% ई.सी.
वर्ज २५% ई.सी. हिटालक्स २५% ई.सी. इकालक्स २५% ई.सी. नागिन २५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि. लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	गबारोहरू	<i>E.vitella, E.insulana, Pectinophora gossypiella H. armigera</i>	१०००	१५००	५००-१०००	४०	१.५-३
	खैरो फड्के	<i>NiaLparvata lugens</i>	३७५	१५००	५००-१०००	४०	१.५-३
	दुडग्रे कीरा	<i>Orseoliao oryzae</i>	२५०	१०००	५००-१०००	४०	१-२
	धानको गबारोहरू	<i>Scipophaga incertulas, S. innotata, sesamia inferens, Chilo partellus</i>	३५०	१४००	५००-१०००	४०	०.७१-२.८
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis</i>	२५०	१०००	५००-१०००		१-२
	काँडे खपटे	<i>Dicladispa armigera</i>	५००	२०००	५००-१०००		२-४
कपास	लाही सेतो मिडा	<i>Aphis gossypii Bemisia tabaci</i>	३००	१२००	५००-१०००	४०	१.२-२.४
	फलको गबारो	<i>Heliothis armigera, Earias vitella, E. insulana pectinophora gossypiella</i>	५००	२०००	५००-१०००	४०	२-४
रहर, चना	कोशामा लाग्ने गबारो	<i>Heliothis armigera Exelastis atomosa, Lampides boeticus</i>	३५०	१४००	५००-१०००	४०	१.४-२.८
	कोशामा लाग्ने औसा	<i>Melanagromyza abtusa</i>	३५०	१४००	५००-१०००	४०	१.४-२.८
उखु	पाईरिला	<i>Pyrilla Perpusilla</i>	३००	१२००	५००-१०००	४०	१.२-२.४
बदाम	फड्के	<i>Empoasca sp.</i>	३५०	१४००	५००-१०००	४०	१.४-२.८
रामतोरिया	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२५०	१०००	५००-१०००	४०	१-२
	फलको गबारो	<i>Earias vitella</i>	२५०	१०००	५००-१०००	४०	१-२
भण्टा	फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	३७५	१५००	५००-१०००	४०	१.५-३

ख) समूह : कार्वामेट्रस

२. सामान्य नाम : थायोडिकार्ब ७५% डब्लू.पी.

(कार्य प्रकृति : आन्तरिक र सम्पर्क, मारक मात्रा : ६६ mg, घातकताको स्तर :II)

व्यापारिक नाम :

लार्मिन ७५% डब्लू.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
बन्दा	ईटबुद्धे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	७५०-१०००	१०००-१३३०	५००	७	२-२.६६
कपास	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	७५०	१०००	५००	३०	२
भण्टा	डाँठ तथा फलको गबारो	<i>Earias vitella</i>	४७०-७५०	६२५-१०००	५००	६	१.२५-२
खुर्सानी	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	४७०-७५०	६२५-१०००	५००	६	१.२५-२

ग) समूह : सिन्थेटिक पाइरेथोईड्स

१. सामान्य नाम : अल्फामेथ्रिन / अल्फा साईपरमेथ्रिन

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा ; घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

फर्सा १०% ई.सी.	गुरु १०% ई.सी.	एन अल्फा ५% ई.सी.	एक्सिस १०% ई.सी.
जेम १०% ई.सी.	नायक १०% ई.सी.	अल्फा धान-१०% ई.सी.	क्लिक १०% ई.सी.
मेरिटाल्फ १०% ई.सी.	कि-अल्फा १०% ई.सी.	अल्फाधन १०% ई.सी.	एक्सिस १०% ई.सी.
कलेक्टर १०% ई.सी.	रिमोभर १०% ई.सी.	स्पोट किल १०% ई.सी.	सुर्य अल्फाप्लस १०% ई.सी.
थ्रिल - १०% ई.सी.	भाईपर-१० ई.सी.	नागमेथ्रीन-१० ई.सी.	कि अल्फा१०% ई.सी.
नायक १०% ई.सी.	नुमेथ्रिन १०% ई.सी.	जेम १०% ई.सी.	डल्फिन १०% ई.सी.
एक्सिस् १०% ई.सी.	अल्फाधन १०% ई.सी.	अल्फा एम १०% ई.सी.	अल फा १०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
कपास	फलमा लाग्ने गबारो	<i>Heliothis armigera</i>	१५-२५	१६५-२८०	६००-१०००	७	३.५७-३.६३

२. सामान्य नाम : साईपरमेथ्रिन

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा : २५० mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

साईप्रिन १०% ई.सी.	नागसाईपर १०% ई.सी.	एक्मेथ्रिन, १०% ई.सी.	अल किलर १०% ई.सी.
डेल्टा कोट १०% ई.सी.	रिपकर्ड १०% ई.सी.	उस्ताद १०% ई.सी.	लेसर १०% ई.सी.
फाईटर १०% ई.सी.	गुगली १०% ई.सी.	के-साईपरिन १०% ई.सी.	महारिन १०% ई.सी.
मोलध्रिन १०% ई.सी.	सिकोरिन १०% ई.सी.	सुपरफाईटर १०% ई.सी.	टु स्टर १०% ई.सी.
क्रिसिप १०% ई.सी.	साईपरहिट १०% ई.सी.	स्टार्क १०% ई.सी.	सुपर किलर १०% ई.सी.
च्यालेन्जर १०% ई.सी.	देभीसाईपर १०% ई.सी.	साईपर प्लस १०% ई.सी.	साईपर सिड १०% ई.सी.
हाईपावर १०% ई.सी.	अनुमाईट १०% ई.सी.	सुपर साईप्रिन १०% ई.सी.	कि-साईपर १०% ई.सी.
पुनिक्स १०% ई.सी.	सरदार १०% ई.सी.	शक्ति १०% ई.सी.	सुपरहिट १०% ई.सी.
सुर्यमेथ्रिन १०% ई.सी.			

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./लि.
कपास	फलमा लाग्ने गबारोहरू	<i>Heliothis armigera</i> <i>Earias vitella, E.insulana</i> <i>Petcinophora gossypiella</i>	५०-७०	५५०-७६०	१५०-१०००	७	१.३-३.६
बन्दा	इंट बुट्टे पुतली	<i>Plutell xylostella</i>	६०-७०	६५०-७६०	१००-४००	७	१.९-६.५
रामतोरीया	फलमा लाग्ने गबारो	<i>Earias vitella</i>	६०-७०	६५०-७६०	१००-४००	७	१.९-६.५
भण्टा	फल र डाँठमा लाग्ने गबारो	<i>Leucinodes orbonalis</i>	५०-७०	६५०-७६०	२००-६००	३	१.२-३.२५
उखु	शुरुमा लाग्ने गबारो	<i>Chilo infuscatellus</i>	६०-७०	६५०-७६०	५००-७००	१४	१-१.३
गहुँ	डाँठमा लाग्ने औंसा	<i>Atherigona naqvii</i>	५०	६५०	३००-५००	१४	०.१३-२.१६
सुर्यमुखी	झुसिल कीरा	<i>Spilarctia</i>	६०	६५०	५००-७००	१४	१-१.३
		<i>S. oblique</i>	६०	६५०	५००-७००	१४	१-१.३

व्यापारिक नाम :

टाटा २५% ई.सी.
साईरक्स २५% ई.सी.
साईपर हिट २५% ई.सी.
सुपर किलर २५% ई.सी.
पुनिक्स २५% ई.सी.
प्रिन साईपर २५% ई.सी.
नागसाईपर २५% ई.सी.
सुपर साईपर २५% ई.सी.

साइपरमेथ्रिन २५% ई.सी.
सिम्बुस २५% ई.सी.
अनुकिल २५% ई.सी.
च्यालन्जर २५% ई.सी.
क्रिक्स २५% ई.सी.
हेक्जाकिल २५% ई.सी.
मोलथ्रिन २५% ई.सी.

नागसाईपर २५% ई.सी.
साईपर सिड २५% ई.सी.
अल सुपर २५% ई.सी.
सुर्यमेथ्रिन २५% ई.सी.
किसिप २५% ई.सी.
ज्याक पट २५% ई.सी.
स्टार्क २५% ई.सी.

क्राईसोफस २५% ई.सी.
सुपर फाईटर २५% ई.सी.
साइकोरिन २५% ई.सी.
क्रिसिप २५% ई.सी.
गुग्ली २५% ई.सी.
मोटाल २५% ई.सी.
शक्ति २५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./लि.
कपास	फलमा लाग्ने गबारो	<i>Earias vitella,</i> <i>E.insulana</i> <i>Petcinophora gossypiella</i>	४०-७०	१६०-२८०	४००-८००	७	०.०३५-०.४
	कपासको गबारो	<i>Amrasca biguttula</i> <i>biguttula</i>	४०-७०	१६०-२८०	४००-८००	७	०.०३५-०.४
	थ्रिप्स	<i>Thrips tabaci</i>	४०-७०	१६०-२८०	४००-८००	७	०.०३५-०.४
राम तोरिया	फल र डाँठमा लाग्ने गबारो	<i>Earias vitella,</i>	३७-५०	१५०-२००	५००	२१	०.०३५-०.४
	कपासको गबारो	<i>Amrasca biguttula</i> <i>biguttula</i>	३७-५०	१५०-२००	५००	२१	०.०३५-०.४
भण्टा	फल र डाँठमा लाग्ने गबारो	<i>Leucinodes orbonalis</i>	३७-५०	१५०-२००	५००	२१	०.०३५-०.४
	कपासको गबारो	<i>Amrasca biguttula</i> <i>biguttula</i>	३७-५०	१५०-२००	५००	२१	०.०३५-०.४

३. सामान्य नाम : डेल्टामेथ्रिन

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा : १३५ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

डेसिस २.८% ई.सी.

डेसिस् १०० २.५% ई.सी.

अल डेल २.५% ई.सी.

शस्त्र २.८% ई.सी.

सुर्यासिस २.५% ई.सी.

डेलसिड २.५% ई.सी.

डेलरिन किड २.५% ई.सी.

डेल्टा केयर २.५% ई.सी.

डाईस २.५% ई.सी.

कि सिक्स् सेभियर २.५% ई.सी.

शास्त्र २.५% ई.सी.

एक्प्रेस २.५% ई.सी.

नोट : के-ओथ्रीन, डेल्टामेथ्रिन र लक्ष्य जनस्वास्थ्य प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./ लि.
कपास	फलमा लाग्ने गबारो	<i>Earias vitella, E.insulana Petcinophora gossypiella, Helocverpa armigera</i>	१२.५	५००	४००-६००	७	१.२५-८३
	चुसाहा कीराहरू	<i>Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Amrasca biguttula biguttula, Dysdercus koenigii, Oxyacarenus laetus, Thrips tabaci</i>	१०	४००	२५०-५००	७	०.८-१.६
चिया	थ्रिप्स	<i>Andracia bipunctata</i>	४	१२०-१६०	४००-६००	७	०.२६-०.३
	पात खाने लार्भा	<i>Latoia sp.</i>		१२०-१६०	४००-६००	७	०.२६-०.३
	पात बेरुवा	<i>Gracillaria theivora, Striglina glareola, Homona coffearia</i>	१०	४००	४००-६००	७	०.७५-१
	सेमिलुपर	<i>Biston suppersaria</i>	२.५-३.७५	१००-१५०	४००-६००	७	०.२५
रामतोरिया	डाँठ र फलमा लाग्ने गबारो	<i>Earias vitella</i>	१०-१५	४००-६००	४००-६००	७	१
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula,</i>			४००-६००	७	१
बदाम	पात खन्ने कीरा	<i>Stomopteryx subsecivella</i>	१२.५	५००	४००-६००	७	०.८३-१.२
आँप	आँपको फड्के	<i>Amaritodus atkinsoni, Ideoscopus clypealis, I. niveosparsus</i>	०.३३-०.५	३३०-५००	६००-७००	७	०.५५-०.७१
खुर्सानी	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	१०-१५	४००-५००	४००-६००	७	०.८३३-१
	सूर्तिको लार्भा	<i>Spodoptera litura</i>	१०-१५	४००-५००	४००-६००	७	०.८३३-१
धान, गहुँ (भण्डारण)	घुन	<i>Sitophylus oryzae</i>	३० मि.ग्रा प्रति व.मी.	१.२ ग्राम प्रति व.मी.	१ लि. / ३० व.मी.		३६ ग्राम / ३० व.मी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./ लि.
	खप्रा खपटे	<i>Trogoderma granarium</i>	३० मि.ग्रा प्रति व.मी.	१.२ ग्राम प्रति व.मी.	१ लि./ ३० व.मी.		३६ ग्राम/ ३० व.मी.
	पिठोको खपटे	<i>Tribolium castaneum</i>	३० मि.ग्रा प्रति व.मी.	१.२ ग्राम प्रति व.मी.	१ लि./ ३० व.मी.		३६ ग्राम/ ३० व.मी.
	करौती दाँते	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	३० मि.ग्रा प्रति व.मी.	१.२ ग्राम प्रति व.मी.	१ लि./ ३० व.मी.		३६ ग्राम/ ३० व.मी.
	धानको पुतली	<i>Sitotoroga cerealella</i>	३० मि.ग्रा प्रति व.मी.	१.२ ग्राम प्रति व.मी.	१ लि./ ३० व.मी.		३६ ग्राम/ ३० व.मी.

४. सामान्य नाम : फेन्भालेरेट

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा : ४५० mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

कि-फेन २०% ई.सी.

मोल्टेन २०% ई.सी.

फेनभल २०% ई.सी.

सेटफेन २०% ई.सी.

नागफेन २०% ई.सी.

अनुफेन २०% ई.सी.

अलफेन सुपर २०% ई.सी.

टाटाफेन २०% ई.सी.

सिकोफेन २०% ई.सी.

फेन किड २०% ई.सी.

सुर्यफेन २०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./ लि.
कपास	कपासको गबारो	<i>Heliothis armigera, Earias vitella, E.insulana Petcinophora gossypiella,</i>	७५-१००	३७५-५००	७००-९००	७	०.५५-०.५३
	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	२५-४०	१२५-२००	२५०-४००	७	०.५
	कपासको फड्के	<i>Amrasca giguttula biguttula,</i>	२५-४०	१२५-२००	२५०-४००	७	०.५
	थ्रिप्स	<i>Thrips tabaci</i>	२५-४०	१२५-२००	२५०-४००	७	०.५
रामतोरिया	डाँठ र फलमा लाग्ने गवारो	<i>Earias vitella</i>	६०-७५	३००-३७५	६००-७५०	७	०.५
	कपासको फड्के	<i>Amrasca giguttula biguttula,</i>	६०-७५	३००-३७५	६००-७५०	७	०.५

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./ लि.
काउली, बन्दा	ईट बुटे पुतली	<i>Plutell xylostella</i>	६०-७५	३००-३७५	६००-७५०	७	०.५
	लाहीहरू	<i>Lipaphis erysimi,</i> <i>Brevicoryne brassicae,</i> <i>Myzus persicae, Aphis fabae</i>	६०-७५	३००-३७५	६००-७५०	७	०.५

व्यापारिक नाम :

फेनभल ०.४% डि.पी. रिफेन ०.४% डि.पी. मोफेन ०.४% डि.पी. अलफेन ०.४% डि.पी.
 क्रिफेन ०.४% डि.पी. ट्रम्फकार्ड ०.४% डि.पी. सुर्यकेथ्रिन ०.४% डि.पी. किटगार्ड ०.४% डि.पी.
 नागाफेन ०.४% डि.पी. फ्लेम ०.४% डि.पी. रिफेन ०.४% डि.पी. क्रि-फेन ०.४% डि.पी.
 ब्रुफेन ०.४% डि.पी. देवीफेन ०.४% डि.पी. नुफेन ०.४% डि.पी. यर ०.४% डि.पी.,

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु कि.ग्रा.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल./ लि.
कपास	फलको गबारोहरू	<i>Heliothis armigera, Earias vitella, E.insulana Petcinophora gossypiella,</i>	८०-१००	२०-२५		७	०.५

५. सामान्य नाम : वाइफेनथ्रिन २.५% इ.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा : ५५, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

वाइफ्लेक्स-टि.सी. २.५% इ.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
घरमा	धमिरा	<i>Odontotermes obesus</i>	०.०५%	२०			१

घ) समूह : अन्य

१. सामान्य नाम : एवामेक्टिन १.९% इ.सी. (म्याक्रोसाइकिलक ल्याक्टोन समूह)

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा : २२१ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

भर्टिमिक १.९% इ.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.
गुलाफ	दुई थोप्ले सुलसुले	<i>Tetranychus urtica</i>	२२.५-४५	१३४२	५०००		०.२६
जरबेरा	दुई थोप्ले सुलसुले	<i>Tetranychus urtica</i>	२२.५-४५	१३४२	५०००		०.२६
कारनेसन	दुई थोप्ले सुलसुल	<i>Tetranychus urtica</i>	२२.५-४५	१३४२	५०००		०.२६

२. सामान्य नाम : ईमामेक्टीन बेन्जोएट ५% एस.जी. (म्याक्रोसाइकिलक ल्याक्टोन समूह)
 (कार्य प्रकृति : आन्तरिक (इन्सेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर), मारक मात्रा : १५१६ mg, घातकताको स्तर :III)

व्यापारिक नाम :

प्रोक्लेम ५% एस.जी. एभरकिलर ५% एस.जी. केमदुत ५% एस.जी. ईमाभाप २% ई.सी.
 किडस्टार ५% एस.जी. मिसाईल ५% एस.जी. एन-स्टार ५.७% डब्लु.डि.जी. रियल स्टार ५% एस.जी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
कपास	अमेरिकन बलवर्म	<i>Helicoverpa armigera</i>	९.५-११	१९०-२२०	५००	१०	०.३८-०.४४
भिण्डी	डाँठ तथा फलको गवारो	<i>Earias vitella</i>	६.७५-८.५	१३५-१७०	५००	५	०.२७-०.३४

३. सामान्य नाम : कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड (Nereistoxin)
 (कार्य प्रकृति : दैहिक मारक मात्रा : ३२५, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

कार्डो ४% जी. कान्ती ४% जी. इन्डान ४% जी. पारिरत्न ४% जी.
 क्रिट्याप ४% जी. विकन ४% जी. अनुडान ४% जी. क्यालडान ४% जी.
 सिमिटार ४% जी. मोदान ४% जी.आर. सुर्योरेयल ४% जी. गोल्ड विल्डन ४% जी.
 अलटप ४% जी. किटाप ४ जी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम ग्रा.	पानी लि.	पर्खने दिन	के.जी./रोपनी
धान	धानको गवारोहरू	<i>Scirophaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens</i>	१०००	२५०००		२१	१.२
	धानको पात बेरुवा	<i>Cnaphaiocrosis medinalis</i>	१०००	२५०००		२१	१.२
	धानको गवारोहरू	<i>Scriphopaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens,</i>	१०००	२५०००		२१	१.२
	पात बेरुवा	<i>Cnaphaiocrosis medinalis</i>	७५०-१०००	१८७५०-२५०००		२१	०.९-१.२
	गुभोमा लाग्ने ओैसा	<i>Hydrelia sp.</i>	७५०-१०००	१८७५०-२५०००		२१	०.९-१.२

व्यापारिक नाम :

क्याराभान प्लस ५०% एस.पी. क्याभान ५०% डब्लु.पी. क्यालडान ५०% एस.पी. सुर्यडन ५०% एस.पी. कटाप ५० एस.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम ग्रा.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम वा एम.एल.लि.
धान	धानको गबारोहरू	<i>Scirophaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens</i>	५००	१०००	५००-१०००	२१	१-२ ग्राम/ लि.पानी
	धानको पात बेरुवा	<i>Cnaphaiocrosis medinalis</i>	५००	१०००	५००-१०००	२१	"
	धानको गबारोहरू	<i>Scriphopaga incertulas, S. innotata, Chilo partellus, Sesamia inferens,</i>	७५०	१८७५	५००-१०००	२१	१.८-३.७५
	पात बेरुवा	<i>Cnaphaiocrosis medinalis</i>	७५०-१०००	१८७५०- २५०००	५००-१०००	२१	२.५-३.७५
	गुभोमा लाग्ने ओंसा	<i>Hydrelia sp.</i>	७५०-१०००	१८७५०- २५०००	५००-१०००	२१	"

४. सामान्य नाम : डाइफ्लुवेन्जुरान (IGR)

(कार्य प्रकृति : स्टोम्याक, मारक मात्रा : , घातकताको स्तर :)

नोट : लामखुट्टे नियन्यत्रणको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने

व्यापारिक नाम :

डिमिलिन २५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.
कपास	सूर्तिको लार्भा	<i>Spodoptera</i>	७५-८७.५	३००-३५०	५००-१०००		०.३५-०.६
	फलको गबारोहरू	<i>Earias vitella, E.insulana, Pectinophora gossypiella</i>	७५	३००	५००-१०००		०.३-०.६

५. सामान्य नाम : ईटोफेनप्रक्स

(कार्य प्रकृति : आन्तरिक मारक मात्रा : ३२५, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

न्युकिल १०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	खेरो फड्के	<i>NiaParabata lugens</i>	५०-७५	५००-७५०	५००	१५	०.३-०.६
	धानको गबारोहरू	<i>Scriphopaga incertulas, S. innotata, sesamia inferens, Chilo partellus</i>	५०-७५	५००-७५०	५००	१५	०.३-०.६
	धानको पात बेरुवा	<i>Cnaphaiocrosis medinalis</i>	५०-७५	५००-७५०	५००	१५	०.३-०.६
	दुग्रे कीरा	<i>Orseolia oryzae</i>	५०-७५	५००-७५०	५००	१५	०.३-०.६
	पातमा लाग्ने हारियो फड्के	<i>Nephrotettix nigropictus, N. virescens</i>	५०-७५	५००-७५०	५००	१५	०.३-०.६
	पिङ्गुमा सेतो भएको फड्के	<i>Sogatella furcifera</i>	५०-७५	५००-७५०	५००	१५	०.३-०.६

६. सामान्य नाम : फिप्रोनिल (पाइरोजोल)

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक मारक मात्रा : १२, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

रिजेन्ट ०.३% जि.आर.

पेष्टिसिल जेल ०.०५% जेल

रिजेन्ट ५% ई.सी./एस.सी.

जम्प ८० डब्लु.पी.

श्रीजेन्ट ०.३% जि.आर.

देभिजेन्ट प्लस ५% एस.सी.

स्टलकर ५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल. वा ग्राम/लि.पानी
	गबारोहरू, फड्केहरू, पात बेरुवा, ढुंगे कीरा, गुभोको औंसा	<i>Scriphopaga incertulas, S. innotata, sesamia inferens, Chilo partellus, Nialparabata lugens, Nephotettix nigropictus, N. Virensence, Cnaphaiocrosis medinalis, Orseolia oryzae, Hydrelia sp., Sogatella furcifera</i>	५०-७५	१६.६७-२५ कि. ग्रा	५००	३२	०.०३३-०.०५
	गबारोहरू	<i>Scriphopaga incertulas, S. innotata, sesamia inferens, Chilo partellus,</i>	५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
बन्दा	ईट बुट्टे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	४०-५०	८००-१०००	५००	७	१.६-२
खुर्सानी	थ्रिप्स, लाही, फलको गबारो	<i>Scitothrips doralis, Aphis gossypii, A. cytosorum, Helithis armigera</i>	४०-५०	८००-१०००	५००	७	१.६-२

७. सामान्य नाम : ईमिडाक्लोप्रिड (Neonicotinoid)

(कार्य प्रकृति : दैहिक मारक मात्रा : ४५०, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

प्रिमाइज ३०.५१% एस.सी.

अलमिडा १७.८% एस.एल.

एटोम १७.८% एस.एल.

च्याम्पियन १७.८% एस.एल.

जम्बो १७.८% एस.एल.

मोल्डोर प्लस १७.८% एस.एल.

सुर्यकाउन्टर प्लस ७० डब्लु.एस.

ट्रोपिकल म्याजिक ७०% डब्लु.एस.

पेरिमिडा १७.८% एस.एल.

क्रिकवेट ०.५% वेट

एटोम प्लस ७५% डब्लु.जी.

केमिडा १७.८% एस.एल.

किमिडा १७.८% एस.एल.

नागमिडा १७.८% एस.एल.

सुर्यमिड गोल्ड १७.८% एस.एल.

मिडास १७.८% एस.एल.

मेक्सोफॉर्स १७.८% एस.एल.

आइरिस १७.८% एस.एल.

कन्फीडोर १७.८% एस.एल.

कि-ईमिडा ७०% डब्लु.पी.

क्वीट वेट ०.५% वेट

टाटामिड १७.८% एस.एल.

तेज १७.८% एस.सी.

एडमायर ७०% डब्लु.जी.

एटोम ४% एस.एल.

बिलडोर १७.८% एस.एल.

डाउन २००० १७.८% एस.एल.

टाटामिडा १७.८% एस.एल.

सिमिडा १७.८% एस.एल.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
कपास	लाही, सेतो झिंगा, कपासको फड्के, थ्रिप्स	<i>Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Amrasca biguttula biguttula, Thrips tabaci</i>	१७-२२	१००-१२५	५००-७००	४०	०.१७-०.२
धान	फड्के कीराहरू	<i>NiaLparabata lugens, Nephotettix nigropictus, N.Virensence, Sogatella furcifera</i>	१७-२२	१००-१२५	५००-७००	४०	०.१७-०.२
खुर्सानी	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	२२-४४	१२५-२५०	५००-७००	४०	०.१७-०.२
	लाहीहरू	<i>Aphis gossyphii, Myzus persicae</i>	२२-४४	१२५-२५०	५००-७००	४०	०.१७-०.२
	थ्रिप्स	<i>Scirtotermes obesus, Microtermes obesi</i>	६२	३५०	५००-७००	४०	०.५-०.७
उखु	धमिरा	<i>Odontotermes obesus, Microtermes obesi</i>	६२	३५०	१८७५	४५	०.१८
आँप	आँपको फड्के	<i>Amaritodus atkinsoni, Ideoceopus niveosparsus, I. Clypealis</i>	०.४-०.८ ग्रा. प्रति बिरुवा	२-४ मि.लि. प्रति रुख	१० लि. प्रति रुख	४५	०.१७-०.२

व्यापारिक नाम :

मिडास २०००-१७.८% एस.एल.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
कपास	जेसिड, सेतो झिंगा, लाही, थ्रिप्स	<i>Homopterous</i>	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०	०.१७-०.२
धान	खेरो फड्के, हरियो फड्के	चुसाहा वर्गका कीराहरू	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०	०.१७-०.२
खुर्सानी	जेसिड, लाही थ्रिप्स,		०.०२५-०.०५०	०.१२५-०.२५०	५००-७००	४०	०.१७-०.२
उखु		"	०.०७	०.३५०	१८७५	४५	०.१७-०.२
सुर्यमुखी	जेडि, सेतो झिंगा, थ्रिप्स	"	०.०२०	०.१०	५००	३०	०.१७-०.२
रामतोरिया	जेसिड, थ्रिप्स, लाही	"	०.०२०	०.१०	५००	३	०.१७-०.२

८. सामान्य नाम : प्रोपाजाइट (सलफेट इष्टर)

(कार्य प्रकृति : सम्पक मारक मात्रा : २२००, घातकताको स्तर : III)

नोट : सुलसुले नासक को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने

व्यापारिक नाम :

ओमाइट ५७% ई.सी. ईण्डोमाइट ५७% ई.सी. कि-माईट ५७% एस.पी. किङ्गफिट ७०% ई.सी.

सिमबार ५७% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
स्याउ	दुई थोप्ले सुलसुले	<i>Tetranychus urticae</i>	८५५-१७०	१५००-३०००	१५००- ३०००		१
आरु	माकुले सुलसुले	<i>Eutetranychus sp., Tetranychus sp., Eriophys sp.</i>	८५५-१७०	१५००-३०००	१५००- ३०००		१
आरुबखडा	सुन्तलाको सुलसुले	<i>Panonychus citri</i>	८५५-१७०	१५००-३०००	१५००- ३०००		१
चिया	रातो माकुरे सुलसुले	<i>Oligonychus coffeae</i>	८५५-१७०	१५००-३०००	१५००- ३०००		१
गोलभेडा, भण्टा, खुसानी	सुलसुलेहरू	<i>Tetranychus citri, Hemitarsonemus litus</i>	३४२-५७०	६००-१०००	६००-१०००		१
सुन्तला जात बाली	सुलसुलेहरू	<i>Panonychus citri, Eutetranychus sp., Tetranychus sp., Eriophys sp.</i>	३४२-५७०	६००-१०००	६००-१०००		१

९. सामान्य नाम : नुभालुरोन १०% ई.सी. (IGR)

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा : , घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

रिमोन १०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
बन्दा	डायमण्ड व्याक मथ	<i>Plutella xylostella</i>	७५	७५०	५००-१०००	५	०.७५-१.५
गोलभेडा	फ्रुट बोरर	<i>Heliothis Armigera</i>	७५	७५०	५००-१०००	१-३	०.७५-१.५

१०. सामान्य नाम : लुफेनुरोन ५.४% इ.सी. (IGR)

(कार्य प्रकृति : ITR, मारक मात्रा : , घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

सिगना ५ इ.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
बन्दा	डायमण्ड व्याक मथ	<i>Plutella xylostella</i>	३०	६००	५००	१४	१.२
काउली	डायमण्ड व्याक मथ	<i>Plutella xylostella</i>	३०	६००	५००	५	१.२
चना	पड बोर	<i>Pod fly</i>	७५	७५०	५००-१०००	६५	०.७५-१.५

११. सामान्य नाम : फिप्रेनिल ८०% डब्लु.जी. (पाइराजोल)

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : ९७ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

जम्प द० डब्लु.जी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	धानको डाँठ गवारो	<i>Chilopartes insertullus</i>	४०-५०	५०-६२.५	३७५-५००	१५	०.०१३
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	४०-५०	५०-६२.५	३७५-५००	१५	०.०१३

१२. सामान्य नाम : फिप्रेनिल ५% एस.सी. (पाइराजोल)

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : ९७ mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

रिजेन्ट ५% एस.सी. देभिजेन प्लस ५% एस.सी.

रेफ्री ५% एस.सी. स्टाल्कर ५% एस.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	धानको डाँठ गवारो	<i>Chilopartes insertullus</i>	५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
	खैरो फड्के	<i>Nilparvata lugens</i>	५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
	सेतो पिठ्यु भएको फड्के	<i>Sogatella fursiphera</i>	५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
	दुंग्रेकीरो	<i>Orceolia oryzae</i>	५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
	धानको औंसा		५०-७५	१०००-१५००	५००	३२	२-३
बन्दा	इट बुटे पुली	<i>Plutella xylostella</i>	४०-५०	६००-१०००	५००	७	१.६-२
	थ्रिप्स	<i>Thrips tabasii</i>	४०-५०	६००-१०००	५००	७	१.६-२
खुर्सानी	लाही	<i>Aphis spp.</i>	४०-५०	६००-१०००	५००	७	१.६-२
	फलको गवारो	<i>Helicoverpa amigera</i>	४०-५०	६००-१०००	५००	७	१.६-२
उखु	डाँठको अगौटे गवारो	<i>Chilo infuscatellus</i>	७५-१००	१५००-२०००	५००	९	३-४
	जराको गवारो						

व्यापारिक नाम :

अगाडी-जी ०.०३% जि.आर.

रेफ्री ०.३% जि.आर.

रिजेन्ट ०.३% जि.आर.

श्रीजेन्ट ०.३% जि.आर.

टागाजेन्ट ०.३% जि.आर.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	धानको डाँठ गबारो	<i>Chilopartelles insertullus</i>	४०-५०	५०-६२.५	३७५-५००	१५	०.०१३
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosismedinalis</i>	४०-५०	५०-६२.५	३७५-५००	१५	०.०१३

१३. सामान्य नाम : एसिटामिप्रीड २०% एस.पी. (निकोटिनोइड)

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : २००० mg, घातकताको स्तर :III)

व्यापारिक नाम :

एक्सन २०% एस.पी.

अलका २०% एस.पी

विस्मार्क २०% एस.पी

क्लाईनकिड २०% एस.पी

धन प्रित २०% एस.पी

एक्का २०% एस.पी

गागराईड २०% एस.पी

हरियर २०% एस.पी

स्याजिक २०% एस.पी

स्यानिक २०% एस.पी

मोलिप्रिड २०% एस.पी

नाइजपरमिट २०% एस.पी

पाउण्ड २०% एस.पी

प्राईम २०% एस.पी

शाप २०% एस.पी

शुर्यप्रिड २०% एस.पी

टगराईड २०% एस.पी

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
	फड्के	<i>Ambrasca biguttula biguttula</i>	१०	५०	५००-६००	१५	०.०८-१
कपास	लाही	<i>Aphis gossypi</i>	१०	५०	५००-६००	१५	०.०८-१
	सेतो झिंगा	<i>Bemisia tabaci</i>	२०	१००	५००-६००	१५	०.१६-०.२

१४. सामान्य नाम : थायोमेथोक्सजाम २५% डब्लु.जी. (निकोटिनोइड)

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : २००० mg, घातकताको स्तर :III)

व्यापारिक नाम :

मेक्जीमा २५% डब्लु.जी

एक्टारा २५% डब्लु.जी

अलटाईम २५% डब्लु.जी

एरेभा २५% डब्लु.जी

ब्लाक डायमण्ड २५% डब्लु.जी

क्यापर २५% डब्लु.जी

ईमेज, मोक्जिमा २५% डब्लु.जी

मोलारा २५% डब्लु.जी

पेले २५% डब्लु.जी

रेनोभा २५% डब्लु.जी

स्लायर २५% डब्लु.जी

सकगान २५% डब्लु.जी

थायाप्लस २५% डब्लु.जी

एरो २५% डब्लु.जी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
थान	दुडग्रे कीरा	<i>Orceolio oryzae</i>	२५	१००	५००-७५०	१४	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	२५	१००	५००-७५०	१४	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	खैरो फड्के	<i>Bemisia tabaci</i>	२५	१००	५००-७५०	१४	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	सेतो पिठ भएको फड्के	<i>Sogatella fursiphera</i>	२५	१००	५००-७५०	१४	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	थ्रिप्स	<i>Stenchaetothrips biformis</i>	२५	१००	५००-७५०	१४	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	डाँठको गबारो	<i>Chilo parteles</i>	२५	१००	५००-७५०	१४	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
कपास	फड्के	<i>Ambrasca biguttula biguttula</i>	२५	१००	५००-७५०	२१	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	लाही	<i>Aphis gossipea</i>	२५	१००	५००-७५०	२१	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	थ्रिप्स	<i>Thrips spp.</i>	२५	१००	५००-७५०	२१	१ ग्राम/५-७.५ लि.पानी
	सेतो फिंगा	<i>Bemisia tabasii</i>	५०	२००	५००-७५०	२१	१ ग्राम/ २.५-३.७५ लि.पानी

१५. सामान्य नाम : नोभालुरोन १०% ई.सी. (IGR)

(कार्य प्रकृति : आन्तरिक तथा सम्पर्क, मारक मात्रा : ५००० mg, घातकताको स्तर :III)

व्यापारिक नाम :

रिमोन १०% ई.सी. पेडस्टल १०% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
कपास	अमेरिकन बल वर्म	<i>Helicoverpa armigera</i>	१००	१०००	५००-१०००	४०	१-२
बन्दा	इंट बुट्ट पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	७५	७५०	५००-१०००	५	०.७५-१.५
गोलभेंडा	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	७५	७५०	५००-१०००	१-३	०.७५-१.५

१६. सामान्य नाम : लुफेनुरोन ५.४% ई.सी. (IGR)

(कार्य प्रकृति : इन्सेक्ट ग्रोथ इन्हीबिटर, मारक मात्रा : ५००० mg, घातकताको स्तर :III)
व्यापारिक नाम :
सिग्ना ५.४% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
कपास	अमेरिकन बल वर्म	<i>Helicoverpa armigera</i>	३०	६००	५००-७५०	४८	०.८-१.२
बन्दा	ईट बुटे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	३०	६००	५००	१४	१.२
काउली	ईट बुटे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	३०	६००	५००	५	१.२
रहर	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	३०	६००	५००-१०००	६५	०.६-१.२

१७. सामान्य नाम : ईण्डोक्साकार्ब १५.८% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, तथा आन्तरिक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)
व्यापारिक नाम :

अवायुन्ट १५.८% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल. /लि.पानी
कपास	बलवर्म	<i>Helicoverpa armigera</i>	८०	.५००	५००	१४	१
धान	पात बेरुवा	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	३१	.२००	५००	१४	०.४५
बन्दा	ईटबुटे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	१०	.०५०	५००	५	०.१
रहर	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Marruca vitrat Melanagromyza Obtusa</i>	५०	.३३३	५००	१४	०.७५
भट्टमास	सूर्तिको लाघ्वे, फलको गबारो, वित्ते कीरा, डाँठको फिंगा	<i>Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Achaea janata, Melanagromyza abtusa</i>	५०	.२३३	५००	३१	०.७५
चना	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	५०	.२३३	५००	१८	०.७५

१८. सामान्य नाम : फ्लुवेण्डीयामाईट २०% डब्लु.जी.

(कार्य प्रकृति : डैहिक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

फ्लुवेण्डीयामाईट २०% डब्लु.जी. (कीटनासक)

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि. वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	१ ग्राम /लि.पानी
धान	फेंदको गबारो, पात बेरुवा	<i>Chilo partellus, Cnaphalocrosis medinalis</i>	२५	१२५	५००	३०	०.३०
कपास	अमेरिकन बलवर्म	<i>Helicoverpa armigera</i>	५०	२५०	५००	३०	०.५
घिरौला	फलको फिंगा	<i>Dacus Spp</i>	५०	२५०	५००	३०	०.५
बन्दागोमि	ईटबुटे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	१२.५	६२.५	५००	७	०.१२
गोलभेंडा	फलको गबारो	<i>Dacus dorsalis</i>	५०	२५०	५००	५	०.५

१९. सामान्य नाम : क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% एस.सी. (कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

अलग्रिप २०% डब्ल्यू.जी. (कीटनासक)

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि. वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	१ ग्राम /लि.पानी
धान	फेंदको गबारो, पात, बेरुचा, खेरो फड्के, ढुँगे कीरा, हिस्पा	<i>NiaLparvata lugens, Nephrotix virescens, Orseolio oryzae</i>	९३	५००	५००	१५	१
कपास	अमेरिकन वलवर्म, ज्यासिड	<i>Helicoverpa armigera, Amrasca biguttula biguttula</i>	१११	६००	१०००	१५	०.६
स्याउ	पातको लाभे, भुवादार लाही, डाँठमा लाग्ने गबारो	<i>Orthega spp, Erosoma lanigerum Zeuzera sp,</i>	३६-५४	२००-३००	३००-५००	१५	०.७५
दाल बाली	लाही, फलको गबारो	<i>Apis spp, , Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Marruca vitrat</i>	१८५	१०००	५००	१५	२
तरकारी	फलको गबारो, इटबुट्टे पुतली	<i>Dacus dorsalis, Plutella xylostella</i>	१११	६००	५००	१४	१.२
सुर्ती	पात खाने लाभे	<i>Spodoptera litura</i>	५६	३००	५००	७	०.६
चिया	मुनामा लाग्ने कीरा	<i>Lasperryresia bipunctata</i>	५६	३००	५००	७	०.६

२०. सामान्य नाम : क्लोरफुल्युजुरोन ५.४% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, कीटनासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

न्याक्सील २ डि.एस.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
बन्दा	इटबुट्टे पुतली, सूर्तिको लाभे	<i>Plutella xylostella, , Spodoptera litura</i>	७५	१५००	५००	७	३
कपास	अमेरिकनवल वर्म, पात खाने लाभे	<i>Helicoverpa armigera, Sylepta derogata</i>	७५	१५००	५००	१०	३

२१. सामान्य नाम : फेनोजाक्सिवन १०% डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, कीटनासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

म्याजिष्टर

बाली	शब्दको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
चिया	रातो सुलसुले, गुलाबी, दुई थोप्ले सुलसुले	<i>Oligonychus coffeae</i>	१००	१०००	५००	७	२
खुर्सानी	पहेलो सुलसुले	<i>Tetranychus citri, Hemitarsonemus litus</i>	१२५	१२५०	५००	१०	२.५
स्याउ	रातो सुलसुले, दुई थोप्ले सुलसुले	<i>Oligonychus spp</i> <i>Tetranychus citri,</i>	४०	४००	१०००	३०	०.४

२२. सामान्य नाम : स्पाईरोमेसिफेन २२.९% एस.सी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, कीटनासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम : ओबेरोन २४० एस.सी.

बाली	शब्दको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
भण्टा	रातो सुलसुले	<i>Oligonychus spp</i>	९६	४००	५००	५	०.८
स्याउ	युरोपियन रेडमाईट, रेड स्पाईडर माईट	<i>Oligonychus spp</i>	७२	३००	१०००	३०	०.३
खुर्सानी	पहेलो सुलसुले	<i>Eriophyes gossypii</i> <i>Tetranychus bioculatu</i>	९६	४००	५००	७	०.८
चिया	रातो सुलसुले	<i>Eriophyes gossypii</i> <i>Tetranychus bioculatu</i>	९६	४००	४००	७	१

२३. सामान्य नाम : क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जी.आर.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, कीरा नासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम : फरटेरा

बाली	शब्दको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि. वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	के.जी. प्रति हेक्टर
कपास	फलको गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	७५	१८७५०		१४७	१८.७५
धान	पहेलो गबारो, पात बेरुवा	<i>Sciriphopaga incertulas, S. innotata, sesamia Cnaphaiocrosis medinalis inferens, Chilo partellus</i>	४०	१००००		५३	१०

२४. सामान्य नाम : फेन पाईरोक्सीमेट ५% एस.सी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, कीटनाशक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

र्याक्सील २ डि.एस.

बाली	शब्दुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी.
खुसानी	पहेलो सुलसुले	<i>Panonychus citri</i> , <i>Eutetranychus</i> sp., <i>Tetranychus</i> sp., <i>Eriophys</i> sp.	३०	६००	७५०	३	०.८
चिया	रातो सुलसुले, गुलाबी, दुई थोप्ले सुलसुले	<i>Panonychus citri</i> , <i>Eutetranychus</i> sp., <i>Tetranychus</i> sp., <i>Eriophys</i> sp.	६०	१२००	४००	७	३

२५. सामान्य नाम : निटेनपाइराम (निकोटिनोइड) १०% एस.एल.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : १३७० mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

किंग गार्ड १०% एस.एल.

बाली	शब्दुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
अमिलो जात फलफूल	फ्रुट बोरर	<i>Dorsalis</i> sp.,	२५	२५०	५००	१६	०.५

२६. सामान्य नाम : साइरोमाइजिन (IGR) एस.सी.

(कार्य प्रकृति : इन्सेक्ट गोथ ईन्हीविटर, मारक मात्रा : २००० mg, घातकताको स्तर: III)

व्यापारिक नाम :

किंग हण्टर १०% एस.एल.

बाली	शब्दुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
गोलभेडा, आलु, काँको	पात जोतुवा कीरा, कोलोराडो विटल, सुलसुले, थ्रिप्स	<i>Liriomyza</i> sp., <i>Tetranychus</i> sp.,	५०	५००	५००	७	१

२७. सामान्य नाम-स्पिनोस्याड कार्य प्रकृति- दैहिक

व्यापारिक नाम:- ट्रेसर २४% इ.सी., ट्रेसर ४५% एस.सी., वान अप ४५% एस.सी.,

एम.एल./ली.	शब्दुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				एम.एल./ली
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी ली.	पर्खने दिन	
कपास	फलमा लाग्ने गवारो	<i>Earias vitella</i> , <i>E. insulana</i> , <i>Petcinophora gossypiella</i>	७५-१००	१६५-२२०	५००	१०	०.३३-०.४४
खुसानी	फलमा लाग्ने गवारो, थ्रिप्स	<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Andracaca bipunctata</i>	७३	१६०	५००	३	०.३२
रहर	कोशाको गवारो	<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Lampides boeticus</i> , <i>Marruca vitrat</i> , <i>Melanagromyza obtusa</i>	५६-७३	१२५-१६२	८००-१०००	४७	०.१५७-०.१६२
बन्दा, काउली	इटबुडे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	१५-१७.५	६००-७००	५००	३	१.२-१.४

**२८. सामान्य नाम-स्पाइरोटेराम कार्य प्रकृति- दैहिक
व्यापारिक नाम: डेलिगेट ११.७% एस.सी.**

एम.एल./ली.	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				एम.एल./ली
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मी.ली.	पानी ली.	पर्खने दिन	
कपास	थ्रिप्स सूतीको पात खाने लार्भा फलमा लाग्ने थोप्ले गवारो	<i>Andracia bipunctata</i> <i>Spodoptera litura</i> <i>Earias insulana</i>	५० ५०-५६ ५०-५६	४२० ४२०-४७० ४२०-४७०	५००-१००० ५००-१००० ५००-१०००	३०	०.४२-०.८४
भट्टमास	सूतीको पात खाने लार्भा	<i>Spodoptera litura</i>	५४	४५०	५००-६६५	३०	०.६८-०.९
खुर्सानी	थ्रिप्स फलको गवारो सूतीको पात खाने लार्भा	<i>Andracia bipunctata</i> <i>Helicoverpa armigera</i> <i>Spodoptera litura</i>	५६-६० ५६-६० ५६-६०	४७०-५०० ४७०-५०० ४७०-५००	४००-५०० ४००-५०० ४००-५००	७	१-१.१८

ड) समूह : मिश्रण

१. सामान्य नाम : क्लोरपाइरिफस ५०% + साइपरमेथ्रिन ५%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा : १२५+२५०, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

टेरर आर एल ५५% ई.सी. नागप्लस ५५% ई.सी.
स्पाइन ५०५-५५% ई.सी. लिथल सुपर ५०५-५५% ई.सी.
कार्बाइन ५५% ई.सी. स्टामाप्ट ५५% ई.सी.
फाइटर ५०५-५५% ई.सी. एक्सन ५०५-५५% ई.सी.
डल्फीन ५५% ई.सी. विल्डो ५५% ई.सी.
सुर्यन्युराल ५५% ई.सी. ज्वाला ५५% ई.सी.

बेनसिप ५०५-५५% ई.सी. लानसेट ५०५-५५% ई.सी.
मिसायल ५५% ई.सी. अन्थ ५५% ई.सी.
विल्वो ५५% ई.सी. न्यूरोकोम्ब ५५% ई.सी.
न्युरोकोम्ब ५५% ई.सी. अलफाईटर ५५% ई.सी.
जुडुवा ५५% ई.सी. कोराण्डा ५५% ई.सी.
ट्राइस ५५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
कपास	फलमा लाग्ने गबारोहरू	<i>Pectinophora gossypiella</i> <i>Earias vitella, E.</i> <i>insulana Heliothis armigera</i>	५५०	१	५००-१०००	१५	१-२
	लाही	<i>Aphis gossypii</i>	५५०	१	५००-१०००	१५	१-२
	फड्के	<i>Amrsca biguttula</i> <i>biguttula</i>	५५०	१	५००-१०००	१५	१-२
	थ्रिप्स	<i>Thrips tabaci</i>	५५०	१	५००-१०००	१५	१-२

२. सामान्य नाम : इथियन ४०% + साइपरमेथ्रिन ५%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा : २०८+२५०, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम : एगल ४०५-४५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
कपास	अमेरिकन बल बर्म	<i>Pectinophora</i>	४००+५०	१	५००	१५	२

३. सामान्य नाम : किवनालफस २०% + साइपरमेथ्रिन ३%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा : ६२+२५०, घातकताको स्तर : II)

नोट : चिया बालीमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको

व्यापारिक नाम : साइक्लोन २३% ई.सी.

गोंगा ४०६, २३% ई.सी.

समाट २३% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
भण्टा	डाँठ र फलमा लाग्ने गबारो	<i>Leucinodes orbonalis</i>	८०-९२	३५०-४००	५००-६००	७	०.६-०.७
कपास	फलमा लाग्ने गबारो	<i>Pectinophora gossypiella, Earias vitella, E. insulana Heliothis armigera</i>	२३०-२८७	१०००-१२५०	१०००	१५	१-१.२

४. सामान्य नाम : अल्फासाइपरमेथ्रिन १% + क्लोरपाईरिफस १५% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र आन्तरिक, मारक मात्रा : १३५+४७४, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम : क्लोरथ्रिन

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
कपास	अमेरिकन बल बर्म	<i>Petinophora</i>	४२५	२५००	५००-७५०	१५	३.३३-५
	छिर्के गबारो	<i>Earias vitella</i>	४२५	२५००	५००-७५०	१५	३.३३-५

दुसीनासक (Fungicide)

क) समूह : बेन्जिमिडाजोल

१. सामान्य नाम : कार्बेन्डाजिम

(कार्य प्रकृति दैहिक : मारक मात्रा-५० : १०००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :

डेभिष्टन ५०% डब्लु.पी. एरेष्टिन ५०% डब्लु.पी. डेरोसाल ५०% डब्लु.पी.

अनुष्टिन ५०% डब्लु.पी.

क्युरेटर ५०% डब्लु.पी. बेनफिल ५०% डब्लु.पी. सुपरष्टिन ५०% डब्लु.पी.

एरेष्ट ५०% डब्लु.पी.

रुष्टोन ५०% डब्लु.पी. धनुष्टिन ५०% डब्लु.पी. टागिस्टिन ५०% डब्लु.पी.

फगिस्टिन ५०% डब्लु.पी.

कार्बिन ५०% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.पानी	
धान	ब्लाष्ट	<i>Pyricularia oryzae</i>	१२५-२५०	२५०-५००	२५०-५००	१४	१	बिरुवामा छर्ने
	सिथ ब्लाइट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१२५-२५०	२५०-५००	२५०-५००	१४	१	बिरुवामा छर्ने
	सिथ रट	<i>Sclerotium oryzae</i>	१००	२००	५००	१४	०.४	बीउ उपचार
गहुँ	कालो पोके	<i>Ustilago nuda</i>	१००	२००	५००	१४	०.४	बीउ उपचार
	एनथ्राक्नोज	<i>Collectotrichum sp.</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
कपास	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora gossypina, Alternaria macrospora, Helminthosporium gossypii, Corynespora cassicola</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum sp.</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
रबर	पातको थोप्ले रोग	<i>Corynespora cassicola</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum tabacum</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
सूर्ति	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora nicotianae, Ascochyta phaseolorum</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
	आलंका रिक विरुवाहरू	<i>Colletotrichum antirrhini</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
कपास	पातको थोप्ले रोग	<i>Septoria chrysanthemella, Cercospora calendula, Ascochyta sp., Botrytis sp., Alternaria sp.,</i>	१२५-२५०	२५०-५००	५००	१४	०.५-१	बिरुवामा छर्ने
	फेद कुहिने रोग	<i>Phymatotricum omnivorum</i>	१००	२००	५००	१४	०.४	बीउ उपचार
आलु	कोलार रट	<i>Pythium debaryanum</i>	१००	२००	५००	१४	०.४	बीउ उपचार
	फेद कुहिने रोग	<i>Phytophthora sp.</i>	१००	२००	५००	१४	०.४	बीउ उपचार
सूर्ति	कोलार रट	<i>Phytophthora sp.</i>	१००	२००	५००	१४	०.४	बीउ उपचार
	फेद कुहिने रोग	<i>Thielaviopsis basicola</i>	११२.५	२२५	७५०	१४	०.४५	बीउ उपचार
आलं कारिक विरुवाहरू	कोलार रट	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	११२.५	२२५	७५०	१४	०.४५	बीउ उपचार
	फेद कुहिने रोग	<i>Phytophthora sp.</i>	१००	१००	१००	१४	१	बीउ उपचार
बदाम	कोलार रट	<i>Sclerotinia sp., Phytophthora sp.</i>	१००	१००-२००	१००	१४	१-२	बीउ उपचार
	पातको थोप्ले	<i>Cercospora arachidicola</i>	१२५-२५०	२५०-५००	१००	१४	२.५-५	बीउ उपचार
आलु	ब्ल्याक स्कर्फ	<i>Rhizoctonia solani</i>	५०-७०	१००-१५०	१००		१-१.५	बीउ आलु रोप्नु अघि ३ मिनेट डुबाउने
	स्टम क्यांकर	<i>Helminthosporium solani</i>	५०-७०	१००-१५०	१००		१-१.५	बीउ आलु रोप्नु अघि ३ मिनेट डुबाउने

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.पानी	
गोलभेडा	ओईलाउने रोग	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici</i>	५०	१००	१००	१४	१	बिरुवा रोप्नु अघि १० मिनेट डुबाउने
सिमी	पाउडरी मिल्डयु	<i>Erysiphe polygoni</i>	२५०	५००	२५०	१४	२	पातमा छर्ने
	ग्रे मोल्ड	<i>Botrytis cinerea</i>	२५०	५००	२५०	१४	२	पातमा छर्ने
लहरे बाली	पाउडरी मिल्डयु	<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>	१२५	२५०	५००	१४	०.५	पातमा छर्ने
	एनथ्राक्नोज	<i>Collectotrichum laginarium</i>	१२५	२५०	५००	१४	०.५	पातमा छर्ने
काउली, बन्दा	क्लब रस्ट (जरामा गाँठा पर्ने रोग)	<i>Plasmodiophora brassicae</i>	१००	२५०	५००		०.५	बीउ उपचार
भण्टा	पातको थोप्ले रोग	<i>Alternaria melongenae, Cercospora melongenae</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	बिरुवामा छर्ने
राम तोरिया	पाउडरी मिल्डयु	<i>Erysiphe sp.</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	बिरुवामा छर्ने
	डढुवा	<i>Cercospora abelmoschi, C. hibisci, C. hibiscina, C. malayensis</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	बिरुवामा छर्ने
खुर्सानी	पाउडरी मिल्डयु	<i>Oidiopsis taurica</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	बिरुवामा छर्ने
	फल कुहिने रोग	<i>Collectotrichum capsici</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	बिरुवामा छर्ने
	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora Capsici</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	बिरुवामा छर्ने
	वैरा कुहिने रोग	<i>Pythium aphanidermatum</i>	१९	२ ग्रा./ कि.ग्रा. बीउ	२५०		२ ग्रा./ कि.ग्रा. बीउ	बीउ उपचार
	ओईलाउने रोग	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Redolens</i>	१९	२ ग्रा./ कि.ग्रा. बीउ	२५०		२ ग्रा./ कि.ग्रा. बीउ	बीउ उपचार
उखु	रातो सडन	<i>Glomarella tucumanensis,</i>	२५	५०	१००		०.५	डांठ उपचार
	पाईनएप्पल डिजिज	<i>Ceratocystis paradoxa</i>	२५	५०	१००		०.५	
प्याज	बोट्राईटिस	<i>Botrytis sp.</i>	१२५	२५०	२५०	१४	१	गाना रोप्नु अघि १५ मिनेट डुबाउने
	भण्डारणको सडन	<i>Botrytis spp.</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
स्याउ	दाद	<i>Vemtiroa inequalis</i>	१५	३०	१००	१४	०.३३	

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/ लि.पानी	
अंगुर	पाउडरी मिल्ड्यू	<i>Uncinula necator</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	पातमा छर्ने
	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora viticola</i>	२५	५०	१००	१४	"	
	एनथ्राक्नोज	<i>Elsinoe ampelina</i>	२५	५०	१००	१४	"	
	गें मोल्ड	<i>Botrytis cinerea</i>	२५	५०	१००	१४	"	
आँप	पाउडरी मिल्ड्यू	<i>Oidium mangiferae</i>	५०	१००	१००	१४	१	
	मालफर्मेसन	<i>Fusarium moniliforme</i>	५०	१००	१००	१४	१	
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	५०	१००	१००	१४	१	
	पोष्ट हार्भेष्ट रोगहरू	<i>Diplodia natalensis,</i> <i>Colletichum gloeosporioides,</i> <i>Aspergillus niger,</i> <i>Rhizopus arrhizus</i>	५०	१००	१००	१४	१	फलको उपचार
सुन्तला जात बाली	ब्ल्याक स्पट	<i>Guignardia citricarpa,</i> <i>Phulloctica citricarpa</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
	दाद	<i>Elsinoe fawcetti</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
	पातको थोप्ले रोग	<i>Mycosphaerella horii,</i> <i>M. lageniformis</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
	पाउडरी मिल्ड्यू	<i>Acrosporium tingitanium, Oidium citri</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
केरा	सिगाटोगा	<i>Cercospora musae</i>	१००	२००	१००	१४	२	
	थामको सडन	<i>Botryodiplodia sp.</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
	फलको सडन	<i>Pyricularia griseae</i>	२५	५०	१००	१४	०.५	
कफि	ब्राउन स्पट	<i>Hemileia vastatrix</i>	३७५	७५०	२५०	१४	३	
	बेरी डिजिज	<i>Cercospora coffeicola</i>	३७५	७५०	२५०	१४	३	
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	३७५	७५०	२५०	१४	३	
सूर्ति	फ्रग आई स्पट	<i>Cercospora nicotianae</i>	३७५	७५०	२५०	१४	३	
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum tabacum</i>	३७५	७५०	२५०	१४	३	
	पाउडरी पिल्ड्यू	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	३७५	७५०	२५०	१४	३	
गुलाब	पाउडरी मिल्ड्यू	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	३७५	५०	१००	१४	३	
	सिन्दुरे	<i>Phragmidium mucronatum</i>	२५	५०	१००	१४	३	
	लिफ ब्लच	<i>Actinomyces rosa</i>	२५	५०	१००	१४	३	
धान	खैरो पातको थोप्लो रोग	<i>Cochliobolus miyabeanus,</i> <i>Helminthosporium oryzae</i>	०.६२	१२.५ कि.ग्रा.		१४	३	
	ब्लाष्ट	<i>Pyricularia oryzae</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			३	बीउ उपचारका लागि
	फट रट	<i>Fusarium moniliforme</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			३	
गहँ	लुज स्मट	<i>Ustilago nuda</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			३	
	हिल बन्ट	<i>Tilletia sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			३	

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम / लि.पानी	
	लिफ ब्लाईट	<i>Helminthosporium sativum</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
कपास	फ्युजारियम विल्ट	<i>Fusarium oxysporium</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	भर्टिसिलियम विल्ट	<i>Verticilium sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum indicum</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
बदाम	पातको थोप्ले रोग	<i>Cetcospora personata</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	कोलार रट	<i>Sclerotium rolfsii</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
उखु	रातो सडन	<i>Colletotrichum falcatum</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
सुयमुखी	आईलाउने	<i>Verticillium sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
चना	ग्रे मोल्ड	<i>Botrytis sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	ब्लाईट	<i>Aschochyta sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
भण्टा	एनथ्राक्नोज	<i>Collectotrichum sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	फ्रट रट	<i>Phomopsis sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
प्याज	अल्टरलारिया	<i>Alternaria porri</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	स्मट	<i>Urocystis sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
गोलभेंडा	आईलाउने	<i>Fusarium oxysporium</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	फोमारेट	<i>Phoma destructive</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
खुर्सानी	आईलाउने	<i>Fusarium sp.</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	एनथ्राक्नोज	<i>Colletotrichum capsici</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
केराउ	आईलाउने	<i>Fusarium oxysporium</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	
	एनथ्राक्नोज	<i>Collectotrichum pisi</i>		२.५३/ किग्रा बीउ			४०	

२. सामान्य नाम : थाइफोनेट मिथाईल

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा-५० : ६००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : रोको ७०% डब्लु.पी. किंगसिन एम. ७०% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					मि.लि./ लि.पानी
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन		
मेवा	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Oidicum indicum</i>	५००	७१५	७५०-१०००	४-८	०.७-०.९५	
स्याउ	दाद	<i>Venturia inqualis</i>	५००	७१५	७५०-१०००	३	०.७-०.९५	
गहुँ	ब्राउन रष्ट	<i>Puccinia recondite</i>	५००	७१५	७५०-१०००	१४	०.७-०.९५	
	पछ्यौटे डद्वा	<i>Alternaaria triticina</i>	५००	७१५	७५०-१०००	१४	०.७-०.९५	
गोलभेंडा	रिड रिट	<i>Phytophthora</i>	५००	७१५	७५०-१०००	७	०.७-०.९५	
लौका	एनथ्राक्नोज	<i>Collectotrichum lagenarium</i>	१०००	१४३०	७५०-१०००	७	१.४-१.९	
लहरे बाली	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>	१०००	१४३०	७५०-१०००	७	०.७-०.९५	
रहर	फ्युजारियम विल्ट	<i>Fusarium oxysporum f. sp. udum</i>	१०००	१४३०	७५०-१०००	७	०.७-०.९५	

ख) समूह : डार्इथायो-कार्बामेट्स

१. सामान्य नाम : म्यान्कोजेव

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : ४००० mg, घातकता स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

इन्डोफिल एम ४५-७५% डब्लु.पी.	सुपरम्यान्को एम ४५-७५% डब्लु.पी.	डार्इथेम एम ४५-७५% डब्लु.पी.
ईथेन एम ४५-७५% डब्लु.पी.	बिल्जेव ७५% डब्लु.पी.	आरती एम ४५-७५% डब्लु.पी.
अनु एम ४५-७५% डब्लु.पी.	प्लान्ट एम ४५-७५% डब्लु.पी.	स्पर्स एम ४५-७५% डब्लु.पी.
लियो एम ४५-७५% डब्लु.पी.	धानुका एम ४५-७५% डब्लु.पी.	युथेन एम ४५-७५% डब्लु.पी.
आर एम ४५-७५% डब्लु.पी.	देखीदयाल एम ४५-७५% डब्लु.पी.	हिन्दुस्तान एम ४५-७५% डब्लु.पी.
माउन्ट एम ४५	श्री एम ४५	सुर्य एम ४५ स्कट एम ४५
लुजिम एम ४५	एविक एम ४५	

वाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	कार्य प्रकृति	
गहु	ब्राउन रष्ट	<i>Puccinia recondite</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	सम्पर्क	
	ब्ल्याक रष्ट	<i>Puccinia graminis tritici</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	डढुवा	<i>Alternaria triticina</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
मकै	लिफ ब्लाइंट	<i>Drechslera maydis, Exserohilum turicum</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Peronosclerospora philippinensis, P. sorghi, P. sacchari</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
आलू	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	अघोटे डढुवा	<i>Alternaria solani</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
गोलभेडा	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	पातको थोप्ले रोग	<i>Alternaria Solani</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	बक आई रट	<i>Phytophthora parasitica</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
खुर्सानी	फलको सडन	<i>collectotrichum capsici</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	राईप रट	<i>collectotrichum capsici</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora capsici</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	बेर्ना कुहिने रोग	<i>Pythium aphanidermatum</i>	२२५	३ ग्रा.	१	१४-२८	"	
सिमी	एनधाक्नोज	<i>Collectotichum sp. Gloesporium sp.</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	माटोमा डेन्च गर्ने
	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora sp. Gloesporium sp.</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
खरबुजा	एनधाक्नोज	<i>Collectotichum lagenarium</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	कार्य प्रकृति	
तितेकरेला	एनथ्राक्नोज	<i>Collectotichum laginarium</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
प्याज	लिफ ब्लाइट	<i>Stemphylium vesicarium</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Peronospora destructor</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
अदुवा	पहेंलो रोग	<i>Pythium aphaidermatum, P. myriotylum</i>	४५०	६०० ग्रा	३००	१४-२८	"	
काउली	कोलार रट	<i>Phytophthora sp.</i>	२.२५	३ ग्रा	१	१४-२८	"	बीउ उपचार
	पातको थोप्ले रोग	<i>Alternaria brassicae, A.brassacicola, A.raphani, Mycosphaerella brassicicola</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
बदाम	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora arachidicola</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	१२-१४ दिन पछि
सुर्यमुखी	पातको थोप्ले रोग	<i>Alternaria helianthi</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	बीउ उपचारपछि
	सिन्दुरे	<i>Puccinia helianthi</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
भटमास	सिन्दुरे	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
अंगुर	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora spp., Mycosphaerella anguljita</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Plasmopara viticola</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	एनथ्राक्नोज	<i>Elsinoe ampelina</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
केरा		<i>Verticillium theobromae</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
	रिड रट	<i>Verticillium theobromae, Trachysphaera fructigera</i>	११२५- १५००	१.५-२	७५०	१४-२८	"	
नरिवल	लिफ रट	<i>Helminthosporium</i>	२२.५	३० ग्रा प्रति रुख	१० लि. प्रति रुख	१४-२८	"	
अम्बा	फलको सडन	<i>Macrophomina allahabadensis, phytophthora parasitica</i>	१०	३० ग्रा प्रति रुख	१० लि. प्रति रुख	१४-२८	"	

ग) समूह : ईन्अर्गानिक्स

१. सामान्य नाम : कपर अक्सिसक्लोरोराइड

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : १४४० mg, घातकता स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

क्युरेक्स ५०% डब्लु.पी.
डब्लु.पी.

धानुकोष ५०% डब्लु.पी.

नागकपर ५०% डब्लु.पी.

एरिकप ५०%

अनुकप ५०% डब्लु.पी.

कोलम्बिया ५०% डब्लु.पी.

देशीकपर ५०% डब्लु.पी.

ब्लुकपर ५०%

डब्लु.पी. सुर्यकपर ५०% डब्लु.पी.

ट्रिकोप ५०% डब्लु.पी.

व्हाइटक्स ५०% डब्लु.पी.

अलकप ५०%

डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
केरा	पातको थोप्पे रोग	<i>Cercospora musae</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	फलको सडन	<i>Gloeosporium masarum, Pyricularia griseae</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
खुर्सानी	फलको सडन	<i>Colletotrichum capsici</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
सुन्तला जात बाली	क्यांकर	<i>Phytophthora palmivora</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	फलको सडन	<i>Phytophthora palmivora</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
कफि	कालो सडन	<i>Pellicularia koleroga</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	सिन्दुरे	<i>Hemilia vastatrix</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
धान	पातको थोप्पे रोग	<i>Cocciobolus miyabeanus, Helminthosporium oryzae</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
नरिवल	मुनाको सडन	<i>Phytophthora palmivora</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
आलु	अघौटे डढुवा	<i>Alternaria solani</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	लिफ ब्लाइंट	<i>Phytophthora infestans</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
चिया	ब्लिष्टर ब्लाइंट	<i>Exobasidium vexans</i>	३००	६००	१२५	२१	४.८
	ब्लायाक रट	<i>Corticium invisum</i>	३००	६००	१२५	२१	४.८
	रेड रष्ट	<i>Cephaeluros mycoidea, C. parasitica</i>	३००	६००	१२५	२१	४.८
सूर्ति	फ्रग आई लिफ स्पट	<i>Cercospora nicotianae</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	ब्लायाक स्यांक	<i>Phytophthora parasitica</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	डाउनी मिल्ड्यू	<i>Peronospora tabacina, P. hyoscyami, P. nicitiana, plasmopara tabacina</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
गोलभेंडा	अघौटे डढुवा	<i>Alternaria solani</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३
	अंगुर	<i>Plasmopara viticola</i>	११२५	२२५०	७५०-१०००	२१	२.२५-३

२. सामान्य नाम : सल्फर

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : ३००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :

सलफेक्स ८०% डब्लू.पी. एरिसल्फ ८०% डब्लू.पी. सल्फा प्लस ८०% डब्लू.पी.सुपर सल्फ ८०% डब्लू.पी.
शेरर ८०% डब्लू.पी. इन्साफ ८०% डब्लू.पी. थायोभिट ८०% डब्लू.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु किंग्रा.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि.	
स्याउ	पाउडरी मिल्ड्यू	<i>Podosphaera leucotricha</i>	२०००-४०००	२.५-५	७५०-१०००	१४	३.३-५	१० लि./रुख ३-५ पटक छर्ने

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु कि.ग्रा.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि.	
अंगुर	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Uncinula necator</i>	२०००-४०००	२.५-५	७५०-१०००	१४	३.३-५	१० लि./रुख ३-५ पटक छर्ने
बदाम	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora arachidicola</i>	२०००-४०००	२.५-५	१०००	१४	३.३-५	१० लि./रुख ३-५ पटक छर्ने
केराउ, सिमी	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe polygoni</i>	२५००	३.१३	१०००	१४	३.१३	
आँप	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Oidium magniferae</i>	२५००	३.१३	१०००	१४	३.१३	
सुन्तला जात बाली	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Oidium tingitatum</i>	२५००	३.१३	१०००	१४	३.१३	
खुर्सानी	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Oidiopsis taurica</i>	२५००	३.१३	१०००	१४	३.१३	३-५ पटक छर्ने
तोरी	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe cruciferarum, Erysiphe polygoni</i>	२५००	३.१३	१०००	१४	३.१३	
लौका र अन्य लहरे बाली	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>	२५००	३.१३	१०००	१४	३.१३	३-४ पटक छर्ने
कपास	सुलसुलेहरू	<i>Eriophyes gossypii Tetranychus bioculatu</i>	१५००-२०००	३.७५-५	७५०-१०००	१४	५	
झुत्ते सिमी	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe polygoni</i>	२२५०-३०००	५.६५-७.५	७५०-१०००	१४	७.५	
अंगुर	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>uncinula necator</i>	१२२०	३	७५०-१०००	१४	४	
बदाम	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora arachidicola</i>	२२५०-३०००	५.६५-७	७५०-१०००	१४	७.५	
आँप	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Oidium mangiferae</i>	१५००-२०००	३.७५-५	७५०-१०००	१४	५	
केराउ, सिमी	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe polygomii</i>	२२००-३०००	५.६५-७.५	७५०-१०००	१४	७.५	
चिया	गुलावी र बैजनी सुलसुले	<i>Brevipalpus obovatus, Tetranychus bioculatus, Acaphylla indica, A. theae, Acerina gossypii, oligonychus coffeae</i>	१०००-२०००	२.५-५	७५०-१०००	१४	३.३-५	

घ) समूह : अन्य

१. सामान्य नाम : क्याप्टान

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : ९००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :

हेक्साक्याप ५०% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
स्याउ	दाद	<i>Venturia inequalis</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
अंगुर	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Plasmopara viticola</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
बन्दा, काउली	बेर्ना कुहिने रोग	<i>Rhizoctonia solani, Pythium aphanidermatum</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
आलु	अघौटे डढुवा	<i>Alternaria solani</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
गोलभेंडा	अघौटे डढुवा	<i>Alternaria solani</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
	बेर्ना कुहिने	<i>Pythium sp., Phytophthora parasitica, Rhizoctonia solani</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
खुसानी	बेर्ना कुहिने रोग	<i>Pythium aphanidermatum</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
सूर्ति	बेर्ना कुहिने रोग	<i>Pythium aphanidermatum, Phytophthora palmivora</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३
कफि	पातको थोप्ले रोग	<i>Mycosphaerella cofeicola</i>	१२५०	२.५	७५०-१०००		२.५-३.३

२. सामान्य नाम : हेक्जाकोनाजोल

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : २९६० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :

क्रिजोल ५% डब्लु.पी. सितारा ५% डब्लु.पी. कक्फर्ट ५% डब्लु.पी. टाइटान ५% डब्लु.पी.

उडान ५% डब्लु.पी. हेक्जाम्याक्स ५% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
धान	ब्लाष्ट	<i>Pyricularia oryzae</i>	५०	१०००	५०००	४०	१ ग्राम/५ लि. पानीमा
	सिथ ब्लाईट	<i>Rhizoctonia solani</i>	५०	१०००	५०००	४०	
बदाम	पातको थोप्ले रोग	<i>Cercospora arachidicola</i>	७५	१५००	५००	३०	३ ग्राम/लि.
आँप	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Oidium mangiferae</i>	५ ग्रा. प्रति १०० लि.	१०० मि.लि. प्रति १०० लि.	आवश्यकता अनुसार	३०	१
स्याउ	स्याउ	<i>Venturia inequalis</i>	२.५ ग्रा. प्रति १०० लि.	५० मि.लि. प्रति १०० लि.	आवश्यकता अनुसार	३०	०.५

३. सामान्य नाम : जिनेव ७५% डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : समर्पक, मारक मात्रा-५० : > ५०००mg, घातकता स्तर : NH)
व्यापारिक नाम :

इण्डोफिल जेड ७८ अल जेड ७८

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि. पानी
गहुँ	रष्ट	<i>Puccinia</i> spp.			७५०-१०००	२०	०.५
धान	ब्लाष्ट	<i>Pyricularia oryzea</i>			७५०-१०००	२०	०.५
मकै	डदुवा	<i>Helminthosporium</i>			७५०-१०००	२०	०.५
खुर्सानी	फल कुहिने तथा थोप्ले रोग	<i>Colletotrichum, Cercospora</i>			७५०-१०००	३	०.५
भण्टा	डदुवा	<i>Phomopsis vexans</i>			७५०-१०००	५-७	०.५
जिरा	अगौटे डदुवा	<i>Alternaria</i> spp.			७५०-१०००	१५-२१	०.५
बेसार	पातको थोप्ले	<i>Helminthosporium</i> spp.			७५०-१०००	७-१४	०.५
आलु	अगौटे र पछ्यौटे डदुवा	<i>Phytophthora, Alterneria</i>			७५०-१०००	१४-२१	०.५
गोलभेंडा	अगौटे र पछ्यौटे डदुवा	<i>Phytophthora, Alterneria</i>			७५०-१०००	१४-२१	०.५
स्याउ	दाढे, कालो सडन, सुती ब्लोच, फ्लाई स्पीक	<i>Venturia Sphacropsis</i>			१० लि. प्रति रुख	३०	०.५
सुन्तला	ग्रिजि स्पट				७५०-१०००	३०	०.५
अंगुर	डाउनी मिल्ड्यु	<i>peronospora</i> spp.			७५०-१०००	८-१०	०.५

४. सामान्य नाम : मेटाल्याकिजल

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा-५० : ६७० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :

रयालकसी ३५% डब्लु.पी. रिल्याक्सिल ३५% डब्लु.पी.

अलमेटा ३५% डब्लु.पी.

सुर्याल्याकिजन ३५% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
मकै	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Scleropthora</i> spp	२४०	७००	७००	३.५-४ महिना	१
बाजरा	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Scleropthora</i> spp	२४०	६००	७००	३-३.५ महिना	०.८५
ज्वार	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Scleropthora</i> spp	२४०	६००	७००	३.५-४ महिना	०.८५
सुर्यमुखी	डाउनी मिल्ड्यु	<i>sclerospora</i> spp.	२४०	६००	७००	३.५-४ महिना	०.८५
तोरी	सेतो रष्ट	<i>Albugo candida</i>	२४०	६००	७००	३.५-४ महिना	०.८५

५. सामान्य नाम : क्लोरोथालोनिल

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : >१०००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : जटायु ७५% डब्लु.पी.

कवच ७५% डब्लु.पी. प्रोटेक्टर

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी .
आलु	डंडुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	६६०-९३७.५	८८०-१२५०	६००-८००	१४	१.४६-१.५६
स्याउ	दाद	<i>Venturia inaequalis</i>	१५०	२००	१२००	४५	०.१६
बदाम	पातको टिका	<i>Cercospora arachidicola</i>	६६०-९७५	८८०-१२५०	६००-८००	१४	१.४६-१.५६

६. सामान्य नाम : प्रोपिनेव ७० डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : ८५००mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : एन्ट्रोकोल

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्रा लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
स्याउ	दाद	<i>Venturia ineqalis</i>	२१०	३००	१००	३०	३ ग्राम
आलु	अर्ली, लेट ब्लाइट	<i>phytophthora infestans</i>	२१०	३००	१००	३०	
खुर्सानी	डाइव्याक	<i>coleotrichum spp.</i>	२१०	३००	१००	३०	
गोलभेडा	बक आइरट		२१०	३००	१००	३०	

७. सामान्य नाम : मेतिराम ७० डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : >१०००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : पोलिराम

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.पानी
गोलभेडा	अल्टरनेरिया ब्लाइट	<i>Alternaria solani</i>	१७५०	२५००	५००-७५०	६	३.३३-५
बदाम	टिका	<i>Cercospora spp.</i>	१४००	२०००	५००-७५०	१६	२.६६-४

८. सामान्य नाम : प्रोपिकोनाजोल २५% इसी (डाइक्लोरोफिनाइल)

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा-५० : १३२० mg, घातकता स्तर : II)

व्यापारिक नाम :टिल्ट २५% इ.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
गहुँ	कालोपोके, ऐंजेरु	<i>Ustilago tritici</i>	१२५ मिलि	५००	७५०	३०	२ मि.लि./ ३ लि. पानी
धान	सिथ ब्लाइट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१२५ मिलि	५००	७५०	३०	"
बदाम	अर्लिं/लेट लिफ स्पट	<i>cercospora spp.</i>	१२५ मिलि	५००	७५०	१५	"
चिया	ब्लिस्टर ब्लाइट		३९. २५-६२.५० मिलि	१२५-२५०	१७५-२५०	७	"
भटमास	रष्ट	<i>Puccinia spp.</i>	१२५ मिलि	५००	५००	२६	"

९. सामान्य नाम : थायोफोनेट मिथाईल- ७० डब्ल्यु.पी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : ६००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :एन्ट्रोकोल

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.
आलु/ गोलभेंडा	सेतो ढुसी	<i>Sclerospora spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	स्क्याव	<i>Venturia inequalis</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	रट	<i>Pythium Spp.</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	थोप्ले रोग	<i>Alternaria spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
खुर्सानी काँक्रो	पाउडरी मिल्ड्यु	<i>Erysiphe spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	थोप्ले रोग	<i>Alternaria spp.</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	रट	<i>colletotrichum spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	ब्लाईट		३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	सेतो ढुसी	<i>Peronospora parasitica</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	थोप्ले रोग	<i>Alternaria spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
काउली	सेतो ढुसी	<i>Erysiphe spp</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम
	थोप्ले रोग	<i>Alternaria spp.</i>	३५०	५००	५००	२-६	१ ग्राम

१०. सामान्य नाम : फ्लुसिलाजोल ४०% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, तथा दैहिक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

न्युस्टार ४०% ई.सी. (दुसीनासक)

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
अंगुर	धले दुसी	<i>Uncinula necator</i>	५००	१२५०	५००	१५	१
स्याउ	दादे रोग	<i>Venturia inaequalis</i>	५००	१२५०	५००	१०	१
धान	सिथ ब्लाइट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१२०	.३००	५००	२४	०.७५
खुर्सानी	धुले दुसी	<i>Oidiodopsis taurica</i>	६०	.१५०	५००	५	०.३०

११. सामान्य नाम : टेबुकोनाजोल २% डि.एस.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, दुसीनासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम : रेकिसल २% डि.एस.

बाली	रोगको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि. वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम प्रति के.जी. बीउ
गहुँ	ब्लाइट	<i>Pyranophora tritici</i> <i>P. repentis</i>	१.२५	ग्राम विषादी प्रति के.जी. बीउ			१.२५
बदाम	जरा, डाँठ तथा फेंद कुहिने रोग	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici</i>	२.५	ग्राम विषादी प्रति के.जी. बीउ			२.५

१२. सामान्य नाम : डाइफिनाकोनाजोल २५% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : १७९६, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

स्कोर २५ ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
बदाम	टिका	<i>Cercospora spp.</i>	२५	१००	१००	३४	१
	सिन्दुरे	<i>Puccinia spp.</i>	२५	१००	१००	३४	१
स्याउ	दादे	<i>venturia ineqaulis</i>	२५	१००	१००	१४	१

१३. सामान्य नाम : पेन्सिक्रोन २२.९% एस.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा : ५०००, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम : मोनसेरिन

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	सिथब्लाइट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१५०-१८५	६००-७५०	५००	७९	१.२-१.५

१४. सामान्य नाम : डाईमिथोमोर्फ ५०% डब्लु.जी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : ४३००, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम : किडस्टभल ५० डब्लु.जी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
आलु	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
गोलभेंडा	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Peronospora parasitica</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
	पछौटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
	फेंद कुहिने	<i>Fusarium oxysporum</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
खुर्सानी	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Peronospora parasitica</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
	पातको थोप्ले रोग	<i>Alternaria spp</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
काँको	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Peronospora parasitica</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
काउली	डाउनी मिल्ड्यु	<i>Peronospora parasitica</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
	हवाईट रष्ट	<i>Albugo candida</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३
	पातको थोप्ले रोग	<i>Alternaria spp</i>	३२५-७५०	७५०-१५००	५००		१.५-३

१५. सामान्य नाम : डाईनोक्याब ४८% इ.सी.

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा : ५०० mg, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम : क्याराथियन

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
भिण्डी, खुर्सानी, सिमी, फर्सी	धुले ढुसी	<i>Erysiphe spp</i>	१०८	२२५	७५०	२१	१ एम.एल. / ३ लि. पानी
केराउ, गहुँ, स्याउ, वयर, मेथी, जिरा	धुले ढुसी	<i>Erysiphe spp</i>	१४४	३००	७५०-१०००	३०-४५	१-१.२५ एम.एल. / ३ लि. पानी
आँप	धुले ढुसी	<i>Erysiphe spp</i>	२४०	५००	५००		१
गुलाफ	धुले ढुसी	<i>Erysiphe spp</i>	०.९६	२	१०		१ ग्राम/५ लि.पानी

१६. सामान्य नाम : भेलिडामाईसिन ३% एल.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : २००००mg, घातकताको स्तर : NH)
व्यापारिक नाम : ओजोरो

बाली	रोगको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
धान	सिथब्लाईट	<i>Rhizoctonia solani</i>	६०	२०००	७५०	२१	२.६६ एम.एल./लि.पानी
केराऊ, गहुँ स्याउ, बयर, मेथी, जिरा	धुले दुसी	<i>Erysiphe spp</i>	१४४	३००	७५०-१०००	३०-४५	१-१.२५ एम.एल./३ लि.पानी
आप	धुले दुसी	<i>Erysiphe spp</i>	२४०	५००	५००		१
गुलाफ	धुले दुसी	<i>Erysiphe spp</i>	०.९६	२	१०		१ग्राम/५ लि.पानी

१७. एजस्ट्रोबिन २५ ई.सी. (Aroxystrobin 25% EC)

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा : > ५००० mg, घातकताको स्तर : NH)
व्यापारिक नाम : एभर साइक्लोन

बाली	रोगको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
धान	सिथब्लाईट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१२५	७००	३५०	७	२.०० एम.एल./लि.पानी
केराऊ, गहुँ स्याउ, बयर, मेथी, जिरा	धुले दुसी	<i>Erysiphe spp</i>	१२०	७००	५००	७	१-१.२५ एम.एल./३ लि.पानी
गोलभेडा	अगौटे र पछ्याटे डुड्वा	<i>Alternaria spp,</i> <i>Phytophthora spp</i>	१२५	५००	२५०	३	२.०० एम.एल./लि.पानी
खुर्सानी	फल कुहिन र पाउडरी मिल्डू	<i>Colletotrichum capsici</i> (Sydow.) <i>Leveillula taurica</i>	१२५	५००	५००-७००	५	१ एम.एल./लि.पानी

१८. सामान्य नाम : कासुगामाईसिन

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : १०००० mg, घातकता स्तर : NH)
व्यापारिक नाम :

कासु-वि ३% एस.एल.

बाली	शब्दुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लीटर	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
धान	ब्लाष्ट	<i>Pyricularia oryzae</i>	५०-३०	१०००-१५००	७५०-१०००	३०	१.३-१.५

ड) समूह : मिश्रण

१. सामान्य नाम : कार्बोन्डाजिम १२% + म्यान्कोजेव ६३%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : १०००००+४००० mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम :

सफाया ७५% डब्लु.पी. साफ ७५% डब्लु.पी. सुर्यसाफ ७५% डब्लु.पी. कम्पानियम ७५% डब्लु.पी.

सफल ७५% डब्लु.पी. अलस्टन ७५% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	ब्लाष्ट	<i>Pyricularia oryzae</i>	५६३	७५०	७५०	५७	१
बदाम	पातको थोप्पे	<i>Cercospora arachidicola, Phaceosariopsis personatum</i>	३७५	५००	५००	७२	१
	रोग	<i>Puccinia arachidis</i>	३७५	५००	५००	७२	१

२. सामान्य नाम : कार्बोकिजन १७% + थाइराम १७%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : ३८२०+५६० mg, घातकता स्तर : III+II)

राईजोवियम संग मेल खाने

व्यापारिक नाम : भाइटाभ्याक्स २०० एफ.एफ. भाइटाभ्याक्स २०० बि.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	बीउ उपचार
कोषे	दुसिंजन्य	<i>Rhizoctonia, Pythium, Fusarium</i>		२५० मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीउ			१
बालिहरू	रोगहरू						
मकै	स्मट	<i>Ustilago zae</i>		२५० मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीउ			१
धान	सिथ	<i>Rhizoctonia solani</i>		२५० मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीउ			१
ब्लाइट							
जुनेलो	स्मट	<i>Sphaerotheca sorghi</i>		२५० मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीउ			१
भटमास	फोमोप्सिस	<i>Rhizoctonia, Pythium, Fusarium</i>		२५० मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीउ			१

३. सामान्य नाम : कार्बेक्चिन ३७.५% + थाइराम ३७.५%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : II)

नोट : बीऊ उपचारको प्रयोग

व्यापारिक नाम : भाइटाभ्याक्स २०० बि

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति के.जी. बीऊ				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/ के.जी. बीऊ
बदाम	कोलार रट	<i>Sclerotium rolfsii</i>	१.८७-२.६३	२.५-३.५			२.५-३.५
	झाइ रट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१.८७-२.६३	२.५-३.५			२.५-३.५
	सिड मोल्ड	<i>Aspergillus, Penicillium</i>	१.८७-२.६३	२.५-३.५			२.५-३.५
तरकारीहरू	सिड वर्न रट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१.८७	२.५			२.५
		<i>Pythium spp.</i>	१.८७	२.५			२.५
		<i>Fusarium spp.</i>	१.८७	२.५			२.५
सुर्यमुखी	सिड वर्न रट	<i>Rhizoctonia solani</i>	१.८७	२.५			२.५

४. सामान्य नाम : मेटाल्यक्सिसल ८% + स्यान्कोजेव ६४%

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क र दैहिक, मारक मात्रा-५० : २२७+४००० mg, घातकता स्तर : II+NH)

व्यापारिक नाम :

रिडोमिल गोल्ड ७२% डब्लु.पी.

माट्को ७२% डब्लु.पी.

माष्टर ७२% डब्लु.पी.

साइलाक्जील एम जेड ७२% डब्लु.पी.

हिमिल ७२% डब्लु.पी.

अनुमिल एम ७२% डब्लु.पी.

क्रिल्याक्जील एम जेड ७२% डब्लु.पी.

धानुक्सील ७२% डब्लु.पी.

युनिल्याक्स ७२% डब्लु.पी.

द्रेट ७२% डब्लु.पी.

स्याग्नेट ७२% डब्लु.पी.

अलक्लोमिसल ७२% डब्लु.पी.

टागमिल ७२% डब्लु.पी.

मेटामेन ७२% डब्लु.पी.

श्रील्याक्सिसल ७२% डब्लु.पी.

सुयाक्सिसल गोल्ड ७२% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.पानी
अंगुर	डाउनी मल्ड्यु	<i>Plasmopara viticola</i>	२०००	२५००	५००	३५ दिन वा सो भन्दा बढी	५
सूर्ति	बेर्ना कुहिने रोग	<i>Pythium aphanidermatum</i>	३६००	५०००	५००	३५	१०
	पछाटे डढुवा	<i>Phytophthora palmivora</i>	१४४०	२०००	१०००	३५	२
आलु	पछाटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	१६००	२५००	१०००	३५	२.५
	त्वाईट राष्ट	<i>Albugo candida</i>	१६००	२५००	१०००	३५	२.५
तोरी	अल्टरनेरिया	<i>Alternaria brassicae</i>	१६००	२५००	१०००	३५	२.५
	डाउनी मल्ड्यु	<i>Peronospora parasitica</i>	१४४०	२०००	५००	३५	४

५. सामान्य नाम : फेमोक्साईडन १६.६% + साईमोक्जानिल २२.१०% एस.पी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, रोग नासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम : डैक्वेसन प्रो.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	१ ग्राम/लि.पानी
अंगुर	डाउनी मल्ड्यु	<i>Plasmopara viticola</i>	१९३	५००	५००	२७	१
आलु	पछाटे डढुवा	<i>Phytophthora infestans</i>	१९३	५००	५००	४०	१
गोलभेंडा	अगौटे तथा पछाटे डढुवा	<i>Alternaria solani</i> , <i>Phytophthora infestans</i>	१९३	५००	५००	३	१

६. सामान्य नाम : टेवुकोनाजोल ५०% + ट्राईकलोरिक्सस्ट्रोबिन २५% डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, दुसीनासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम : नेटिवो ७२% डब्लु.पी.

बाली	रोगको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
धान	लिफ एण्ड सिथ ब्लाईट	<i>Rhizoctonia solani</i>	५०+१०	२००	५००	२१	१

७. सामान्य नाम : मेटसल्फुरोन मिथाईल १०% + क्लोरिम्युरोन १०% डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, चौडा पाते भारनासक, मारक मात्रा mg, घातकताको स्तर :)

व्यापारिक नाम :

अलमिक्स (चौडापाते भारनासक)

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.वा ग्राम	पानी लि.	पर्खने दिन	१ ग्राम/ली.पानी
धान	साईपेरियस ईरिया, साईपेरस डिफोर्मिस		५	२०	३००	९०	०.०६

भारपातशक (Herbicide)

क) समूह : एमाईड्स्

१. सामान्य नाम : व्यूटाक्लोर

(कार्य प्रकृति : Selective उम्रनु पुर्व, मारक मात्रा : ३३००, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

स्याचेट ५०% ई.सी.

बेटा ५०% ई.सी.

ट्रयाप ५०% ई.सी. धनुक्लोर ५०% ई.सी.

मिलक्लोर ५०% ई.सी.

जोल्ट ५०% ई.सी.

हन्टर ५०% ई.सी.

अनुक्लोर ५०% ई.सी.

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तथारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी	
धान	मोथे भार, सामा बन्सो, कोदे भार, भूंगराज, मोथे भार, ल्वाड भार, जिब्रे पाते भार	<i>Cyperus diformis, C. iria, Echinochloa crusglli, E. Colonus, Elucine indica, Eclipta alba, Fimbristylis miliacea, Ludwigia purviflora, Sphenoclea zeylanica</i>	१२५०-२०००	२५००-४०००	२५०-५००	९०-१०५	८-१०	भारपात उम्रनु अगाडि छर्ने
राम तोरीया, आलु	सामा बन्सो, कोदे भार, मोथे भार, ल्वाड भार	<i>Echinochloa crusglli, E. Colonus, Elucine indica, cyperus rotundus, C. iria, Ludwigia purviflora</i>	१०००-१५००	३३००-५०००	२५०-५००	९०-१२०	१०-१३.२	रोप्नु अघि वा पछि छर्ने वा सिचाइ गर्दा छर्ने। यदि बीउ छरेको भए २-३दिन पछि छर्ने
धान	सामा बन्सो, कोदे भार, मोथे भार, ल्वाड भार	<i>Echinochloa crusglli, E. Colonus, Elucine indica, cyperus rotundus, C. iria, Ludwigia purviflora</i>	१२५०-१८७०	२५००-३५००	२५०-५००	९०-१०५	७-१०	

व्यापारिक नाम :

अनुक्लोर ५% जि.आर.

स्याचेट ५% जि.आर.

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तथारी वस्तु	पानी लीटर	पर्खने दिन	ग्राम/रोपनी
धान	सामा, दुबो, बन्सो, कोदे, मोथे भार,		१२५०-२०००	२५-४०		९०	१.२-२

ख) समूह : युरिया डेरिभेटिप्स

१. सामान्य नाम : आईसोप्रोटुरोन

(कार्य प्रकृति ; मारक मात्रा : १६००, घातकताको स्तर : II)

Note : Post Emergence use

व्यापारिक नाम :

धार ७५% डब्लु.पी.

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लीटर	पर्खने दिन	ग्राम/लीटर
गहुँ	रगते भार, जै भार	<i>Phalaris minor, Avena fatua</i>	१०००	१३००	६००	६०	२.१६

ग) समूह : अन्य

१. सामान्य नाम : ग्लाइफोसेट

(कार्य प्रकृति : Pre-Emergence or pre-sowing application in the annual crops (Non selective), मारक मात्रा : ४२३०, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

ग्लाइसेल ४१% एस.एल. राउण्ड अप ४१% एस.एल. ब्रेक ४१% एस.एल. पिनअप ४१% एस.एल.
ग्लाइबीड ४१% एस.एल. हाईज्याक ४१% एस.एल. अलकिल ४१% एस.एल. ग्लाइएटर ४१% एस.एल.

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी	
गहुँ	गुमपाते, बैथे	<i>Leneas aspawana, Chenopodium album</i>	५००-८४०	६२५-१००० मि.लि.	४००		१.५-२.५	रोप्नु अघि वा पछि छर्ने वा सिंचाई गर्दा छर्ने । यदि बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
चिया	मकै पाते भार, दुबो, सिरु, पिरे लहरा, बन्सो	Axonopus compressus, Cynodon dactylon, imperata cylindrica, Polygonum perfoliatum, Digitaria sp.	४१०-८२०	१-२ कि.ग्रा.	४००		२.५-५	रोप्नु अघि वा पछि छर्ने वा सिंचाई गर्दा छर्ने । यदि बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
मकै	लुँडे भार	<i>Amaranthus sp</i>	१०००	१.२५ लि.	४००	१२०	३.१२	रोप्नु अघि वा पछि छर्ने वा सिंचाई गर्दा छर्ने । यदि बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
धान	मोथे भार, बन्सो, दुबो	<i>Cyperus difformis, Paspalum sp., Cynodon dactylon</i>	१२५०-२०००	२.५-४ लि.	४००	९० दिनपछि	६.२५-१०	रोप्नु अघि वा पछि छर्ने वा सिंचाई गर्दा छर्ने । यदि बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
चिया	मकै पाते भार, दुबो, सिरु, पिरे लहरा, बन्सो	<i>Axonopus compressus, Cynodon dactylon, imperata cylindrica, Polygonum perfoliatum, Digitaria sp.</i>	८२०-१२३०	२-३ लि.	४००	२१	५-७.५	चियाको विरुवाको बीच बीचमा

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी	
सुन्तला जात बाली	मकै पाते भार, दुबो, सिरु, पिरे लहरा, बन्सो	<i>Axonopus compressus, Cynodon dactylon, imperata cylindrica, Polygonum perfoliatum, Digitaria sp.</i>	२०००	२.५ लि.	४००	६ महिना	६.२५	विरुवाको बीच बीचमा
अंगुर	मकै पाते भार, दुबो, सिरु, पिरे लहरा, बन्सो	<i>Axonopus compressus, Cynodon dactylon, imperata cylindrica, Polygonum perfoliatum, Digitaria sp.</i>	२०००	२.५ लि.	४००	६ महिना	, ,	विरुवाको बीच बीचमा
कफि	मकै पाते भार, दुबो, सिरु, पिरे लहरा, बन्सो	<i>Axonopus compressus, Cynodon dactylon, imperata cylindrica, Polygonum perfoliatum, Digitaria sp.</i>	२०००	२.५ लि.	४००	६ महिना	, ,	विरुवाको बीच बीचमा
बाँझो जमिन	सबैखाले भारहरू	All annual and perennial weeds	८२०	२	४००		५	

२. सामान्य नाम : अक्सिसफ्लोरफेन

(कार्य प्रकृति Selective Pre-Emergence, मारक मात्रा : ५०००, घातकताको स्तर : NH)

Note : Pre-Emergence

व्यापारिक नाम : अक्सिसगोल्ड २३.५% ई.सी.

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी
धान	सामा बन्सो, मोथे भार, भूंगराज	<i>Echinochloa sp., Cyperus iria, Eclipta alba,</i>	१५०-२४०	६५०-१०००	५००	१५	१.३
चिया	बन्सो, सिरु, आलु भार	<i>Digitaria sp., Imperata sp., Paspalum sp., Borreria sp.,</i>	१५०-२५०	६५०-१०००	५००	१५	१.३
आलु	बेथे, मोथे, गुजुरपुर्णी	<i>Chenopodium sp., Cyperus sp., Trianthema sp.,</i>	१००-२००	४२०-८५०	५००	१५	०.८४-१.७
प्याज	बेथे, मोथे	<i>Chenopodium sp., Amaranthus sp.,</i>	१००-२००	४२०-८५०	५००	१५	०.८४-१.७
बदाम	सामा, बन्सो,	<i>Echinochloa sp., Digitaria sp.</i>	१००-२००	४२०-८५०	५००	१५	०.८४-१.७

३. सामान्य नाम : पाराक्वायट

(कार्य प्रकृति : नन् सेलेक्टीभ, मारक मात्रा : १७५, घातकताको स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

डाइक्लोरोइड २४% एस.एल.

ग्रामोक्सजोन

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
गहुँ	भारहरू साधरो तथा चौडा पाते भारहरू		१०००	४.२५	५००	१००	८.५
उखु			५००	२.०	५००		४
अंगुर			५००	२.०	५००	९०	४
आलु			५००	२.०	५००		४
धान			३००-६००	१.२५-३.५	५००		२.५-७
चिया			२००-१०००	०.८-४.२५	४००		२-१०.६
स्याउ			७५०	३.२५	७००-९००		४.६४-३.२५
कफि			२५०	१.०	४००		२.५
मकै			२००	०.८	५००		१.६

४. सामान्य नाम : प्रेटिलाक्लोर ५०% इसी (अफसेट)

(कार्य प्रकृति : सेलेक्टीभ, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : रिफिट

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु लि.	पानी लीटर	पर्खने दिन	मि.लि./ लि.पानी
धान	मोथे, ल्वाड भार, जिब्रे भार, दादभेरी		५००-७००	५००-७००	१०००-१५००	७५-१०	०.५-४६

५. सामान्य नाम : एट्राजिन ५०% डब्लु.पि.

(कार्य प्रकृति : प्रिंझिमरजेन्स, मारक मात्रा : १८६९, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम : रसायनजिन

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/लि.	
मकै	मोथे भार, बन्सो, कोदे भार, मोथे भार, हिरनखुरी	<i>Cyperus diformis, Ciria, Echinochloa crusglli, E. Colonum, Elucine indica, , Ludwigia purviflora,</i>	५००-१०००	१०००-२०००	५००-७००		२-२.६	बीउ उम्रनु अघि छर्ने
उखु	बन्सो,	<i>portulace oleracea, Digitaria Spp., Euphorbia spp., tribulus terrestris</i>	५००-२०००	१०००-४०००	५००-७००		२-२.८	रोप्नु अघि वा पछि छर्ने वा सिचाइ गर्दा छर्ने । यदि बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
आलु	बन्सो, बेथे	<i>Digitaria spp., chenopodium album, spicula arvensis</i>	२५०	५००	५००-६००		०.८३-१	

६. सामान्य नाम : पेण्डमिथालिन ३०% ई.सी.

(कार्य प्रकृति : प्रिंझरजेन्स्, सेलेक्टीभ मारक मात्रा : ५०००, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम : टाटापनिङा

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी	
भट्टमा;	बन्सो, चौलाही, चिरचिरे भार,	<i>Portulace oleracea, Echinochloa Spp., Euphorbia spp., Trianthema app., Eleusine indica</i>	७५०-१०००	२५००-३३००	५००-७००		४.७१-५	बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
कपास	बन्सो, बेथे	<i>Portulace oleracea, Echinochloa Spp., Euphorbia spp., Trianthema app., Eleusine indica, Digitaria spp., chenopodium album, sparcula arvensis</i>	७५०-१२५०	२५००-४९६५	५००-७००		५-५.९	बीउ छरेको भए २-३ दिन पछि छर्ने
धान रोप्ने		<i>portulace oleracea, Echinochloa Spp., Eleusine indica, Marsilia quadrifolia, fimbriostylis miliaceae, Alternanthera sessilis, Eclipta alba, Ludvigia parviflora, cyperus difformis</i>	१०००-१५००	३३००-५०००	५००-७००		६.६-७.४	
गहुँ		<i>Phalaris minor; portulace oleracea, Echinochloa Spp., Melilotus alba, Anagallis arvensis, fumaria parviflora, poa annua</i>	१०००	३३००	५००-७००		६.६	

७. सामान्य नाम : अक्सिसडार्जील ८०% डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : प्रि तथा अर्लि पोष्ट ईमरजेन्स्, सेलेक्टीभ मारक मात्रा : ५०००, घातकताको स्तर : III)

व्यापारिक नाम : टपस्टार

बाली	भारको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					ग्राम /लि.
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन		
रोप्ने धान	जंगली धान, मोथा,	<i>Echinochloa Spp., Eleusine indica, fimbriostylis miliaceae, Alternanthera sessilis, Eclipta alba, Ludvigia parviflora, cyperus difformis</i>	१००	१२५	५००	९७	०.२५	

मुसानाशक (Rodenticide)

क) समूह : एन्टिकोगुल्याण्ट

१. सामान्य नाम : ब्रोमाडिओलोन

(कार्य प्रकृति : रत्तप्रवाही, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : II)

व्यापारिक नाम : न्याटोक्स ०.००५%

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				मात्रा
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	
धान	खेतको मुसा	<i>Bandicota bengalensis</i>					१ भाग गहूङ्को विठ्ठो १ भाग गैड वा धिउ १ भाग खुवाउने ५-७ दिन सम्म विषादी विसाएर चारा बनाइ चुवाउने
	ठलो खेतको मुसा	<i>Bandicota indica</i>					
	डहरे मुसा	<i>Rattus rattus</i>					
	खेतको मुसा	<i>Bandicota sp.</i>					
गहुँ	खेतको मुसा	<i>Rattus norvegicus</i>					
चना	डहरे मुसा	<i>Rattus rattus</i>					
	खेतको मुसा	<i>Rattus norvegicus</i>					
बदाम	खेतको मुसा	<i>Rattus norvegicus</i>					
	ठलो खेतको मुसा	<i>Bandicota indica</i>					
उखु	खेतको मुसा	<i>Rattus norvegicus</i>					
	ठलो खेतको मुसा	<i>Bandicota indica</i>					
नरिवल, बाँस	डहरे मुसा	<i>Rattus rattus</i>					
बस्ती क्षेत्र	खेतको मुसा	<i>Rattus norvegicus</i>					
थन्क्याईएका	घरको ठलो मुसा	<i>Mus musculus</i>					
	डहरे मुसा	<i>Rattus rattus</i>					
सरसमान	ठलो खेतको मुसा	<i>Bandicota indica</i>					

ख) समूह : अन्य

१. सामान्य नाम : जिङ्क फस्फाईड

(कार्य प्रकृति : एकल मात्रा आन्तरिक, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

न्याटोल ८०% डब्लु.पी. जिङ्क फस्फाईड ८०% डब्लु.पी. सिन्फस ८०% डब्लु.पी. जिङ्क फस ८०% डब्लु.पी.
न्याटोल ८०% डब्लु.पी. कमाण्डो ८०% डब्लु.पी. क्याच ८०% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	तयारी चारा
विभिन्न बाली खेत र घर गोठहरू	विभिन्न खालका मुसाहरू	<i>Rattus rattus</i> <i>Rattus norvegicus</i> <i>Mus musculus</i> <i>Bandicota indica</i> <i>Bandicota bengalensis</i>	१८ भाग गहूङ्को पिठो १ भाग भेली वा मोलासेस् वा सिंधेमाछा १ भाग जिंकफस्फाईड मिसाएको चारा १८:१:१ को चारा तयार आफैले गर्नुपर्छ				३-४ दिन सम्म खाली चारा खुवाउने त्यस पछि १८:१:१ को चारा खुवाउने
	विभिन्न खालका मुसाहरू	<i>Rattus rattus</i> <i>Rattus norvegicus</i> <i>Mus musculus</i> <i>Bandicota indica</i> <i>Bandicota bengalensis</i>					
	विभिन्न खालका मुसाहरू	<i>Rattus rattus</i> <i>Rattus norvegicus</i> <i>Mus musculus</i> <i>Bandicota indica</i> <i>Bandicota bengalensis</i>					

व्याकटेरियानाशक (Bacteriacides)

१. सामान्य नाम : स्ट्रप्टोमाइसिन सलफेट + टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ९:१ एस.पि.

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर :)

व्यापारिक नाम : क्रोसिन एजी, अलसिल

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिश मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	एम.एल. /लि.	
स्याउ	फायर ब्लाइट	<i>Erwinia amylovora</i>			१० लि./बोट		०.२५-०.०५ ग्रा/लि.पानी	२०-३०% फुल फुलेपछि छर्ने
सिमी	हेलो ब्लाइट				४००		०.१-०.१५ ग्रा/लि.पानी	फोलिएर स्पे
सुन्तला जात	खतिरे रोग	<i>Xanthomonas citri</i>			१० लि./बोट		०.५-०.१ ग्रा/लि.पानी	फोलिएर स्पे
कपास	विभिन्न व्याकटेरिया				४००		०.०१-०.०५ ग्रा/लि.पानी	बीज उपचार
आलु	व्याकटेरियल ब्राउन रट	<i>Pseudomonas solancearum</i>			४००		०.०४-०.१ ग्रा/लि.पानी	बीज उपचार
टमाटर/ खुर्सानी	व्याकटेरियल ब्लाइट	<i>Pseudomonas solancearum</i>			४००		०.०४-०.१ ग्रा/लि.पानी	"
धान	व्याकटेरियल ब्लाइट	<i>Xanthomonas campestris</i>			४००		०.०४ ग्रा/लि.पानी	बिरुवाको जरा डुबाउने

सुलसुलेनाशक (Acaricides)

१. सामान्य नाम : डाईकोफोल

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : ६९० mg, घातकता स्तर : II)

व्यापारिक नाम : कोलोनेल एस १८.५% ई.सी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी	
चिया	सुलसुले	<i>Oligonychus coffeae</i>	०.०५%	२७००	१०००			२.७
बदाम		<i>Tetranychus sp., Hemitarsonemus ljtus</i>	०.०५%	१३५०	५००			२.७
रामतोरिया		<i>Panonuchus citri, Euterenushus sp., Tetranychus sp., Eriophus sp.,</i>	०.०५%	१३५०	५००			२.७

शंखेकीरा/चिप्लेकीरानासक

१. सामान्य नाम : मेटलडिहाईड

(कार्य प्रकृति : सम्पर्क, मारक मात्रा-५० : २२७mg, घातकता स्तर : II)

व्यापारिक नाम :

व्लिटजेम १५% पिलेट

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु	पानी लि.	पर्खने दिन	ग्राम/रोपनी	
	शंखेकीरा/चिप्लेकीरा		१५ ग्रा/के.जी.	५० ग्रा. प्रति वर्ग मिटर				शंखेकीरा हिडने जतातै र बिरुवा नजिक चारा राख्ने। वर्षाद पछि राख्दा बढी प्रभावकारी हुने।

वानस्तिक तथा जैविक विषादीहरू

१. सामान्य नाम : एजाडिराकिटन

(कार्य प्रकृति : विकर्षण एवं अस्थि पैदा गर्ने मारक मात्रा : ५००० mg, घातकताको स्तर : NH)

नोट : विकर्षण एवं अस्थि पैदा गर्ने विषादी

व्यापारिक नाम :

मल्टीनिम ०.०३% ई.सी.	निकोनिम ०.१५% ई.सी.	निकोनिम १% ई.सी.	निकोनिम ०.३०% ई.सी.
ओजोनिम त्रिशुल १% ई.सी.	निम्बसिडिन ०.०३% ई.सी.	मल्टीनिमोर ०.१५% ई.सी.	ओजोनिम त्रिशुल ५% ई.सी.
ओजोनिम त्रिशुल १% ई.सी.	नीमेट १०% ई.सी.	नीम - एफ	

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु मि.लि.	पानी लि.	पर्खने दिन	मि.लि./लि.पानी	
कपास	फलमा लाग्ने हेलिओथिस गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>	०.७५	२५००	५००-७५०	३	३. ३२-५	
	कपासको लाही	<i>Aphis gossypii</i>	०.७५	२५००	५००-७५०	३		
	कपासको फड्के	<i>Amrasca biguttula giguttula</i>	०.७५	२५००	५००-७५०	३		
	सेतो फिंगा	<i>Bemisia tabaci</i>	०.७५	२५००	५००-७५०	३		
उखु	सेतो फिंगा	<i>Aleurolobus barodensis</i>	२.५	२५००	५००-७५०	३		

२. सामान्य नाम : व्यासिलस थरिन्जियन्सस

(कार्य प्रकृति : स्टोम्याक + दैहिक, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

हल्ट डब्लु.पी.

व्याकिटसाइड

वायोलेप डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम ग्रा.	पानी लिटर	पर्खने दिन	ग्राम/लि.पानी	
कपास	फलमा लाग्ने हेलिओथिस गबारो	<i>Helicoverpa armigera</i>		५००-१०००	५००-१०००			१-२
	थोप्ले गबारो	<i>Earias vitella, E. isulana</i>			५००-१०००			१-२
	कपासको गुलाबी गबारो	<i>Pectinophora gossypiella</i>			५००-१०००			१-२
बन्दा	ईट बुटे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>			५००-१०००			१-२
रहर	कोशामा लाग्ने गबारो	<i>Helicoverpa armigera, Lampides boeticus, Marruca vitrata</i>		१०००-१२५०	५००-१०००			१. २५-२

३. सामान्य नाम : व्युभेरिया बेसियाना

(कार्य प्रकृति : स्टोम्याक + दैहिक, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : III)

व्यापारिक नाम :

दमन १% डब्लु.पी. वावर १% डब्लु.पी.

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्रा.	पानी लीटर	पर्खने दिन	ग्राम/ लि.पानी
बन्दा	ईट बुट्टे पुतली	<i>Plutella xylostella</i>	१० ग्रा.	२५००	५०० लि.		५

व्यापारिक नाम :

वायोपावर १.१५% डब्लु.पी. (सम्पर्क)

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्राम	पानी लीटर	पर्खने दिन	ग्राम/ लि.पानी
कपास	बल बर्म	<i>Petinophera gossypiella</i>	२३ ग्रा.	२०००	४००		५

४. सामान्य नाम : टाइकोडर्मा भिरीडी

(कार्य प्रकृति : दैहिक, मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : वायोम्योर-एफ

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर					कैफियत
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्रा.	पानी लिटर	पर्खने दिन	ग्राम/के.जी. बीउ	
बदाम	बेर्ना ओइलाउने रोग	<i>Phytophthora.</i> <i>Phytium etc.</i>	४६ मि. ग्रा.	४ ग्राम प्रति के.जी. बीउ			४	बीउ उपचार
			२८ ग्राम	२.५ के.जी/ १०० के.जी कम्पोष्ट			२.५	माटो उपचार
गहुँ	कालोपोके रोग	<i>Ustilago nuda</i>	४६ मि. ग्रा.	४ ग्राम प्रति के.जी. बीउ			४	बीउ उपचार

५. सामान्य नाम : सिउडोमोनास फ्लुरोन्सेन्स ०.५% डब्लु.पी.

(कार्य प्रकृति : मारक मात्रा-५० : mg, घातकता स्तर : NH)

व्यापारिक नाम : स्पर्शा

बाली	शत्रुको नाम	वैज्ञानिक नाम	सिफारिस मात्रा प्रति हेक्टर				
			सक्रिय तत्व ग्रा.	तयारी वस्तु ग्रा.	पानी लिटर	पर्खने दिन	ग्राम/के.जी. वा लिटर
धान	सिथ ब्लाइट	<i>Rhizoctonia solani</i>		१०			१० ग्राम/ के.जी. बीउ
खुर्सानी	ड्याम्पिङ अफ	<i>Pythium spp.</i>		१०			१० ग्राम/ के.जी. बीउ
केरा	पनामा विल्ट			२५००	१०००		२.५ ग्राम/लि.
गोलभेंडा	विल्ट	<i>Ralstonia spp</i>		१०			१० ग्राम/ के.जी. बीउ
चना	विल्ट	<i>fusium spp.</i>		२५			२५ ग्राम/ के.जी. बीउ
उखु	Red rot Dampingoff	<i>colletotrichum</i> <i>falcatum</i>		१०			१० ग्राम/ के.जी. बीउ

केहि आर्थिक महत्व बोकेका कीरा तथा रोग पहिचान र व्यवस्थापन

मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजीकीरा र यसको व्यवस्थापन

परिचय :

अमेरिकन फौजीकीरा (American Fall Armyworm-FAW, *Spodoptera frugiperda*) मकै बालीमा लाग्ने पुतली वर्गको रात्रीचर कीरा हो । यो कीरा काउली बन्दामा लाग्ने सूर्तिको लार्भा (Tobacco Caterpillar) सँग धेरै हदसम्म मिल्देजुल्दो हुन्छ । अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रहरूको रैथाने मानिने यस कीराको लार्भाले मकै लगायत ३५३ विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरूमा नोक्सानी पुऱ्याउन सक्ने तथ्य जानकारीमा आएको छ । मुख्यतया, मकै बाली मन पराउने यस कीराले मकै नपाएमा जुनेलो, धान, गहुँ, कोदो, उखु, घाँसे बालीहरू, काउली वर्गका तरकारी बालीहरू, तेल बालीहरू, काँको लगायतका लहरे तरकारी, बदाम, भट्टमास, प्याज, कपास, गोलभेडा, आलु बालीहरूमा समेत क्षति पुऱ्याउन सक्दछ ।

यो कीरा आक्रामक तवरले छिट्टै ठुलो क्षेत्रमा फैलन सक्ने चिह्नाहा प्रवृत्तिको हुन्छ । उपयुक्त आहारा तथा आवहवाको खोजीमा यो कीराको वयस्क पुतली अण्डा पार्नु अगाडि ५०० किलो मिटर टाढासम्म पनि उडेर जान सक्दछ । सन् २०१५ सम्म अमेरिकामा सीमित रहेको यो कीरा सन् २०१६ मा पहिलो पटक अफ्रिकी देश नाइजेरीयामा पहिचान भई हालसम्म त्यस महादेशका अन्य थप ३० देशहरू, र सन् २०१८ को मई महिनामा एसिया महादेशमा भारतको कर्नाटका राज्यमा पहिचान भई हालसम्म अन्य देशहरू जस्तै बंगलादेश, श्रीलंका, स्यानमार, भियतनाम, थाईल्याण्ड, इण्डोनेशीया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेसिया, चीन, ताइवान तथा यमनमा फेला परिसकेको छ । नेपालमा यस कीराको प्रवेश गरेको आधिकारिक पुष्टि मिति २०७६ श्रावण २७ गते बसेको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनको १९औं बैठकले देशका विभिन्न स्थानहरूबाट संकलित नमुनाहरूको डीएनए परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाहरूको आधारमा गरेको थियो ।

क्षतिको लक्षण

लार्भा अवस्थाले मकैको पात, गुभो, धानचमरा, जुँगा, घोगा तथा डाँठमा समेत क्षति पुऱ्याउँछ । भुण्डमा पारिएका फूलहरूबाट



अमेरिकन फौजीकीराको विभिन्न अवस्थाका लार्भाहरूले मकै बालीमा पुर्याएको क्षति

तस्वीर: सहदेव हुमागाई, हरि कुमार श्रेष्ठ, माधव भट्ट

निस्कने वित्तकै सानो लार्भाले शुरुमा वरिपरिको पातको बाहिरी सतहमा मात्र कोत्रे खान्छ, जसले गर्दा पातमा सिसाको भ्रयाल जस्तो आकृतिहरू देखिन्छन् । त्यसपछि यी लार्भाहरू आँफैले बनाएको रेसाहरू र हावाको मदतले अन्य बोटहरूमा फैलिन्छन् । कलिलो अवस्थाको मकैको गुबोभित्र प्वाल पारी पस्दै खान थाल्दछन् र बिरुवा बढौ जाँदा पातमा लहरै स-साना प्वालहरू परेको देख्न सकिन्छ । लार्भाहरू बढौ जाँदा परभक्षि स्वभावका समेत हुन्छन् । कीराको आकमण भएको ठाउँमा काठको धुलो जस्तो विष्टा पनि प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ । यस कीराबाट अत्यधिक आकमण भएको अवस्थामा मकैमा असिनाबाट भएको क्षति जस्तै पातहरू छियाछिया भएको देखिन्छ । बिरुवा हुक्दै जाँदा मकैको धान चमरा, जुँगा र घोगामा समेत पसर यसले नोक्सान गर्न सक्दछ ।

जीवनचक तथा पहिचान

अन्य पुतली वर्गका कीराहरूजस्तै यस कीराको पनि जीवनचकमा ४ अवस्थाहरू (अण्डा, लार्भा, प्युपा र वयस्क) हुन्छन्, जुन पुरा गर्न २८ देखि ४८ दिनसम्म लाग्ने गर्दछ भने नेपालमा खुमलटारको प्रयोगशालामा गरिएको अध्ययन अनुसार २७ दिग्री सेल्सियसमा २७ देखि ३२ दिनसम्म लागेको पाइएको छ । अत्यधिक वर्षाको अवस्थामा यसको जीवन चकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । नयाँ ठाउँमा पहिलो पुस्ता अन्यत्रबाट आएर आकमण गर्ने र त्यस पछि उष्ण हावापानी भएका क्षेत्रमा वर्षमा ४ देखि ६ पुस्तासम्म र चिसो मौसम हुने क्षेत्रमा २ पुस्तासम्म हुनसक्ने अनुमान छ ।



अण्डा : वयस्क पोथी पुतलीले रातको

समयमा सामान्यतया पातको तल्लो सतहमा सरदर १ देखि २ सयको संख्यामा भुण्डमा पारिएका अण्डालाई पेटमा भएको खैरौ कत्लाजस्तो भुवा दली ढाकेर सुरक्षित राख्दछ । शुरुमा नौनी जस्तो सेतो, हरियो वा खैरो रंगका अण्डाहरू परिपक्व हुँदै जाँदा कालो रंगमा परिणत हुन्छन् । अण्डा गुम्बज आकारका हुन्छन् । मौसमको अवस्था हेरिकन यिनीहरू सामान्यतया ३ देखि ५ दिनसम्म (कहिलेकाही २ देखि १० दिनसम्म) मा लार्भाहरू निस्कन्छन् ।

लार्भा : वयशक लार्भाको निधारमा दुईवटा आँखाको बिच भागमा अङ्गेजी अक्षरको उल्टो Y जस्तो चिन्ह देखिन्छ । यसको पेटको आठौं खण्डको माथितिर (शरिरको करिब अन्तिम भागतिर) वर्गाकार रूपमा मिलेर रहेका ४ वटा काला थोप्लाहरू स्पष्ट रूपमा देखन सकिन्छ । शरिरको अन्य भागमा पनि केही उठेका काला थोप्लाहरू र ती थोप्लामा मसिना रौहरू पनि देखिन्छन् । लार्भाको शरीरको माथिल्लो भागमा तीनवटा हल्का पहेलो रंगका धर्काहरू टाउको पछाडि देखि पेटको अन्तिम भागसम्म समानान्तर रूपमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । लार्भाको अवस्था आहार तथा तापकम्को आधारमा १४ देखि २१ दिनसम्म रहन सक्दछ ।

लार्भा पूर्णरूपमा विकसित हुन ५ पटक काचुली फेरेपछि मात्र प्युपा अवस्थामा जान्छ ।

प्युपा : यो कीराको प्युपाको रंग रातो खैरो हुन्छ । पूर्ण विकसित लार्भा सामान्यतया माटोभित्र गई माटो तथा जैविक पदार्थहरूलाई रेशमी धागोले जोडी कोकुन बनाई त्यसभित्र अचल (प्युपा) अवस्थामा जान्छ । प्युपा ९ देखि १३ दिनसम्मको अचल अवस्थापछि रातमा वयस्क पुतलीहरू निस्कन्छन् ।



चित्र डिजाइन: ललित साह*

बयस्क पुतली : बयस्क पुतलीहरू खरानी मिश्रित खेरो रंगका हुन्छन् र रातीमा सक्रिय हुन्छन्। भाले पुतलीको अधिल्लो पखेटाहरूको टुप्पो तिर ठुलो सेतो धब्बा हुन्छ भने बीच तिर अण्डाकार हल्का खेरो रंगको धब्बा देखिन्छ। पोथी पुतलीमा यस्ता धब्बाहरू देखिएनन्।

भाले तथा पोथी पुतली दुवैको पछिल्लो बयस्क पुतली: बायाँ - भाले पुतली : अगिल्लो पखेटामा सेता धब्बाहरू, दायाँ - पोथी पुतली पखेटा सेतो र भित्री किनारामा कालो

धर्सा भएको हुन्छ।



Photo: Left- ©Lyle J. Buss, Right: ©CABI/Matthew Cock

व्यवस्थापन :

यो खतरनाक कीरा भएकोले सबै सरोकारबालाहरू र कृषकहरू यस कीराको व्यवस्थापनको निम्नि चनाखो हुनुपर्छ। यो कीराको व्यवस्थापनको निम्नि एउटै मात्र उपाय प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले यो कीराको व्यवस्थापनका लागि निम्न बमोजिमका एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्छ।

- ✓ खेतबारीमा मकै उम्बेदेखि नियमित रूपमा अनुगमन गरी कीराको उपस्थिति र सम्भावित क्षतिको आँकलन गर्नुपर्दछ।
- ✓ मकैको घोगामा समेत नोक्सान गर्नसक्ने भएकाले खोस्टाले पूरा घोगा छोपिने जातको मकै लगाउने।
- ✓ एउटा पकेट क्षेत्रमा सकेसम्म एकै समयमा र अगाडि मकै रोप्ने।
- ✓ मकैको एकल बाली लगाउनु भन्दा कोशेबाली अन्तरबाली वा मिश्रित बालीको रूपमा लगाउँदा कीराको प्रकोप कम हुन्छ।
- ✓ डेस्मोडियम घाँस एक किसिमको गन्ध आउने जुन यो कीरालाई मन नपर्ने हुनाले विकर्षक बालीको रूपमा मकैको बीच बीचमा लगाउने र छेउछाउमा पासो बालीको रूपमा नेपियर घाँस लगाएर कीरालाई आकर्षित गरी नेपियरमा मात्र विषादी प्रयोगद्वारा मार्न सकिन्छ।
- ✓ बिरुवालाई स्वस्थ्य र कीराको क्षति सहनसक्ने बनाउन सिफारिस गरिए अनुसार सन्तुलित मलखादको प्रयोग गर्ने।
- ✓ मकै रोप्नु अघि इमिडाक्लोप्रिड (Imidacloprid) ४८ प्रतिशत एफ एस विषादी प्रति किलोग्राम बीउमा ४ मि.लि.का दरले बीउ उपचार गरेर रोप्दा शुरुको ३ हप्तासम्मको बिरुवाहरूलाई क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ।
- ✓ निरीक्षणको क्रममा पातको तल्लो सतहमा झुण्डमा पारिएका अण्डाहरू संकलन गरी नष्ट गर्ने।
- ✓ पातमा सेता लाञ्चा झिल्ली सहितका प्वाल (Papery window) हरू देखा परेमा नीमजन्य विषादी एजाडिराकिटन १५०० पीपीएम (Azadirachtin 1500 ppm) ५ मिली लिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने।
- ✓ मकैको पातमा लार्भाले क्षति गरेको प्वालहरू तथा गुभोमा क्षतिको लक्षण देखा परेमा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित पहिरन लगाई निम्नानुसारका रासायनिक विषादीहरू आलोपालो गरी विषादी मिसाएको घोल प्रति रोपनी २५ लिटरका दरले प्रयोग गर्नु पर्दछ।
 - स्पाइनेटोराम (Spinetoram) ११.७ एस.सी. १ मि.लि. प्रति २ लिटर पानीका दरले वा
 - इमामेक्टिन बेन्जोएट (Emamectin Benzoate) ५ प्रतिशत एस.जी. १ ग्राम प्रति २.५ लिटर पानीका दरले वा
 - क्लोरएन्ट्रान्लीप्रोल (Chlorantraniliprole) १८.५ प्रतिशत एस.सी. १ मि.लि. प्रति २.५ लिटर पानीका दरले वा
 - स्पाइनोस्याड (Spinosad) ४५ प्रतिशत एस.सी. १ मि.लि. प्रति ३ लिटर पानीका दरले मिसाएर छर्ने।
- ✓ लार्भा हुर्केपछि तथा मकैको घोगा लाग्न थाले पछि विषादीको प्रयोग प्रभावकारी नहुने हुँदा विषादी प्रयोग नगर्ने।

त्यसैले, मकै बालीमा कीराको क्षतिको लक्षणहरू देखिनासाथ विषादीको प्रयोग वा अन्य व्यवस्थापन विधि अपनाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्दा सुरक्षात्मक उपायहरू (मास्क, चस्मा, पुरा बाहुला भएको लुगा र जता लगाएर) अवलम्बन गर्नुपर्दछ । पर्खनु पर्ने समयको ख्याल गरौं र जथाभावी विषादीको दुरुपयोग नगरौं ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू : Fall Armyworm in Africa, A guide for integrated pest management, CIMMYT ; Identification and management of fall armyworm *Spodoptera frugiperda*. ICAR-Indian Institute of Maize Research; Identification and management of fall armyworm. Technical Bulletin. University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamonga, India; *Spodoptera frugiperda* (fall armyworm) <https://www.cabi.org/cpc/datasheet/29810>; मकैबालीमा लाग्ने अमेरीकन फौजीकीरा, अजय श्री रत्न बज्राचार्य, बिनुभाट र डा. प्रेम निधि शर्मा कीट विज्ञान महाशाखा खुमलटार, ललितपुर; नेपालमा मिचाहा सिपाही कीरा (Fall Armyworm) भित्रिने सम्भावना र यसबाट हुन सक्ने जोखिमहरू, शालिक राम अधिकारी, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, FAO & CABI,Community- Based Fall Armyworm (*Spodoptera frugiperda*) Monitoring, Early Warning and Management, Training of the Trainers Manual

धानको खैरो फड्के कीरा व्यवस्थापन

तयार कर्ता:
राजिबदास राजभण्डारी, बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत

समस्या पहिचान

तराइमा धानको खैरो फड्के धानको प्रमुख शत्रु कीराको रूपमा देखिएको छ। यसको प्रकारोप धेरै भएमा धान बालीलाई पूरै सखाप पार्न सक्छ। यसको आकार सानो खैरो रंगको हुन्छ र धानको फेदमा पानीको सतहमाथि बसेको हुन्छ। यस कीराको बयस्क तथा बच्चा दुबैले पातको फेदबाट रस चुसेर खान्छ। शुरु अवस्थामा यसको आक्रमणबाट गाँज कम आउने र बोट होगो हुने हुन्छ। सामान्यतया शुरुमा तल्ला पातहरु र पछि माथिल्ला पातहरु पहेला भएर जान्छन्। अन्तमा पूरै धानका बोटहरु चकला चकला गरी सुकेर मर्छन जसलाई होपर बर्न भनिन्छ। धेरै लागेको ठाउमा काचुली फेरेका सेता खोस्टा पानीमा तैरिएको देखिन्छ। यस कीराले ग्रासी स्टन्ट, र्याङ्ग स्टन्ट तथा विल्टेड स्टन्ट सार्ने काम पनि गर्दछ।



खैरो फड्के कीराको वयस्क

पृष्ठभूमि

बढि आद्रता, खेतमा पानी, उष्ण वातावरण, पृथक रोपाई समय भएको क्षेत्र, नाबो धानबाली, अत्याधिक यूरिया मलको प्रयोग यस कीराको वृद्धि हुन उपयुक्त वातावरण हुन्छ। कीटनासक बिषादीको अनावश्यक र पटक पटकको प्रयोगले मित्र जीवहरु मर्न गई यसको संख्यामा निकै वृद्धि हुन्छ। कीराको संख्या छोटो समयमै ज्यादै वृद्धी हुनाले यसको र मित्र जीवहरुको धान बालीमा विशेषगरी धानको फेदमा र पानीको सतहमा नियमित रूपमा अवलोकन गर्नुपर्छ। खैरो रंगका वयस्कहरु ३.५ देखि ४.५ मि मि आकारका हुन्छन्। पोथीले पातको फेदमा तन्तु भित्र केराको हाता जस्ता गरी झुण्डमा सेता अण्डा पार्दछ। बच्चाहरु खैरो काला रंगका हुन्छन्।



खैरो फड्के कीराको क्षति

(<http://www.knowledgebank.irri.org>)

व्यवस्थापन

- गाउँमा पृथक पृथक समयमा धानको रोपाई नगर्ने। एक दुई हस्ता भित्र सबै ठाउँमा रोपाई सकाउने। पहिलेको धानको नाभो हटाउने।
- रसायनिक मलको सन्तुलित मात्रामा सिफारिस दरमा प्रयोग गर्ने। बाकलो रोपाई नगर्ने। धानको बैनर्ना २० से.मी.को फरकमा रोप्ने।
- विषादीको अनावश्यक रूपमा प्रयोग नगर्ने।
- खैरो फड्के सहन सक्ने जात मकवानपुर १ वा मसुली जात लगाउने।
- कीराको समस्या देखिएको बेला खेतको पानी ३-४ दिनको लागि निकास गर्ने। खेतमा पानी पुन राख्नी फेरि निकास गरी चार पाँच दिन खेत सुख्खा राख्ने गरी सिचाइको व्यवस्था गर्ने।
- नीमजन्य बिषादी ०.३ % २ देखि ३ एम.एल. वा एसीफेट ७५ % एस पी २ ग्राम वुप्रोफेजिन २५ % एस सी १.५ एम एल वा क्लोरोपाइरिफस २०% ई.सी. १.५ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा वा इमिडाक्लोप्रीड १७.८% एस एल ०.२५ एम एल प्रति लिटर पानीमा मिसाई धानको फेदमा पर्ने गरी छन्।
- विषादीको प्रयोग गर्दा नाक, मुख, आँखा, कानका साथै पूरै शरिरको छाला छोपिने गरी सुरक्षित पहिरन लगाउनु पर्दछ। विषादीको लेबल राम्रोसँग अध्ययन गरी प्रयोग गर्ने मात्रा पटक र प्रयोग पछि बाली टिप्ने समय राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्दछ। विषादी चर्को घाम वा हावा लागेको समयमा छर्कनु हुदैन।



खैरो फड्के कीराका वच्चाहरु

(<http://www.knowledgebank.irri.org/>)

गोलभेडाको फलको गबारो व्यवस्थापन

तयार कर्ता :

थमन बहादुर कार्की, बाली संरक्षण अधिकृत

समस्याको पहिचान

गोलभेडाको फलको गबारोले कपास, चना, रहर, गोलभेडा लगायत १८० भन्दा बढी बिस्तवाहरुमा आक्रमण गर्दछ । यो कीराले गोलभेडाको उत्पादन र गुणस्तरमा ६० प्रतिशत सम्म नोकसानी गर्दछ । यस कीराको वयस्क रात्रीचर स्वभावको पुतली हो जुन पराले रड्गको हुन्छ र यस्को लम्बाई ३०-३८मि.मि. सम्मको हुन्छ



वयस्क पुतली

(<http://agritech.tnau.ac.in>)

समस्याको पृष्ठभूमि

गर्मि समयमा खेति गरिएको गोलभेडामा यो कीराले धेरै क्षति गर्दछ । किनकी यस समयमा कीराको सन्तान उत्पादन दर अत्यधिक हुन्छ । गोलभेडा बालीमा फूल लाग्न सुरुवात सौँ वयस्क पोथीपुतलीले फूलको वरिपरी रहेका कलिला पातहरुमा अण्डाहरु पार्दछन । अण्डा पारेको २-३ दिनमा साना साना मसिना लार्भाहरु जन्मी शुरुमा कलिला मुनाहरुमा आक्रमण गर्दछन् र फल लाग्न थाले पछि चिंचिला फलहरुमा आक्रमण गर्दछन । लार्भाहरुको रंग सामान्यतया सानो छँदा हल्का हरियो भई उमेर बढ्दै जादा चिनीहरुको रंग हल्का खैरो हुन्छ तर आहार र बासस्थान अनुसार लार्भाको रड्ग परिवर्तन हुने गर्दछ । लार्भाको सर्ईज सानो देखि मध्यम आकारको (२-३ से.मी.) हुन्छ । फलहरुमा प्वाल पारी फलको भित्री भागमा गुदी खाई नोकशानी पुर्याउँछ ।



गोलभेडाको फलमा क्षति

(helicoverpaarmigera.weebly.com)

व्यवस्थापन

- शुरुमा पात तथा कलिला मुनाहरुमा छुट्टा छुट्टै पारिएका अण्डा वा ससाना लार्भाहरु, विष्टा वा मुना वा चिंचिलामा सा साना प्वालहरु देखिन्छन् जसको नियमित निगरानी गर्नु पर्दछ ।
- पासो बालीका रुपमा खेतवारीको बिचमा सूर्यमूखि लगाउनाले वयस्क पुतलीहरु फूल पार्न सूर्यमूखिमा आकर्षित हुन्छन् र त्यहाँ जम्मा गरेर नष्ट गर्न सकिन्छ ।
- गबारोले नोकसान गरेका फलहरु र सुकेका हागा एंव पातहरु संकलन गरी नष्ट गरिदिने ।
- रातको समयमा १-२ वटा बत्तिको पासो प्रति रोपनीको दरले समान दूरीमा पर्ने गरी प्रयोग गर्ने र पासोमा परेका पुतलीहरु जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
- गोलभेडा बालीमा फूल फुल्न सुरु गरेपछि गबारोको वयस्क भाले पुतलीलाई आकर्षण गरी फसाउन हेली ल्यूर युक्त पासो प्रति रोपनी जगामा ५ वटा को दरले विभिन्न स्थानमा बालीको उचाई भन्दा १ फिट माथि रहने गरी प्रयोग गर्ने ।
- नीमयुक्त बिषादी एजाडीराक्टीन ०.०३ प्रतिशत इसी ५ मिली प्रति लिटर पानीका दरले मिसाएर छर्ने ।
- गोलभेडाको फलमा रहेका लार्भहरु व्यावस्थापन गर्न बेलुकीपख भाइसयुक्त जैविक बिषादी (ए.ए.पि.पि.) १ लिटर पानीमा १ मिलिको दरले घोली १० दिनको अन्तरमा २ पटक एकनाशले फलमा भिजाउने ।
- जैविक विषादी बि टी के ३ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाएर छर्ने ।
- ल्याम्बडा साइहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत इसी ०.५ मिलि वा क्लोरोनट्रानिलिप्रोल १८.५ % एस सी ०.४ मिलि वा नोभालुरन १० % इसी १ मिलि प्रति लिटर पानीका दरले मिसाएर छर्ने । बिषादी प्रयोग गर्दा आलो पालो गरी प्रयोग गर्नु पर्दछ ।



गोलभेडाको मुनामा क्षति

(ivtc.avrdc.org)

फर्सी समुहको तरकारीमा लाग्ने शिते दुस्री रोग व्यवस्थापन

तयार कर्ता :

श्रृखंला मानन्धर, वरिष्ठ वैज्ञानिक,

समस्याको पहिचान

शिते दुस्री रोग फर्सी समुहको तरकारीको एक महत्वपूर्ण रोग हो। यो रोग काँक्रो, स्कूस, फर्सी, घिरौला, करेला लगायतका बालीहरुमा लाग्छ। यस रोगले खास गरी काँक्रोमा धेरै क्षती पुऱ्याउँछ र उत्पादनमा ८०% सम्म हास ल्याउँछ। यो दुस्रीका विभिन्न प्रजातिहरू हुन्छन् र त्यस कारण काँक्रोलाई असर गर्ने प्रजातिले फर्सीलाई क्षति नगर्न सक्छ।



पातको नशाले सिमित भएका
कोणाकार धब्बाहरु

समस्याको पृष्ठभूमि

शुरुको अवस्थामा पातको माथिल्लो भागमा नशाहरुको बिचमा हल्का पहेलो रंगका साना कोणाकारका धब्बाहरु देखिन्छन् जुन पछि खैरो हुँदै जान्छन्। यस्ता धब्बा भएको ठाउँमा पातको तल्लोतिर हेर्दा खरानी अथवा गाढा बैजनी रंगको दुस्री देखन सकिन्छ। रोगको प्रकोप धेरै भएमा धब्बाहरु एक आपसमा जोडिएर पुरै पात खैरो रंगको भई सुकेर जान्छ र झार्छ।



रोगको पछिल्लो अवस्थामा पात पूरा
डढेको

रातिको बेला पातमा शीत हुँदा यो दुस्रीले बिजाणुहरु बनाउँछ र हावा र पानीको माध्यमबाट अर्को ठाउँमा सर्छ। बढी सापेक्षिक आर्द्रता ($> 80\%$) तथा चिसो मौसम ($16-22^\circ \text{ से.}$) यो रोगको लागि अनुकूल बातावरण हुन्।

रोग व्यवस्थापन

- बीउबाट पनि सर्ने हुँदा शिते दुस्री रोग नियन्त्रणको लागि मेटाल्याक्सील ८% + म्यान्कोजेव ६४% वा थिराम बिषादी २ ग्राम/के.जी का दरले बिउ उपचार गर्ने।
- नर्सरी व्याडमा पातलो गरी बीउ छर्ने। बाकलो गरी रोपेमा बेर्नाहरु बीच हावा खेल्न पाउँदैन र सापेक्षिक आर्द्रता बढ्न जान्छ जुन दुस्रीको लागि अनुकूल हुन्छ।
- सिंचाई दिंदा छरुवा (स्प्रिन्कलर) सिंचाई नदिने किनकी यसो गर्दा माटोमा रहेका बिजाणुहरु पानीको छिड्वाबाट बोटमा फैलिने सम्भावना हुन्छ।
- बेर्नाहरुमा यो रोग देखिएमा धेरै रोगग्रस्त बेर्नाहरु हटाउने र मेटाल्याक्सील ८% + म्यान्कोजेव ६४% वा क्लोरोथालोनिल युक्त बिषादी २ ग्राम/लिटर पानीको दरले बेर्नाहरु भिज्ने गरी छर्ने।
- बालीको पछिल्लो अवस्थामा यो रोग पुराना पातहरुमा बढी लाग्छ र यस्ता रोगग्रस्त पातहरु हटाउनु पर्दछ। रोगको प्रकोप हेरेर माथि उल्लेखित बिषादीले नै ७ देखि १० दिनको फरकमा ३-४ पटकसम्म उपचार गर्ने।



पातको तल्लो भागमा गाढा बैजनी रंगको
दुस्री फैलिएको (फोटो: मारी हौसबेक)

गोलभेडाको पात खन्ने कीरा (*Tuta absoluta*)

परिचय

गोलभेडाको पात खन्ने कीरा अन्त्यन्त आक्रमक स्वभावको कीरा हो । यस कीराले गोलभेडाको साथ साथै भण्टा, खुर्सानी र आलु बालीमा समेत नोकसानी पुऱ्याउँदछ । यस कीराको आक्रमणले ५० देखि १००% सम्म उत्पादनमा कमी आउछ । वयस्क पुतली ५-६ मि. मि. लामो र पखेटा फैलाउँदा १० मि. मि. चौडा हुन्छ । वयस्क पुतली खेरो/ खरानी रंग मिसिएको र पखेटामा स-साना काला धब्बा देख्न सकिन्छ ।

कीराको जीवनी

गोलभेडाको पात खन्ने कीराको अण्डा, लार्भा, प्युपा तथा वयस्क गरी ४ वटा अवस्थाहरु हुन्छन् । वयस्क पोथी पुतलीले पातमा र केही डांठ, मुना, भेट्नो, फलको पत्रदलमा एउटा-एउटा वा स-साना झुप्पामा गरी एक जीवनकालमा लगभग २६० वटासम्म अण्डा पार्दछ । लार्भा अवस्थामा (१४-१६ दिन) यसले ३ पटक काँचुली फेरी प्युपा अवस्थामा जान्छ । पूर्ण विकसित लार्भा ९ मिमि को हुने र लार्भाको टाउको पछाडिको भाथिल्लो भागमा हुने कालो अर्ध-चन्द्रकार धब्बाले पहिचान गर्न सकिन्छ । शुरुको अवस्था हरियो रंगको हुन्छ र पछि गएर अन्तिम अवस्थामा हल्का पहेलो गुलावी रंगको जीउ हुने र टाउको कालो अर्ध-चन्द्रकार धब्बाले पहिचान गर्न सकिन्छ । प्युपा अवस्थाको अवधि १० दिनको हुन्छ ।



क्षतिको लक्षण

पातको बीचको हरियो भाग खाइ, सेतो डिल्लीमात्र छाड्छ । क्षति ग्रस्त पातलाई नियालेरहेदा सेतो डिल्ली भित्र लार्भा देख्न सकिन्छ र वरिपरि कालोबिष्टा पनि भेटिन्छ । फलको भेट्नोको वरिपरि मसिनो प्वाल पारी भित्र सुरुङ्गा बनाई क्षति गर्दछ । यसले कलिलो फलमा बढि क्षति गर्दछ । यो कीराको आक्रमण बढि भएमा पूरै पातहरु जलेर नष्ट भएको देखिन्छ ।



व्यवस्थापन

- कीराले संक्रमण गरेका पातहरु र अन्य बिरुवाका भागहरु हटाई नष्ट गर्ने, जलाउने वा कम्तिमा १ फुट गहिराइमा गाउँने ।
- वयस्क माउ पुतलीलाई नियन्त्रण गर्न टि एल एम ल्यूर वटाटि पासो प्रति रोपनी ५ का दरले राख्ने अथवा प्रति रोपनी १ बत्तिको पासो प्रयोग गर्ने ।
- निममा आधारित कीटनाशक विषादी एजाडिरिकिटन १ ५ ईसि ३ मिलि प्रति लिटर पानीमा मिसाइ ७-७ दिनको अन्तरालमा छर्ने ।
- मेटारहिजेम एनिसोपिलाइ (१x१०८ सिएफयु प्रति ग्राम) ४ केजी प्रति हेक्टरका दरले माटो उपचार गरी लार्भा प्युपा अवस्थामा जानवाट रोकन सकिन्छ ।
- गहुँत पानी १:५ को अनुपातमा मिसाइ ५-५ दिनको अन्तरालमा छर्ने ।
- बिटि कुस्टाकी १% डब्लुपि २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाइ ७ दिनको फरकमा छर्ने ।
- रसायनिक विषादीहरुको प्रयोग गर्दा क्लोरोएन्टानिलिप्रोल १८.५% एससि १ मिलि प्रति ३ लिटर पानीमा मिसाइ १०-१५ दिनको फरकमा छर्ने वा
- स्पिनोस्याड ४५% एससि १ मिलि प्रति ३ लिटर पानीमा मिसाइ १०-१५ दिनको फरकमा छर्ने वा
- फ्लुबिन्डियामाइड ३९.३५% एससि १ मिलि प्रति ३-५ लिटर पानीमा मिसाइ १०-१५ दिनको फरकमा छर्ने वा
- इमामेविटन बेन्जोएट ५५ डब्लु डिजी १ मिलि प्रति ३ लिटर पानीमा मिसाइ १०-१५ दिनको फरकमा छर्ने ।
- कीराले विष पचाउने क्षमताबाट बचाउन माथि उल्लेखित कीटनाशक विषादीहरु आलोपालो गरी प्रयोग गर्ने ।



आलुको पुतली (*Phthorimaea operculella*)

परिचय

शरिरको रङ्ग मैलो सेतो र लम्बाई ७-९ सेमि भएको सानो आकारको पुतली वर्गमा पर्ने कीराको वैज्ञानिक नाम *Phthorimaea operculella* Zeller हो । यसका अधिल्ला पखेटाहरू कैला खेरा रङ्गको साना काला छिक्का भएका हुन्छन् भने भित्रि पखेटाहरू मैलो सेतो रंगका हुन्छन् । यसलाई नेपालीमा जोताहा कीरा भनिन्छ । २० देखि ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको अवस्थामा यो कीराको फूलबाट लार्भा हुन ४-५ दिन, लार्भाबाट प्युपा हुन ११-१४ दिन र प्युपाबाट बस्यक हुन ६-७ दिन लागि २१ देखि ३० दिनमा जीवन चक्र पूरा गर्दछ ।



क्षतिको लक्षण

आलु बालीको सबभन्दा महत्वपूर्ण शत्रुको रूपमा रहेको यो कीराको आलुको दाना र पातमा क्षति गर्ने गर्दछ । लार्भाले पात र डाँठमा सुरुदूग बनाएर क्षति गर्दछ भने भण्डारणमा दानामा हुने आँखाबाट सुरुदूग बनाएर क्षति गर्दछ । अत्यधिक प्रकोप भएमा भण्डारणमा शत प्रतिशतसम्म क्षती हुन सक्छ ।



व्यवस्थापन

- स्वस्थ बीउको प्रयोग गरी १० सेमि गहिराइमा आलु रोपण गर्ने ।
- ड्याङ्गमा आलुको दानालाई राग्रोसँग माटोले छाँचे गरी उकेरा लगाउने ।
- उचित समयमा सिँचाई दिइ ड्याङ्गलाई धाँजा फाटनबाट जोगाउने ।
- पुरानो भण्डारण गरिएको आलुबाट नयाँ आलुमा कीरा नसर्ने गरी सरसफाईको व्यवस्था मिलाउने ।
- प्रकाश पासोको प्रयोग गर्ने ।
- पि.टि.एम. ल्यूर प्रयोग गरी बनाइएको पासोको प्रयोग गर्ने ।
- छहारीमा सुकाइएको तीतेपाती वा ठुला पाते बेथे वा पुदिना वा हात्ती सिस्नुको पात टुक्रा पारी संचित आलु माथि तह मिलाइ राख्ने ।
- खायन आलुमा प्रकोप देखिएमा कर्ने पनि विषादीले उपचार नगरी शुद्ध पानीमा २४ घण्टा डुबाइ छहारीमा सुकाई भण्डारण गर्ने ।
- बोझोको जराको धुलो २ ग्राम प्रति केजी दरले मिसाइ भण्डारण गर्ने ।
- बीउ आलु भण्डारण गर्नु पर्दा माला थियन ५% धुलो २५ ग्राम प्रति केजी आलुका दरले प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

व्यासिलस थुरिजियन्सिस (वि.टि.) ६ ग्राम प्रति केजी आलुका दरले उपचार गर्ने

जरामा गाँठा बनाउने रोग (Root Knot Nematode - *Meloidogyne spp.*)

क्षती गर्ने बाली

गोलभेडा, भण्टा, रामतोरिया, आलु, काउली, बन्दा, फर्सी, काँक्रो लगायतका लहरे बालीहरू, भिण्डी, सिमी, बोडी लगायतका विभिन्न तरकारी बालीहरूका अतिरिक्त अन्य बालीहरू जस्तै अन्नबाली (धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो) नगदेबाली (कफी, चिया, अलैचि, अदुवा) तथा फलफूलबाली (आँप, केरा, कटहर, मवा, लिचि, मेवा) मा समेत यसले नोकसानी गर्न सक्छ ।



लक्षण

निमाटोडले आक्रमण गरेको ६/७ दिन पछि जरामा गाँठा शुरु हुन थाल्दछ । दिन प्रतिदिन जरामा गाँठाको आकार बढ्न गर्दै गाँठाको मोटाइ ५ सेमि सम्म हुन्छ । गाँठाले गर्दा बिरुवामा पानी र खायात्तको परिवहन लाई अवरोध गर्दछ । बिरुवाको वृद्धि रोकिन्छ । पात पहेलिने, माटोमा आवश्यक चिस्यान हुँदा हुँदै पनि बिरुवा औइलाउने र बिरुवा मर्ने हुन्छ ।



व्यवस्थापन

- खेतको सरसफाई, धुम्ती बाली लगाउने, ड्याङ्गको बिच बिचमा सयपत्री फूल लगाउने ।
- गोलभेडा, भण्टामा कण्टकारी (*Solanum sisymbriifolium*) को रुस्कमा कलमी गरेर रोप्ने ।
- रायो/तोरीको पिना बिरुवा रोप्नु अघि २००-२५० ग्राम १ वर्ग मिटरको दरले प्रयोग गर्ने ।
- गाईवस्तको काँचो मलमूत्र वा वायोग्यास स्लरी २ के.जी प्रति वर्ग मीटरका दरले खनजोत गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने ।
- कालो तौरी छर्ने, फुल्ने बेलामा माटो पल्टाई दिदा नेमाटोड ग्रस्त माटोमा सधार आउँदछ ।
- फोसथियाजेट ५०० एस एल १ मिलि प्रतिलिटर पानीका दरले मिसाइ माटो उपचार गर्ने ।

काँक्रा फर्सीको सिते दुसी रोग (Downy Mildew of cucurbits-Pseudoperonospora cubensis)

लक्षण

यो रोगको प्रकोप काँक्रोमा धैरै देखा पर्दछ । पातमा हल्का पहेलो खैरो रड्गको कुना परेका थोप्लाहरू देखा पर्दछन् । बिहान सबैरे ओसिलो मौसममा पातको तल्लो सतहमा दुसी उम्रेको देखन सकिन्छ । अत्यधिक आक्रमण भएको अवस्थामा पातहरू छिड्वै सुकाई बोटलाई समेत सुकाउँदछ । फलको आकार समेत विकृत हुने गर्दछ ।



व्यवस्थापन

- बढी पानी र आद्र अवस्था रोग विस्तारको लागि अनुकुल हुने हुँदा सो समय छली छिटो रोप्ने
- रोगरहित क्षेत्रको स्वस्थ बीउ मात्र प्रयोग गर्ने ।
- सिफारिश बमोजिमको मलखाद प्रयोग गर्ने ।
- उपचारित बीउबाट मात्र उत्पादित बेर्नाको प्रयोग गर्ने ।
- बाक्लो विरुवा नराख्ने, पातको माथी पानी नजम्ने गरी सिंचाई दिने ।
- रोगीबोट र अन्य झारपातहरू उपयुक्त तरिकाले नष्ट गर्ने ।
- थिराम ७५ % डब्ल्युएस २ ग्राम प्रति किलोको दरले बीउ उपचार गर्ने ।
- फल नलागेको अवस्थामा भए कपर अक्सिस्क्लोरोराइड ५०% डब्ल्यु पी धुलो विषादी २-३ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाइ छर्ने ।
- मेन्कोजेव ७५ % डब्ल्युपी विषादी २ ग्राम प्रति लि. पानीका दरले मिसाइ पात पूरै भिज्ने गरी छर्ने ।
- डाइमेथोमोर्फ ५०% डब्ल्यु पी विषादी १.५ ग्राम प्रति लिटर पानी वा साइमोजोनिल ५०% डब्ल्युपी २ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले छर्ने ।

काँक्रा फर्सीको खराने रोग (Powdery mildew of cucurbits -Erysiphe cichoracearum)

क्षति गर्ने बाली

लहरे बालीहरू

लक्षण

शुरुमा पातको माथिल्लो सतहमा सेतो खरानी छेरेको जस्तो स साना धब्बाहरू देखा पर्दछन् । यी धब्बाहरू बढ्दै जान्छन् र संपूर्ण खण्ड नै धुलो छेरेको जस्तो सेतो हुन्छ । धैरै आक्रमण भएको अवस्थामा पात, फूल झर्ने तथा सुकेर जाने हुन्छ । फल नलाग्ने, कम लाग्ने वा लागेका फलहरू पनि विकृत हुने र राप्रो सँग बढ्न नसक्ने हुन्छ ।



व्यवस्थापन

- खेतको नियमित सरसफाई गर्ने ।
- स्प्रिङ्कलर सिंचाई गर्ने ।
- हेक्जाकोनाजोल ५% एसपी १.५ एम.एल प्रति लिटर पानीको दरले पूरै पात भिज्ने गरी छर्कने ।
- सल्फर ८० % डब्ल्यु पि २ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाएर छर्ने ।

जीवनाशक विषादीको सुरक्षित परिवहन, भण्डारण र यसका मापदण्ड

विषादीको सुरक्षित परिवहन

विषादीको कारोबारको क्रममा विषादीलाई एक स्थानबाट अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने हुन्छ जसका लागि प्रयोग गरिने यातायातको साधन तथा लैजाने विधि सुरक्षित हुन जसरी हुन्छ । सबै विषादी प्रयोगकर्ताहरूले विषादी परिवहनका क्रममा विषादीबाट हुने दुर्घटना बुझ्नु पर्ने तथा जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने विधिहरू ध्यानपूर्वक पालना गर्नु पर्दछ । विषादी उत्पादकदेखि विषादी थोक बिक्रेता, थोक बिक्रेताबाट खुद्रा बिक्रेता हुदै अन्तिम उपभोक्ता वा किसान सम्म पुग्दा विषादी सुरक्षित परिवहन, भण्डारण तथा प्रयोगमा सावधानी अपनाउदा विषादीबाट हुन सक्ने धौरे प्रकारका जोखिम कम गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणको सावधानि हामीले विषादी परिवहन हुँदा हुन सक्ने दुर्घटनालाई कम गर्नु र विषादी कुनै कारणवश चुहिएको वा पोखिएको खण्डमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो । यदि विषादी चुहिएको वा पोखिएको खण्डमा मानव स्वास्थ्य, पशु चौपाया तथा पर्यावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । विषादी सुरक्षित परिवहनका लागि निम्न विषयहरूमा ध्यान पर्याउन जरुरी हुन्छ ।

- विषादी परिवहन गर्दा पछाडीको भाग खुल्ला भएको पिकअप गाडीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । चालक बस्ने भाग र विषादी राख्ने भाग अलग हुनु पर्दछ ।
- विषादी सार्वजनिक यातायात, पशु चौपाया बोक्ने गाडी, खाद्यान्न बोक्ने गाडी, स्कूल वसमा सँगै राखेर परिवहन गर्नु हुँदैन । विषादी बोक्ने गाडीमा खाद्यान्न, पशु आहारा, खनिज पदार्थ, बीउविजन, दैनिक उपभोगका अन्य सामाग्री साथै राख्नु र बोक्नु हुँदैन ।
- झोल विषादी लाई कहिलै पनि यात्रु वा चालक वस्ने क्षेत्रमा राख्नु हुँदैन । यदि विषादी पोखिएको खण्डमा यसको घातक ग्याँस तथा पोखिएको विषादीको सम्पर्क हुँदा स्वासप्रश्वास तथा छालाबाट विषादी शरिरमा प्रवेश गर्ने हुन्छ । यसरी पोखिएको विषादी हटाउन समस्या र लामो समयसम्म सम्पर्क हुने हुँदा जोखिम बढेर जान्छ ।
- विषादी गाडीमा राख्दा सुरक्षित तरिकाले नपोखिने गरी राख्नु पर्दछ ।
- विषादीको कन्टेनरहरू नचुहिने, नखस्ने तरिकाले मिलाएर गाडीमा राख्नु पर्दछ । विषादी प्याक गरेको कार्टुनहरू चुस्त हुनुपर्दछ । कार्टुन तथा बोरामा सूचकपत्र प्रष्ट देखिने बुझ्ने हुनु पर्दछ ।
- प्रत्येक विषादीका कन्टेनर तथा प्याकेटहरू यथा अवस्थामा कार्टुनमा प्याक गरिएको हुनु पर्दछ । कार्टुनमा पनि सूचक पत्र राखिएको र कार्टुन क्षति नभएको हुनु पर्दछ ।
- विषादीलाई यातायातको साधनमा वा पिकअपमा राख्दा पिकअपको साइड भन्दा अग्लो हुने गरी राख्नु हुँदैन । विषादी यातायातको क्रममा खस्ने गरी राख्नु हुँदैन । विषादी पोखिने वा चुहिने हुनु हुँदैन ।
- झोल विषादीलाई तल र धुलो विषादीलाई माथि राख्नु पर्दछ । धौरे विषादी एकै पटक ढुवानी गर्नु हुँदैन ।
- चित्रमा देखाए जस्तै विषादीको कार्टुन वा कन्टेनर लाई नहलिल्ने गरी बाध्नु पर्दछ ।
- यातायातको क्रममा विषादी पोखिदा वा चुहिँदा व्यवस्थापनका लागि साबेल, सफागर्ने कुचो ब्रस लगाएतका सामाग्री राख्नु पर्दछ ।
- यातायातको साधनमा विषादी राखेको वा विषादी ढुवानी गरेको जनाउनका लागि खतराको चिन्ह राख्नु पर्दछ । व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि सुरक्षात्मक सामाग्रीहरू जस्तै मास्क, चस्मा, ग्लोव्स, वुट, एप्रोन chemical resistant gloves लगाएतका सामाग्रीहरू लगाउनु पर्दछ ।

परिवहन सवारी



विषादी बोकेको साधनको चालक तथा विषादी कम्पनीको मालिकले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरु

- चालक तथा कम्पनीको मालिकले विषादी परिवहनका क्रममा हुने पर्यावरणीय असर तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा जवाफदेहि हुनु पर्दछ ।
- चालकले विषादी पोखिएको वा चुहिएको थाहापाउदा वित्तिकै यो फैलनबाट रोक्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
- चालकले विषादी पोखिदा वा चुहिंदा तत्कालै गर्ने कार्यहरु र समाधानका लागि उपायहरु बारेमा जानकारी हुनु पर्दछ । विषादी बोकदा यो घातक वस्तु हो र यसको लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा जानकार हुनु पर्दछ ।
- विषादी बोकदा विषादीको सूचक पत्र र विषादीको सुरक्षात्मक डाटा सिट **Safety Data Sheets (SDSs)** अनिवार्य बोक्नु पर्दछ । विषादी पोखिदा वा चुहिदा सफा गर्न आवश्यक टुल किट (**spill kit**) बोक्नु पर्दछ ।
- नेपाल सरकारले जारी गरेका ऐन नियम तथा मापदण्ड अनुसार विषादीको परिवहन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
- विषादीको प्रकार र सूचक पत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार विषादीलाई उपयुक्त तापक्रम तथा आद्रताको ख्याल राख्नु पर्दछ । कठिनपय विषादी संश्लेषण लाई तापक्रम तथा आद्रताले असर पुर्याउदछ ।
- विषादी बोकेको यातायात साधनमा यो विषादी हो । विष हो । भन्ने जानकारीको लागि लोगो सहित सूचना दिने चित्र र लेखिएको कार्ड सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्दछ ।
- विषादी लोड तथा अनलोड गर्दा काम गर्ने कामदारहरूले अनिवार्य सुरक्षात्मक सामाग्रीहरु प्रयोग गरेर मात्र काम गर्नु पर्दछ ।

जीवनाशक विषादीको भण्डारण कक्ष र पसलको व्यवस्थापन

विषादी उत्पादन, थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले विभिन्न प्रकारका विषादीहरु लाई भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । विषादीको सुरक्षित भण्डारण गरिएको खण्डमा यसबाट हुन सक्ने धैरे प्रकारका जोखिमहरु लाई कम गर्न सकिन्छ जसका कारण यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्तिलाई विषादीबाट हुने असर न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । भण्डारण तथा बिक्री कक्षमा निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ ।

- विषादी भण्डारण कक्षको भुँडि तथा भित्ताहरु सिमेन्टेड तथा ढलान गरिएको हुनु पर्दछ ।

- विषादी भण्डारण कक्ष मा हावा ओहोर दोहोर हुने गरी प्रयास भेन्टिलेसन राखिएको हुनु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण कक्ष सुख्खा तथा चिसो हुनु पर्दछ । आोसिलो र तापक्रम बढि हुने तथा सूर्यको प्रकाश पर्ने वा चर्को घाम लाग्ने हुनु हुँदैन ।
- भण्डारण कक्षमा पर्यास प्रकाशको व्यवस्था हुनु पर्दछ । अध्यारो कुना तथा गुम्सिने किसिमको हुनु हुँदैन ।
- भण्डारण कक्षमा चरा तथा मुसाहरु पस्ने र बस्ने हुनु हुँदैन ।
- भण्डारण कक्ष सफा हुनु पर्दछ । राखेको विषादीको सूचक पत्र सजिलै पढ्न सकिने र एक पटकमै चाहेको विषादी निकाल्न वा राख्न सकिने हुनु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण कक्षमा अन्य जनावर जस्तै कुकुर बिरालो वा घर पालुवा जनावर पस्ने हुनु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्षमा अन्य व्यक्ति वा बालबालिका पस्ने हुनु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्षमा ढोका इयाल तथा सटरहरु लकको राग्रो व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण कक्षमा खानेकुरा, पशु आहारा वा औषधि, अन्य घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरु राख्नु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्षमा विषादीहरु राख्दा विषादीको समुह अनुसार फरक फरक क्षेत्रमा राख्नु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण गर्दा विषादीको म्याद अनुसार पहिले आएको विषादी पहिले नै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
- भण्डारण कक्षमा नियमित विषादीको अवस्थाको जाचं गर्नु पर्दछ । जसवाट विषादी चुहिएको वा पोखिएको अवस्था रहेको खण्डमा तत्कालै व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
- भण्डारण कक्षमा विषादी राख्दा आफु भन्दा माथि हुने गरी विषादी राख्नु हुँदैन ।
- भण्डारण कक्षमा विषादी चुहिदा वा पोखिदा सफा गर्न आवश्यक सामाग्री जस्तै कुचो, सावेल, वाल्टिनमा वालुवा, काठको धुलो, कपडा, सावुन पानी लगाएतका सामाग्रीहरु व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण गर्दा विषादीको सम्पर्क विशेष गरी अन्य व्यक्ति तथा वातावरणमा असर गर्ने गरी गर्नु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्षमा विषादी जनाउने खतराको संकेत राख्नु पर्दछ । अन्य लाई प्रवेश गर्न वन्चित गर्नु पर्दछ ।
- सूचक पत्र सबै देखिने गरी प्रष्ट राख्नु पर्दछ ।
- विषादी बिक्री कक्षमा विषादी राख्दा बस्ने व्यक्तिलाई विषादीको कम भन्दा कम सम्पर्क गर्ने गरी राख्नु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण र बिक्री कक्षमा बस्दा अनिवार्य मास्क, ग्लोप्स, बुट, ह्याट, चस्मा र एप्रोन जस्ता सुरक्षात्मक पहिरनको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण तथा बिक्रीकक्षमा कुनै पनि प्रकारको खानेकुरा राख्नु र खानु हुँदैन । चुरोट, चुइगम, सूर्ती, र पानी लगाएतका कुनै चिज खानु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्ष र बिक्री कक्षमा औषधी राख्नु र खानु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्ष र विषादी बिक्री कक्षमा बालबालिका पस्न र बस्न दिनु हुँदैन । विषादी देखि बालबालिकालाई टाढा राख्नु पर्दछ ।
- विषादी भण्डारण कक्ष र विषादी बिक्री कक्षमा बस्दा लगाएका लुगाहरु बालाबालिकाका कपडा सँग सँगै राखेर धुनु हुँदैन ।
- विषादी भण्डारण कक्ष र विषादी बिक्री कक्षमा राखिएका विषादीहरुको सूचक पत्र प्रष्ट तथा कुनै केरमेट गरिएको नबुझिने वा च्यातिएको हुनु हुँदैन र विषादी उत्पादित कन्टेनरमा नै हुनु पर्दछ ।
- म्याद सकिएका विषादीको परिमाण तथा विषादीको प्रकार सबै विवरण राखेर सुरक्षित क्षेत्रमा बिक्रीलाई राखेको भन्दा

फरक स्थानमा विषादी भण्डारण गर्ने साथै विवरण कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा जानकारी गराउने ।

- विषादी पसल वा भण्डारण क्षेत्रमा यी कुरा अनिवार्य र छुट्टाछुट्टै राख्ने
- उपचार गरिएको बीउ र उपचार नगरेको बीउ
- विषादी र भेटेरेनरी औषधि तथा दानाहरु काउन्टर नै व्यत्ति व्यवस्था गर्ने ताकि विषादी सम्पर्क हुन नपावस् ।
- बेच्नका लागि राखेको रासायनिक विषादी र म्याद नाधेको विषादी
- झारपातनाशक विषादी र अन्य विषादी
- विषादी र सुरक्षात्मक सामाग्रीहरु
- रासायनिक विषादी र जैविक विषादीहरु

विषादीको प्रभावकारीता कायम राख्न र व्यवसाय व्यवस्थापन

- विषादीको बारेमा सधैव सूची बनाई राख्ने । भण्डारणमा रहेको परिमाण तथा बिक्री कक्षमा रहेको परिमाण बारेमा जानकारी राख्ने ।
- प्रतेक विषादीको गत्ता तथा प्याकिङ्गमा विषादीको म्याद समाप्त हुने समय मार्करले देखिने गरी लेख्ने ।
- बिक्रीवितरण गर्दा पुरानो सामाग्री वा विषादीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ।
- विषादी भण्डारण कक्ष वा पसलमा विषादीको अवस्था म्याद समाप्त हुने समय को नियमित जाचँ गर्ने ।
- भण्डारणको वातावरण वा अवस्थाले विषादीको प्रभावकारितामा फरक पार्दछ । जस्तै बढि तातो, सूक्यो प्रकाश, बढि चिसो वा ओसिलो जसका कारणले विषादीको सूचक पत्र पनि खराब हुन सक्छ ।
- जैविक विषादीको हकमा तत्कालै प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने ।
- विषादीको सूचक पत्रमा लेखिएको विषयलाई पालना गर्ने ।
- नयाँ नयाँ सुरक्षित र प्रभावकारी विषादीको मात्र कारोबार गर्ने ।
- विषादी खरिद गर्दा ऐन नियम अनुसार बील लिएर आधिकारिक निकाय वा पसलबाट मात्र खरिद गर्ने ।
- विषादीको प्रभावकारिताको बारेमा कृषकबाट पृष्ठपोषण लिने । यदि विषादी प्रभावकारी नरहेको खण्डमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा जानकारी गराउने ।

विषादी म्याद नाघ्न नदिनका लागि उपायहरु

- विषादी कति खपत हुन्छ । कृषकको मागको आधारमा मात्र आवश्यक पर्ने विषादीको परिमाणको अनुमान गर्नै ।
- विषादी किन्दा वा खरिद गर्दा त्यस मौसमको लागि मात्र किन्ने गर्नै । एकैपटक धैरै विषादी खरिद नगर्नै ।
- विषादी खरिद गर्दा आकर्षक लोभ तथा अन्य छुटको पछि लागेर धैरै विषादी खरिद नगर्नै ।
- विषादी खरिद गर्दा विषादीको म्याद समाप्त हुने मितिलाई पोखिने, चुहिने र आयुकम हुने काम नगर्नै ।
- पुरानो विषादीलाई पहिले बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाऊँ ।

- नयाँ नयाँ सुरक्षित विषादीहरू निलो वा हरियो संकेत भएका विषादीहरू खरिद तथा बिक्री गरौँ।
- कृषकको मागका आधारमा साना साइजको कन्टेनरको व्यवस्था गरौँ।

खरिद गरेको विषादी बढी भएमा

- विषादी बिक्रेताहरूको सहमति कायम गरी अन्य आवश्यक रहेको क्षेत्रमा पठाउने।
- विषादी उत्पादक, थोक बिक्रेताकहाँ विषादी को म्याद समाप्त हुनु तिन महिना पहिले नै सहमतिको आधारमा फिर्ता पठाउने जसबाट उसले अन्य स्थानमा पठाउन सकोस्।
- यदि विषादीको म्याद समाप्त भएको छ भने सम्पूर्ण विवरणका साथमा छट्टै भण्डारण क्षेत्रमा राख्ने र सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने। म्याद समाप्त भएको विषादी बिक्री कक्षमा राख्नु र बिक्री गर्नु हुँदैन।
- कृषकले प्रयोग गर्दाको बखत बढी भएको विषादी लाई पानीको मुहान वा निकास नजिक वा फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्नु हुँदैन।
- विषादीको सम्पर्क भएका भाडा कुँडा वा वट्टा अन्य प्रयोजनमा ल्याउनु हुँदैन।
- विषादीलाई जलाउनु हुँदैन।

चुहिएको वा पोखिएको विषादीको व्यवस्थापन

विषादी परिवहन, भण्डारण वा बिक्री वितरणका क्रममा विषादी चुहिएर वा पोखिएर ढुला दुर्घटना हुन सक्दछ जसका कारणले मानिसको स्वास्थ, पशु पन्छीको स्वास्थ वा वातावरण प्रदूषण हुन पुग्दछ। अतः विषादी चुहिएमा वा पोखिएमा यसको उचित व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी छ जसका लागि निम्न विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।

- चुहिएको वा पोखिएको विषादी व्यवस्थापन गर्दा अनिवार्य सुरक्षात्मक पहिरन लगाउनु पर्दछ।
- चुहिएको वा पोखिएको विषादीको स्रोत वा कन्टेनर पत्ता उगाउने।
- चुहिएको वा पोखिएको क्षेत्रमा अन्य व्यक्ति वा जनावरको प्रवेश निषेध गर्ने।
- चुहिएको वा पोखिएको विषादी फैलनबाट रोक्ने र सम्पर्कमा आएको सामाग्री वा विषादी अलगै राख्ने।
- वालुवा वा काठको धुलोले विषादी फैलनलाई रोक्ने।
- सफा गर्ने सामाग्री कुचो तथा फोहोर उठाउने ज्यावलका सहायताले सम्पूर्ण विषादी युक्त बालुवालाई सफा तरिकाले उठाउने र सुरक्षित विसर्जन गर्ने।

जानकारी

**विषादी विष हुन औषधि होइन विषादीको दुरूपयोग नगरौँ।
विषादी भण्डारण गर्दा ओसार पसार गर्दा, बिक्री वितरण तथा
प्रयोग गर्दा सुरक्षित तवरले गरौँ। विषादी व्यवस्थापनमा सबैले
जिम्मेवारी पूर्वक सहयोग गरौँ। विषादीको नकारात्मक
असरबाट आफू बचौँ र अरुलाई बचाओँ।**

